William Cullens,

der Arzneykunst Doktors und öffentlichen Lehrers der praktischen Arzneykunst zu Edinburg,

Kurzer Inbegriff der medicinischen Nosologie:

oder systematische Eintheilung der Krankheiten

von Cullen, Linne', Sauvages, Vogel und Sagar.

Nach der dritten vermehrten Ausgabe mit einigen Zusätzen.

Zweyter Theil, welcher die Systeme von Sauvages, Linne', Vogel und Sagar enthält.

Leipzig, bey Caspar Fritsch, 1786.

William Cullens
systematische
Eintheilung der Krankheiten
oder
kurzer Inbegriff
der methodischen Nosologie.

Zweyter Theil,
welcher das System von Sauvages, Linne',
Vogel und Sagar
enthält.

Zweyter Theil.

Gattungen (Genera) der Krankheiten nach der Bestimmung des Franz Boissier de Sauvages *).

Classen und Ordnungen.

Cl. I. Vitia. Aeußerliche Fehler und Krankheiten.

Ordo. I. *Maculae*. Flecken.
— II. *Efflorescentiae*. Ausschläge.
— III. *Phymata*. Geschwülste von Feuchtigkeiten.
— IV. *Excrescentiae*. Kalte Geschwülste an festen Theilen.
— V. *Cystides*. Sackgeschwülste.
— VI. *Ectopiae*. Veränderte Lagen der Theile.
— VII. *Plagae*. Wunden.

Cl. II. Febres. Fieber.

Ordo. I. *Continuae*. Anhaltende Fieber.
— II. *Remittentes*. Nachlassende Fieber.
— III. *Intermittentes*. Wechselfieber.

Cl. III. Phlegmasiae. Entzündungskrankheiten.

Ordo. I. *Exanthematicae*. Ausschlagsfieber.

*) Siehe dessen Nosol. method. 1768. die Ausgabe in Quart.

Ordo. II. *Membranaceae.* Entzündungen membranöser Theile.

— III. *Parenchymatosae.* Entzündungen der Substanz der Eingeweide.

Cl. IV. Spasmi. Spasmodische Krankheiten.

Ordo. I. *Tonici partiales.* Krampfartige Zusammenziehungen einzelner Theile.

— II. *Tonici generales.* Allgemeine krampfichte Zusammenziehungen.

— III. *Clonici partiales.* Partielle Zuckungen.

— IV. *Clonici generales.* Allgemeine Zuckungen.

Cl. V. Anhelationes. Engbrüstigkeiten.

Ordo. I. *Spasmodicae.* Periodische Engbrüstigkeiten, Steckflüsse.

— II. *Oppressiuae.* Chronische Engbrüstigkeiten.

Cl. VI. Debilitates. Schwächen.

Ordo. I. *Dysaesthesiae.* Schwächen der Sinnen.

— II. *Anepithymiae.* Schwächen oder Verlust der Arten des natürlichen Verlangens.

— III. *Dyscinesiae.* Schwächen der animalischen Bewegungen.

— IV. *Leipopsychiae.* Schwächen der Lebensbewegungen. Ohnmachten.

— V. *Comata.* Soporöse Krankheiten.

Cl. VII. Dolores. Schmerzen.

Ordo. I. *Vagi.* Herumziehende Schmerzen, oder solche die keinen bestimmten Sitz haben.

Ordo.

Ordo. II. *Dolores capitis.* Schmerzen des Kopfs.

— III. *Dolores pectoris.* Schmerzen der Brust.

— IV. *Dolores abdominales interni.* Schmerzen inwendig im Unterleibe.

— V. *Dolores externi et artuum.* Aeußerliche Schmerzen und Schmerzen der Glieder.

Cl. VIII. Vesaniae. Krankheiten der Seele.

Ordo. I. *Hallucinationes.* Fehler der Einbildungskraft von einer Verderbung der Sinnwerkzeuge.

— II. *Morositates.* Verderbte Arten des Verlangens.

— III. *Deliria.* Fehler der Beurtheilungskraft von einem Fehler der Einbildungskraft, den der Verstand nicht verbessern kann.

— IV. *Vesaniae anomalae.* Anomalische Krankheiten dieser Art.

Cl. IX. Fluxus. Widernatürliche Ausleerungen einer Feuchtigkeit.

Ordo. I. *Sanguifluxus.* Blutausleerungen.

— II. *Aluifluxus.* Ausleerungen durch den Stuhlgang.

1) *Sanguinolenti.* Blutiger Feuchtigkeiten.

2) *Non Sanguinolenti.* Nicht blutiger Feuchtigkeiten.

— III. *Serifluxus.* Wässerichte Ausleerungen.

— IV. *Aërifluxus.* Auslerungen von Luft.

Cl. X. Cachexiae. Cachexien.

Ordo. I. *Macies.* Mit Magerkeit.

— II. *Intumescentiae.* Mit Geschwülsten.

— III. *Hydropes partiales.* Partielle Arten der Wassersucht.

— IV. *Tubera.* Festsitzende nicht wässersüchtige Geschwülste von festen Theilen.

— V. *Impetigines.* Chronische Hautausschläge.

— VI. *Decolorationes vel Icteritiae.* Verderbungen der natürlichen Farbe.

— VII. *Cachexiae anomalae.* Anomalische Cachexien.

GENERA

GENERA MORBORVM.

Classis I. Vitia. Aeußerliche Fehler und Krankheiten.

Character. Symptomata cutanea leuidensia, vel mechanicis chirurgiae auxiliis curanda. Hautfehler, die leicht sind, oder durch mechanische chirurgische Hülfsmittel gehoben werden können. Cullen Cl. IV.

Ordo I. Maculae. Hautflecken.

Coloris natiui mutationes. Verderbungen der natürlichen Farbe.

Genus 1. *Leucoma.* Macula opacans corneam. Flecken der Hornhaut.

G. 2. *Vitiligo.* Macula corymbosa, seu ex minoribus maculis composita, cum depressione cutis. Weiße Flecken, die aus einem Haufen kleiner Flecke bestehen, wobey die Haut eingedrückt ist.

G. 3. *Ephelis.* Maculae acquisitae, vmbrinae, glabrae, corymbosae, faciem vel tibias, rarius partes tectas, afficientes. Leberflecke. Braune Flecke, die haufenweis beysammen stehen, glatt und nicht angebohren sind, und im Gesicht und an den Beinen, seltner aber an andern bedeckten Theilen zum Vorschein kommen.

Genus 4. *Gutta Rosea.* Maculae faciei rubrae, guttatae, parum prominentes. Kupfer im Gesicht. Rothe, tropfenartige, etwas hervorragende Flecke. Cullen Gatt. 7.

G. 5. *Naeuus.* Macula congenita, quae vulgo tribuitur vehementi cupiditati, qua mater initio grauidatis exagitata fuit, quandoque cum partis eminentia. Muttermähler. Angebohrne Flecken, die man gemeiniglich einem Gelüsten der Mutter bey dem Anfang der Schwangerschaft zuschreibt, und die zuweilen etwas hervorragen

G. 6. *Ecchymoma.* Macula nigricans vel atro-rubra, aut liuescens, successu temporis flauescens, non congenita, nec aspera, sed plana, aut parum prominens, et subsolitaria. Unterlaufen mit Blut. Schwarze, schwarzrothe oder schwarzblaue Flecke, die in der Folge blau werden, nicht angebohren noch rauch, sondern glatt, oder nur wenig hervorragend und einzeln sind. Cullen G. 128

Ordo II. Efflorescentiae. Kleine Hautausschläge. Kleine Geschwülste von stockenden Feuchtigkeiten, die Haufenweise bey einander stehen: oder erhabne Hautausschläge mit Pusteln, Blüthgen, Bläschen u. s. w.

Tumores humorales exigui gregales. Vel cutis eleuatio per pustulas, papulas, phlyctaenas, varos, similesue asperitates.

a) *Pu-*

a) *Pustula.* Phyma paruulum apice ruptum. Eiternde Blüthgen. (Pustules). Siehe 1 Theil S. 109.

b) *Papula.* Phyma paruulum desquamari solitum. Blüthgen, die nicht eitern, sondern sich abschuppen (Boutons). Ebend. S. 110.

c) *Phlyctaena.* Vesicula fluido seroso plena. Wasserbläschen. Ebend.

d) *Varus.* Tuberculum durum constans. Harte Blüthgen, die nicht vereitern oder sich abschuppen, sondern fortdauern (Bourgeons). Ebend.

G. 7. *Herpes.* Efflorescentia ex tumoribus exiguis, rubris, aggregatis, pruriginosis, in squamas furfuraceas, raro crustaceas, abeuntibus. Flechten. Aus kleinen rothen beysammenstehenden juckenden Blüthgen, die in kleyenartigen Schuppen, selten in Borken abgehen. Cullen S. 145.

G. 8. *Epinyctis.* Phlyctaenae atro - rubrae, aggregatae, trium vel quatuor linearum in diametro, tibias vt plurimum afficientes, et noctu potissimum acriter pungentes. Dunkelrothe bey Nacht vorzüglich juckende Bläschen, von drey bis vier Linien im Durchschnitt an den Beinen. Ausfahren an Beinen. Wässerichter scorbutischer Friesel.

G. 9. *Psydracia*. Phymata erysipelatosa. Rothe Nesselsucht. Cullen 1 Theil S. 112.

G. 10. *Hidroa*. Exanthemata miliaria phlyctaenoidea. Hitzblattern. Frieselähnliche Wasserbläschen. Schwitzblattern.

Ordo III. Phymata. Geschwülste von Feuchtigkeiten.

Tumores humorales, notabiles, solitarii. Geschwülste von stockenden Feuchtigkeiten von einer beträchtlichen Größe, die meistens einzeln vorhanden sind.

G. 11. *Erythema*. Tumor sine febre, superficiarius, solitarius, diffusus, rubro-roseus, pressione euanescens. Geschwulst in der Haut ohne Fieber, die einzeln ist, sich verbreitet, eine dunkelrothe Farbe hat, und durch den Druck des Fingers vergehet. Rose. Cullen Gat. 7. 2.

G. 12. *Oedema*. Tumor diffusus frigidus, pallidus, laxus, doloris expers. Wässerichte Geschwulst. Eine verbreitete, kalte, blasse, schlaffe und unschmerzhafte Geschwulst.

G. 13. *Emphysema*. Tumor diffusus, elasticus, pressione crepitans, cuti concolor. Windgeschwulst. Eine verbreitete, elastische, bey dem Druck knisternde, und der Haut an Farbe ähnliche Geschwulst. Cullen. G. 71.

G. 14. *Scirrhus.* Phyma durum indolens cuti concolor. Scirrhöse harte unschmerzhafte, der Haut an Farbe ähnliche Geschwulst. Cullen G. 129

G. 15. *Phlegmone.* Tumor ſphaeroideus rubore, calore, tenſione, dolore pulſatili inſignis, ſponte in ſuppurationem vergens. Entzündungsgeschwulst. Runde Geschwulst mit Röthe, Hitze, Spannen und einem klopfenden Schmerz. Sie gehet von selbst in Vereiterung. Cullen G. 7. 1.

G. 16. *Bubo.* Tumor partim ſcirrhoſus, partim inflammatorius, glandulae vnius aut alterius inguinalis. Leistenbeulen. Bubonen. Eine theils scirrhöse theils inflammatorische Geschwulst einer oder der andern Leistendrüse. Cullen G. 131.

G. 17. *Parotis.* Tumor ſcirrhoſo-phlegmonoideus glandulae parotidis dictae, in ſuppurationem lentiſſime vergens. Vereiterung der Ohrendrüse. Eine scirrhöse entzündungsartige Geschwulst der Ohrendrüse, die sehr langsam vereitert. Cullen G. 131.

G. 18. *Furunculus.* Tumor inflammatorius, cutaneus, prominens, durus, et atro-ruber, cuius centrum, cum ſuppuratus eſt, occupant fibrae craſſae, quae in pus non colliqueſcunt. Blutschwähr. Eine entzündungs-

artige

artige Hautgeschwulst, die hervorragt, hart und dunkelroth ist, in deren Mittelpunkt bey der Vereiterung harte Fasern oder ein sogenannter Eiterstock zurückbleiben, die sich nicht in Eiter verwandeln. Cullen 7. 1.

G. 19. *Anthrax.* Phyma apice gangraenosum, ambitu inflammatum. Carbunkeln. Eine an ihrer Spitze brandigte, im Umkreiß entzündete Geschwulst. Cullen 7. 2.

G. 20. *Cancer.* Tumor durus, tuberosus, lancinans, pertinacissimus. Krebs. Eine harte knotigte Geschwulst, in welcher der Patiente heftig stechende und reißende Schmerzen empfindet und die schwer zu heilen ist. Cullen 130.

G. 21. *Paronychia.* Phlegmone extremi digiti cum dolore perterebrante. Nagelgeschwür. Eine Entzündung der Fingerspitzen mit einem bohrenden Schmerz. Cullen 7. 1.

G. 22. *Phimosis.* Phlegmone praeputii, cum huius adducendi vel reducendi difficultate. Verengerung und Entzündung der Vorhaut. Eine Entzündung der Vorhaut, die man weder vor noch rückwärts schieben kann. Cullen. 7. 1.

Ordo IV. Excrescentiae. Kalte Geschwülste an festen Theilen.

Tumores a solidis adauctis, indolentes, lente crescentes, in suppurationem sponte non abeuntes.

tes. Kalte nicht schmerzhafte Geschwülste von der vermehrten Größe fester Theile, die nicht freywillig in die Vereiterung gehen. **Cullen.**

G. 23. *Sarcoma.* Excrescentia carnis consistentiam circiter obtinens. Fleischgeschwulst. Excrescenz, welche die Consistenz des Fleisches hat. **Cullen** 132.

G. 24. *Condyloma.* Excrescentia firma carnibus durior, ossibus mollior. Feigwarzen. Eine Hervorragung, die fester und härter als Fleisch, aber weicher als Knochen ist.

G. 25. *Verruca.* Excrescentia cutanea prominens, condylomate minor, sensu destituta, indolens. Warze. Hervorragung auf der Haut, die kleiner als eine Feigwarze, ohne Gefühl und nicht schmerzhaft ist. **Cullen** 134.

G. 26. *Pterygium.* Excrescentia carnea, vel membranaceo-vasculosa ad oculi canthum exorta, alam expansam referens, et versus corneam se extendens. Nagel an der Hornhaut. Fell an der Hornhaut. Fleischartige oder eine membranöse gefäßreiche Excrescenz, die an dem Augenwinkel entstehet, einem ausgebreiteten Flügel ähnlich ist, und sich nach der Hornhaut zu erstrecket.

G. 27. *Hordeolum.* Tumor durus vix sensu gaudens, cuti concolor, raro rubens, in palpebrarum limbo enascens, sphaericus, piso

vt

vt plurimum minor. Gerstenkorn. Eine harte Geschwulst, die fast gar keine Empfindung hat, der Haut an Farbe ähnlich und selten roth ist, am Rand der Augenlieder entstehet, rund und gemeiniglich kleiner als eine Erbse ist. Cullen G. 7. S. 110.

G. 28. *Bronchocele.* Excrescentia vel Tumor scirrhosus anticae partis colli. Kropf. Eine Excrescenz oder scirrhöse Geschwulst, die am vordern Theile des Halses entstehet.

G. 29. *Exostosis.* Tumor ossis vel totalis vel partialis. Knochengeschwulst eines ganzen Knochens oder eines Theils desselben. Cullen G. 139.

30. *Gibbositas.* Ossium pectoris indecora prominentia a tumore, luxatione, distorsione, aut alio principio oriunda. Buckel. Eine übelgestaltete Hervorragung der Knochen der Brust, die von einer Geschwulst, Verrenkung, Verdrehung oder andern Ursachen entstehet.

G. 31. *Lordosis.* Ossium distorsio, vnde hinc protuberant, inde vero excauantur artus, ac incuruantur ossa, vel a situ deflectunt. Verdrehung der Knochen. Krumme Glieder, wobey die Knochen auf einer Seite hervorstehen, auf der andern aber ausgehöhlt, oder verbogen sind.

Ordo

Ordo V. Cyſtides. Sackgeſchwůlſte.

Protuberantiae factae a fluidis intra membranas proprias, vel alienas maxime dilatatas contentis, vel receptacula quaeuis diſtendentibus. Hervorragungen und Geſchwůlſte, die von Feuchtigkeiten entſtehen, welche in eigenen beſondern oder auch andern, doch ſehr erweiterten Membranen enthalten ſind, oder irgend eine Art von Behålter ausdehnen.

G. 32. *Aneuryſma*. Cyſtis arterioſa. Puls-ader-Geſchwulſt von Erweiterung der Schlagadern. Cullen 126.

G. 33. *Varix*. Cyſtis venoſa. Krampfader-geſchwulſt von Erweiterung der zurůckfůhrenden Adern. Cullen 127.

G. 34. *Mariſca*. Tumores in ani margine enati, rubri, ſaepe dolentes, et cruorem ſaepe fundentes, ſponte dein recedere ſoliti. Blinde gůldne Ader. Zacken. Geſchwůlſte am Rande des Aſters, die oft ſchmerzhaft ſind, und aus denen oft Blut fließt, die aber von ſelbſt wieder zu verſchwinden pflegen. Cullen 31. 1.

G. 35. *Hydatis*. Cyſtis lymphaeductuum. Waſſerblaſe, von Erweiterung der lymphatiſchen Gefåße. Cullen 137.

G. 36. *Staphyloma*. Cyſtis aquoſa a corneae pro-

proptosi, et dilatatione, vel ab vueae hernia trans foramen corneae elapsa. Hervorragung der Hornhaut, oder Geschwulst der Hornhaut, die aus dem Vorfall oder der Erweiterung derselben entstehet, Wasser enthält, oder von der durch ein Loch der Hornhaut hervorgedrungenen Traubenhaut verursacht wird.

G. 37. *Lupia*. Cystis vel folliculus materiem pultaceam non purulentam continens. Sackgeschwulst; wo der Sack eine breyartige nicht eitrige Materie enthält. a) *Meliceris* Honiggeschwulst. b) *Steatoma*. Speckgeschwulst. Cullen 135.

G. 38. *Hydarthrus*. Cystis articuli aquosa. Gelenkwassersucht. Cullen 137.

G. 39. *Apostema*. Cystis purulenta. Eitergeschwulst. Cullen 138.

G. 40. *Exomphalus*. Cystis vmbilicalis saepius aquosa. Wasserbruch am Nabel.

G. 41. *Oscheocele*. Cystis in Scroto. Wasserbruch im Hodensack (Hydrocele). Cullen 80.

Ordo VI. Ectopiae. Geschwülste von veränderten Lagen der Theile. Vorfall. Bruch. Cullen Cl. IV. Ord. 7.

Partium solidarum e sua sede dimotio sensibus obuia. Eine Veränderung der Lage der Theile, die durch die Sinnen zu erkennen ist.

G. 42.

G. 42. *Exophthalmia.* Bulbi oculi procidentia, aucta, vel non mutata ſenſibiliter natiua, ipſius magnitudine. Vorfall des Augapfels mit vermehrter Größe deſſelben, oder auch ohne daß derſelbe merklich größer geworden iſt. Cullen G. 141.

G. 43. *Blepharoptoſis.* Palpebrae vtriusque vel alterutrius elongatae, retractae, introuerſae, vel extrouerſae ectopia. Vorfall und Heraustreten eines oder beyder Augenlieder, von ihrer Verlängerung, Herumdrehung, u. ſ. w. Cullen G. 141.

G. 44. *Hypoſtaphyle.* Gurgulionis ſeu vuulae laxatae, inflammatae, vlceratae, incraſſatae, attenuatae, bicornis, procidentia. Verlängerung und Vergrößerung des Zapfens von einer Entzündung ꝛc. Geſchwüre, Verdickung, Verdünnung oder Spaltung deſſelben. Cullen G. 141.

G. 45. *Paragloſſe.* Linguae motu deglutitorio in fauces reuolutae vel ore extruſae, exundantis, exertae ectopia. Zurückziehen und Zurückſchlagen der Zunge in den Schlund, oder Hervorragung und Vorfall derſelben aus dem Munde. Cullen G. 141.

G. 46. *Proptoma.* Partis externae, etiam ante lapſum conſpicuae et a palpebris, bulbo oculi, lingua, ac gurgulione diuerſae pro-

cidentia. Vorfall, Verlängerung und Heraustreten von andern Theilen, die schon vorher sichtbar waren und von den Augenliedern, dem Augapfel, der Zunge und dem Zäpfgen verschieden sind, als des Hodensacks, der untern Lippe, der Brüste, der Vorhaut, des Ohrs, u.s.w. Cullen G. 141.

G. 47. *Exania.* Sphincteris ani et intestini recti inuersi, procidentia. Vorfall des Schließmuskels des Afters, und der umgekehrten Haut des Mastdarms. Cullen G. 141.

G. 48. *Exocyste.* Membranae tum vesicae corpus, tum ipsius collum, interne obuestientis procidentia, per meatum vrinarium facta. Heraustreten und Vorfall der innern Haut der Blase und des Blasenhalses durch die Harnröhre bey Weibspersonen. Cullen G. 141.

G. 48. *Hysteroptosis.* Vteri vel vaginae procidentia. Vorfall der Gebärmutter oder Mutterscheide. Cullen G. 141.

G, 50. *Enterocele.* Hernia intestini. Darmbruch. Cullen G. 140.

G. 51. *Epiplocele.* Hernia omenti. Netzbruch. Cullen G. 140.

G. 52. *Gastrocele.* Ventriculi trans laxatos, diductos, regionis epigastricae parietes, imo

et

et per vmbilici annulum elapſi ectopia herniosa. Magenbruch, oder Heraustreten des Magens durch die erſchlafften und aus einander gezogenen Bauchmuskeln in der Gegend der Herzgrube oder durch den Nabel. Cullen S. 140.

G, 53. *Hepatocele.* Hepatis trans laxatos, diductos in vmbilici vicinia abdominis parietes, vel per ipſum vmbilicum ectopia herniosa. Leberbruch, oder Heraustreten der Leber durch die erſchlafften und aus einander gezogenen Bauchmuskel in der Gegend des Nabels, oder durch den Nabel ſelbſt. Cullen S. 140.

G. 54. *Splenocele.* Lienis trans laxatos, diductos abdominis in latere ſiniſtro parietes, vel per inguinalem eiusdem lateris annulum elapſi ectopia herniosa. Milzbruch oder Heraustreten der Milz durch die erſchlafften und aus einander gezognen Bauchmuskeln auf der linken Seite, oder auch durch den linken Bauchring. Cullen S. 140.

G. 55. *Hyſterocele.* Vteri trans annulos inguinales, aut laxatos, diductos inferne abdominis medietatis parietes elapſi ectopia herniosa. Gebärmutterbruch oder Heraustreten der Gebärmutter durch die erweiterten Bauchringe oder die erſchlafften und aus einander ge-

zogenen Bauchmuskeln in der Mitte des untern Theils des Bauches. Cullen G. 140.

G. 56. *Cystocele.* Vesicae vrinariae trans annulos inguinales, sub arcubus cruralibus, et per laxatos, diductos perinaei, hypogastrii, nec non vaginae parietes elapsae ectopia herniosa. Blasenbruch, oder Heraustreten der Blase durch die Bauchringe, unter dem Fallopischen Ligament, oder durch das erschlaffte und aus einander gezogene Mittelfleisch, oder durch den untern Theil der Bauchmuskeln oder die Mutterscheide. Cullen G. 140.

G. 57. *Encephalocele.* Cerebri, cerebelli, aut vtriusque, verbo encephali, per ossium cranii non penitus ossificatorum hiatum prorumpentis, ectopia herniosa. Gehirnbruch des großen oder kleinen Gehirns oder beyder zusammen, durch eine Oefnung der noch nicht ganz verknöcherten Schädelknochen. Cullen G. 140.

G. 58. *Hysteroloxia.* Vteri, saepius grauidi, et contra quam in hysterocele fit, abdominis claustris contenti, situs in obliquum errans. Schiefe Lagen der schwangern oder nicht schwangern Gebärmutter, die hier im Unterleibe enthalten ist, und nicht wie bey dem Mutterbruch herausfällt. Cullen bey G. 141.

G. 59. *Parorchidium.* Testiculi vnius, vel vtrius-

vtriusque, cuius post natiuitatem sedes naturalior scrotum est, situs in alienum aberrans. Zu spätes Herabsteigen oder Zurückziehen eines oder beyder Hoden, oder widernatürliche Lage desselben außer dem Hodensacke. Cullen bey G. 141.

G. 60. *Exarthrema.* Separatio contigui in ossium articulis diarthrosice, non vero immobiliter combinatis. Verrenkung oder Trennung der durch eine bewegliche Gelenkfügung verbundenen Knochen. Cullen G. 142.

G. 61. *Diastasis.* Ossium, cartilaginum, immobiliter combinatorum, separatio, seu recessus ab inuicem partialis vel totalis. Partielle oder vollkommene Trennung zusammengewachsener Knochen oder Knorpel. Cullen G. 142.

G. 62. *Loxarthrus.* Ossium cum motu sensibili articulatorum situs relatiuus in alienum constanter mutatus, aut obliquitas respectiua persistens citra exarthrema et spasmum. Anhaltende Verdrehung der Glieder, die mit einer beweglichen Gelenkfügung verbunden sind, oder verhältnißmäßige schiefe Lage derselben gegen einander, ohne daß eine Verrenkung oder Krampf vorhanden ist.

Ordo VII. Plagae. Wunden und Verletzungen. Solutiones continui. Trennung des Zusammenhangs. Cullen Cl. IV. O. 8.

G. 63. *Vulnus.* Solutio mechanica continui in carnibus cum labiorum hiatu, initio cruenta, dein ad inflammationem suppurationemque tendens. Wunde. Trennung des Zusammenhangs weicher fleischigter Theile, wobey zuerst die Lippen der Wunden von einander stehen, und hernach eine Entzündung und Vereiterung folget. Cullen G. 143.

G. 64. *Punctura.* Continui solutio intus tantum extensa. Stich. Trennung des Zusammenhangs, die sich nur nach innen zu erstrecket. Cullen G. 143.

G. 65. *Excoriatio.* Cuticulae vel cutis a carnibus subiectis separatio. Wundwerden oder Absonderung der Oberhaut und Haut von dem darunter liegenden Fleische.

G. 66. *Contusio.* Textus carnosi, potissimum infra cutem, ruptio per minima puncta et vasorum contritio, ecchymoma saepius inferens. Quetschung oder Zerreißung des fleischigten Gewebes, vornehmlich unter der Haut, an kleinen Stellen, und Zermalmung der kleinen Gefäße, wodurch oft ein Unterlaufen des Blutes verursacht wird.

G. 67. *Fractura.* Separatio violenta et mechanica ossis in fragmenta inuicem non cohaerentia. Knochenbruch oder gewaltsame

Zer=

Zertheilung eines Knochens in kleine nicht mehr zusammenhängende Stücke. Cullen G. 148.

G. 68. *Fissura.* Separatio ossis in duas partes rima tantum dissitas, et alterutro saltem extremo cohaerentes. Knochenspalte oder Absonderung eines Knochens in zwey Theile, die nur durch einen Riß von einander getrennt sind, und an einem von den andern Enden noch zusammenhängen. Cullen bey G. 148.

G. 69. *Ruptura.* Tendinum vel ligamentorum aut cartilaginum solutio, vel vehemens distractio, cum vel sine exarthremate. Zerreißung oder gewaltsame Trennung der Bänder, Flechsen oder Knorpel mit oder ohne eine Verrenkung. Cullen bey G. 143.

G. 70. *Amputatura.* *Linn.* G. 241. Solutio continui in partibus tum mollibus, tum osseis, cum artus, articuli, vel partis totali separatione a residuo trunco. Ablösung eines Gliedes oder Theils vom übrigen Körper. Cullen G. 143.

G. 71. *Vlcus.* Partium mollium erosio purulenta, cute profundior, cum pure ichoroso vel vtcumque vitioso. Geschwür, oder eine eitrige Zerfressung weicher Theile, die tiefer als die Haut ist, und ein jauchigtes oder sonst verderbtes Eiter enthält. Cullen G. 144.

G. 72. *Exulceratio.* Excoriatio vlcerosa suppurans. Eiternde und schwährende wundgewordene Stelle. Cullen S. 144.

G. 73. *Sinus.* Cauitas vlcerosa, cuius fundus amplus saepe multiplex desinit in angustum orificium. Geschwürartige Höhlung, deren Grund weit und oft in viele Gänge zertheilt ist, und sich mit einer engen Oefnung endiget. Cullen S. 144.

G. 74. *Fistula.* Cauitas vlcerosa, sinuosa, cuius parietes callosi sunt vt plurimum, aut fundus ad os cariosum, arthrocace corruptum, pertingit. Fistulöses Geschwür, oder eine geschwürartige und sinuöse Höhlung, die callöse Ränder hat, oder deren Grund bis auf einen cariösen Knochen gehet. Cullen S. 144.

G. 75. *Rhagas.* Solutio continui sicca in partium marginibus. Trocknes Aufspringen der Ränder eines Theils. Cullen bey S. 143.

G. 76. *Eschara.* Crusta sicca, mortua, fluidis solidisque corporis humani coagmentata. Borke, oder eine trockne abgestorbene Rinde, die aus den festen und flüssigen Theilen des Körpers zusammengehäufet ist.

G. 77. *Caries.* Ossis suo periosteo denudati deco-

decoloratio, aſperitas, exfoliatio et ſubſequens fragilitas ac eroſio. Knochengeſchwür, Knochenfäule: oder wenn ein von ſeiner Beinhaut entblößter Knochen mißfärbig und rauh wird, ſich losblättert, brüchig und angefreſſen wird. Cullen G. 149.

G. 78. *Arthrocace*. Vlcus medullae oſſium ſaepius in epiphyſibus, cum carie, exoſtoſi et dolore. Winddorn. Ein Geſchwür des Knochenmarks, das oft an den Anſätzen der Knochen entſtehet, und mit einer Beinfäule, Knochengeſchwulſt und Schmerz verknüpft iſt. Cullen G. 7. 2.

Classis II. Febres. Fieber.

Pulsus magnitudo et frequentia cum frigore in insultu, feruore in decursu, madore in declinatione, et semper virium prostratione maiori, quam a virium vitalium gradu foret expectandum. Ein großer und geschwinder Puls; im Anfang ein Frost; im Fortgang Hitze und bey der Abnahme eine Feuchtwerden der Haut, wobey jederzeit eine größere Entkräftung vorhanden ist, als man es nach dem Grad und Stärke der Lebenskräfte vermuthen sollte. Cullen Cl. 1.

Ordo I. Continuae. Anhaltende Fieber.

Impetus febrilis a frigore saepius exordiens sine exacerbatione partiali, et sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense reuertens, ad vsque finem aegritudinis perseuerat. Es dauert der Fieberanfall, der oft seinen Anfang mit einem Frost nimmt, und ohne partielle Exacerbation und einen neuen Anfang, nicht mehr als einmal oder zweymal binnen Monatsfrist wiederkömmt, bis zu Ende der Krankheit in einem fort. Cullen Cl. I. O. 2.

G. 1. (79.) *Ephemera.* Decursus aegritudinis intra dimidiam septimanam absoluitur. Vis morbi subito accedit. Kurzes hitziges Fieber, das den Kranken mit seiner ganzen Stärke plötzlich

plötzlich befällt, und binnen drey bis vier Tagen vorbey ist. Es ist also dieses Fieber von der *Ephemera* anderer Schriftsteller sehr verschieden. Cullen G. 4.

G. 2. (80.) *Synocha.* Decursus intra septimanam, incrementum successiuum. Längeres hitziges Fieber. Es dauert eine Woche und nimmt nach und nach zu. Vergleiche Cullen G. 4.

G. 3. (81.) *Synochus Galeni.* Decursus ad duas tresue septimanas, cum pulsus robore sanum in morbi statu saltem, notabiliter superante. Langes hitziges Fieber mit starkem Puls. Es dauert zwey bis drey Wochen und der Puls ist, wenigstens wenn die Krankheit am stärksten ist, weit stärker als bey einem Gesunden. Vergleiche Cullen G. 6.

G. 4. (82.) *Typhus.* Decursus vltra duas septimanas, saepius tres, cum calore et urina sanorum similibus, pulsuque quoad frequentiam sano fere simili, et quoad robur non maiori, artubus interea maxime prostratis. Hitziges Fieber mit weniger starkem Puls und großer Schwäche. Faul- und Nervenfieber. Es dauert zwey ja oft drey Wochen, die Hitze und der Urin sind wie bey Gesunden, auch der Puls ist nicht geschwinder noch stärker, der

Patiente aber ist sehr schwach und kann sich nicht bewegen. Cullen G. 5.

G. 5. (83.) *Hectica Galeni et eius sequacium Sydenham.* p. 524. Decursus vltra mensem, debilitas parua, pyrexia exigua, cum pulsu post pastum frequentiori. Hectisches Fieber. Es dauert länger als einen Monat, der Patiente ist nicht sehr schwach, die Fieberanfälle sind geringe, und der Puls nach dem Essen geschwinder. Cullen G. 6. S. 103.

Ord. II. Remittentes. **Remittirende oder nachlassende Fieber.**

Pyrexia pluries in decursu morbi crescit et decrescit, non omnino recedit, typus saepe confusus. Der Fieberanfall nimmt in dem Verlauf der Krankheit vielmahl zu und wieder ab, verliert sich aber nie gänzlich; der Gang des Fiebers selbst ist unordentlich. Cullen Cl. II. O. 1.

G. 6. (84.) *Amphimerina.* Remissio quotidianae typum seruat. Exacerbationes cum horrore. Alltägliches remittirendes Fieber, die Verdoppelung fängt sich mit einem Frost an. Cullen G. 3. 2.

G. 7. (85.) *Tritaeophya.* Remissionis typus tertianarius, frigus fere nullum. Dreytägiges remittirendes Fieber, dabey fast nie ein Frost vorhanden ist. Cullen G. 1. 2.

G. 8.

G. 8. (86.) *Tetartophya.* Remissio quartanae typum seruans. Viertägiges remittirendes Fieber. Cullen G. 2. 2.

Ord. III. Intermittentes. Intermittirende oder Wechselfieber.

Pyrexia plures in decursu aegritudinis deserit et recurrit, cum interuallis lucidis. Der Fieberanfall verliert sich in der Krankheit oft und kömmt wieder, so daß sich der Patiente in der Zwischenzeit ohne Fieber befindet. Cullen Cl. I. O. 1.

G. 9. (87.) *Quotidiana.* Accessus similes quolibet die accidunt. Alltägliches Fieber, wo täglich ähnliche Anfälle kommen. Cullen 3.

G. 10. (88.) *Tertiana.* Accessus similes diebus alternis reuertuntur. Dreytägiges Fieber, wo der Anfall einen Tag um den andern wiederkömmt. Cullen 1. 1.

G. 11. (89.) *Quartana.* Accessus similes duobus interpositis diebus redeunt. Viertägiges Fieber, wo die Anfälle so wiederkommen, daß der Patiente dazwischen zwey Tage frey ist. Cullen 2. 1.

G. 12. (90.) *Erratica.* Accessus similes distantes ab inuicem pluribus quam quatuor diebus, aut typi omnino incerti. Unordentliche Wechselfieber, wo die Anfälle später als nach vier Tagen wiederkommen, oder gar keine rechte Zeit und Gang halten. Cullen S. 79.

Classis

Classis III. Phlegmasiae. *Galen.* Entzündungskrankheiten.

Pyrexia continua vel remittens cum interna inflammatione, vel cum exanthematis. Das Fieber ist anhaltend oder remittirend, und es ist eine innerliche Entzündung oder auch ein Exanthem vorhanden. Cullen Cl. I. O. 2.

Ordo I. Exanthematicae. Exanthem- oder Ausschlagsfieber.

Eruptiones cutaneae cum pyrexia saepius maligna, quandoque lenta. Ausschläge der Haut, oft mit einem bösartigen, zuweilen auch mit einem langsamen schleichenden Fieber. Cullen.

G. 1. (91.) *Pestis.* Eruptio bubonum, anthracum, pyrexia typhodes. Pest. Es kommen Beulen und Carfunkel zum Vorschein, das Fieber ist von der Art der Faulfieber. Cullen G. 26.

G. 2. (92.) *Variola.* Eruptio pustularum phlegmonodearum in suppurationem tendentium. Die Blattern. Es kommen entzündungsartige Pusteln zum Vorschein, die vereitern. Cullen G. 27.

G. 3. (93.) Eruptio phlyctaenarum auellanae circiter magnitudine sero dilute flauo turgidarum.

turgidarum. Blasenfieber, wobey Blasen von der Größe einer Haselnuß zum Vorschein kommen, die mit einem gelben Wasser erfüllt sind. Cullen G. 33.

G 4. (94.) *Rubeola.* Eruptio papularum in squamulas furfuraceas abeuntium. Praecedit tussis sicca, sternutatio, lacrymatio, et febris catarrhalis. Die Masern. Es kommen kleine erhabene Flecke zum Vorschein, die sich kleyenartig abschuppen, und es geht ein trockner Husten, Niesen, Thränen der Augen und ein Catarrhalfieber vorher. Cullen G. 29.

G. 5. (95.) *Miliaris.* Eruptio phlyctaenarum milii semine non maiorum. Frieselfieber. Es kommen kleine Bläsgen zum Vorschein, die nicht größer als Hirsenkörner sind. Cullen G. 30.

G. 6. (96.) *Purpura.* Eruptio maculosa purpurea, liuida, vel atra, indolens, cum typho vel remittente febre. Peteschen. Rothe, braune oder schwarze Flecke, die keinen Schmerz machen, bey einem Faul- oder remittirenden Fieber. Cullen bey G. 34.

G. 7. (97.) *Erysipelas.* Eruptio erythematis cum synocha febre. Rothlaufsfieber, mit einem rosenartigen Ausschlag (G. 11.) und einem längern hitzigen Fieber. Cullen G. 25.

G. 8. (98.) *Scarlatina.* Eruptio maculosa, rubra, pruriens, papulosa, lata, parum vniformis, in squamulas furfuraceas abiens, sed sine praeludio catarrhali, et saepe ad secundam tertiamue vicem se prodens ac recondens vicissim. Scharlachfieber. Es kommen rothe, juckende, etwas erhabene, breite, einander wenig ähnliche Farbe zum Vorschein, die in kleyenartige Schuppen abgehen. Es gehen aber keine catharrhalischen Zufälle vorher, und sie kommen oft zwey bis dreymahl wieder, und verschwinden auch eben so oft. Cullen S. 31.

G. 9. (99.) *Essera.* Eruptio vt plurimum apyreta, suberysipelatosa, subito accedens per vices et recedens. Nesselfieber. Der Ausschlag ist gemeiniglich ohne Fieber, dem Rothlauf etwas ähnlich, und kömmt oft plötzlich und vergeht auch eben so geschwinde wieder. Cullen S. 32.

G. 10. (100.) *Aphtha.* Eruptio pustulosa, phlyctaenodes, et vlcerosa, in ore aut pudendis. Schwämmchen. Es kommen bläschenartige und geschwürartige Blüthgen im Munde oder an den Zeugungstheilen zum Vorschein. Cullen S. 34.

Ordo

Ordo II. Membranaceae. Entzündungen membranöser Theile.

Pyrexia magna, typo synochae vel synochi cum dolore visceris cuiusdam. Entzündungen membranöser Theile. Das Fieber ist stark und einem längern oder langen hitzigen Fieber (G. 80 und 81) ähnlich, und der Patiente empfindet in einem innerlichen Theile Schmerzen. Cullen. Cl. I. O. 2.

G. 11. (101) *Phrenitis.* Dolor capitis, delirium audax, vis artuum, pulsusque maior, pyrexia acuta. Hirnwuth. Entzündung der Hirnhäute. Ein Kopfschmerz, wüthendes Phantasiren, stärkere Gewalt der Glieder und Puls als im natürlichen Zustande, und ein starkes hitziges Fieber. Cullen G. 9.

G. 12. (102) *Paraphrenesis.* Symptomata phrenititis et peripueumoniae. Sogenannte Entzündung des Zwerchfells, oder Zufälle der Hirnwuth und Lungenentzündung zugleich. Cullen. 11. 2.

G. 13. (103) *Pleuritis.* Dolor lateris, respiratio et pulsus frequens, tussis. Seitenstechen. Entzündung des Rippenfells mit Seitenschmerz, einem geschwinden Athemhohlen und Puls, und einem Husten. Cullen 11. 2.

G. 14. (104) *Gastritis.* Dolor epigastrii, nausea, vomituritio, febris typhodes, vel remittens maligna. Magenentzündung.

Schmerz in der Gegend des Magens, Erbrechen und Würgen und ein faulichtes oder ein bösartiges nachlassendes Fieber. **Cullen** G. 14.

G. 15. (105) *Enteritis*. Dolor circa vmbilicum vehemens, cum meteorismo, pyrexia acuta, ileo, vel dysenteria. Darmentzündung. Ein heftiger Schmerz in der Gegend des Nabels, mit Auftreten des Unterleibes, einem hitzigen Fieber, der Darmgicht oder Ruhr. **Cullen** G. 15.

G. 16. (106) *Epiploitis*. Dolor circa hypogastrium, et vmbilicum iuxta epiploi extensionem. Entzündung des Netzes. Schmerz iu der Gegend der Blase und um den Nabel, längst der Gegend wo sich das Netz erstreckt. **Cullen**. G. 13. 2.

G. 17. (107) *Metritis*. Dolor et tumor in regione et extensione vteri ac lumbis et inguinibus cum febre. Entzündung der Gebärmutter. Schmerz und Geschwulst in der Gegend der Gebärmutter, den Lenden und Leisten mit Fieber. **Cullen** G. 20.

G. 18. (108) *Cystitis*. Dolor, tumor, tensio hypogastrii, cum dysuria vel ischuria. Blasenentzündung. Schmerz, Geschwulst und Spannung in der Gegend der Blase, mit einem beschwerlichen oder gänzlich verstopften Abgang des Urins. **Cullen** G. 19.

Ordo

Ordo III. Parenchymatosae. Entzündung der Substanz der Eingeweide.

Dolor obtusus, calor et tumor in visceribus farctis, non sacciformibus, cum pyrexia acuta, suppurationis apparatu. Ein stumpfer Schmerz, Hitze und Geschwulst in solchen Eingeweiden, deren Substanz mit Etwas erfüllt ist, und die nicht Säcke oder Behälter bilden, mit einem heftigen Fieber und einer Vereieiterung. Cullen Cl. I. O. 2.

G. 19. (109) *Cephalitis*. Febris acuta cum delirio somnolento, et carphologia. Entzündung der Substanz des Gehirns. Ein starkes hitziges Fieber mit einem Phantasiren, wobey der Patiente immer in Schlaf liegt und auf dem Bette Flocken zupft. Cullen G. 9.

G. 20. (110) *Cynanche*. Dolor gutturis cum dispnoea strangulante, dysphagia, et pyrexia acuta. Halsentzündung mit einem Schmerz des Halses, einem beträchtlichen erstickenden Athemhohlen, verhinderten Schliugen und starkem Fieber. Cullen G. 10.

G. 21. (111) *Carditis*. Dolor sub sterno, pulsus inaequalis, frequens, palpitatio, et cardialgia, cordis anxietas. Entzündung des Herzens. Ein Schmerz unter dem Brustbein, mit einem ungleichen geschwinden Puls, Herzklopfen, heftigen Schmerzen in der Gegend des

Herzens und Magenschlunds und einer Aengstlichkeit um das Herz. **Cullen** 12.

G. 22. (112) *Peripneumonia.* Pyrexia acuta, dyspnoea grauis, grauatiuus pectoris dolor, tussis cruenta, pulsus mollis. Lungenentzündung. Ein heftiges hitziges Fieber, mit sehr beschwerlichem Athemhohlen. Ein stumpfer Schmerz in der Brust, blutiger Auswurf und weicher Puls. **Cullen** 11. 1.

G. 23. (113) *Hepatitis*, (*Galeni* I. Epid. Comm. 3.) Dolor, tensio, calor in regione hepatis, cum pondere, tussi sicca, respiratione difficili. Leberentzündung. Ein Schmerz, Spannung, Hitze, und Schwere in der Gegend der Leber, mit trocknem Husten und beschwerlichem Athemhohlen. **Cullen** 16.

G. 24. (114) *Splenitis.* Dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tolerans, cum febre vt plurimum remittente. Milzentzündung. Schmerz und Geschwulst in der Gegend der Milz, der so heftig ist, das er fast keine Berührung verträgt, mit einem meistentheils remittirenden Fieber. **Cullen** 17.

G. 25. (115) *Nephritis.* Dolor acutus in regione renum iuxta vreteres in vesicam directus,

rectus, cum febre acuta, dysuria, ischuriaue etc. Nierenentzündung. Ein heftiger Schmerz in den Nieren, der sich långst des Ganges der Harngånge in die Blase erstreckt, mit einem heftigen Fieber, und einem beschwerlichen oder gänzlich verhinderten Urinlassen. Cullen 18.

Classis IV. Spasmi. Krampfichte Krankheiten.

Contractio inuita, constans vel interpolata, musculorum organis locomotiuis, non vitalibus inservientium. Unwillkührliche anhaltende oder abwechselnde Zusammenziehungen der Muskeln, die zu den willkührlichen Bewegungen dienen. Cullen. Cl. II. O. 3.

Ordo I. Tonici partiales. Anhaltende Zusammenziehungen besondrer Theile.

Rigiditas et immobilitas artus vel organi determinati. Eine Steifigkeit und Zusammenziehung eines gewissen Werkzeugs oder Gliedes. Cullen. a. a. O.

G. 1. (116) *Strabismus.* Oculi spasmus axium opticorum diuergentiam inferens. Verdrehung der Augen. Schielen. Krampf der Augen, der da macht, daß die Achsen derselben nicht mehr zusammenlaufen, sondern aus einander gehen. Cullen 113.

G. 2. (117) *Trismus.* Maxillae inferioris spasmus tonicus, vel clonicus. Krampfigter oder auch convulsivischer Krampf der Kinnlade. Cull. 48.

G. 3. (118) *Obstipitas.* Colli spasmus tonicus, capitis natiuam mobilitatem et directionem mutans. Spastisches Verdrehen des Halses, wodurch die natürliche Beweglichkeit und Richtung desselben verändert wird. Cullen 114.

G. 4.

G. 4. (119) *Contractura.* Artus cuiusdam, vt brachii, vel cruris, conſtans, diuturna rigiditas, ſenſim exorta. Spaſtiſche nach und nach entſtandne und anhaltende Steifigkeit, eines Gliedes, als des Arms und Fußes. Cullen 114.

G. 5. (120) *Crampus.* Subitanea, fugax, dolorifica muſculi rigiditas. Krampf. Plötzliche, vorübergehende, und ſchmerzhafte Steifigkeit eines Muſkels.

G. 6. (131) *Priapiſmus.* Penis iniucunda rigiditas. Schmerzhafte Steifigkeit des männlichen Gliedes.

Ordo II. Tonici generales. Allgemeine anhaltende Zuſammenziehungen.

Rigiditas totius fere corporis. Eine Steifigkeit faſt des ganzen Körpers. Cullen. Cl. II. O. 3.

G. 7. (122) *Tetanus.* Spaſmus generalis ſubito ortus, cum dyſpnoea. Ein allgemeiner plötzlich entſtandner Krampf, wobey dem Patienten das Athemhohlen ſehr beſchwerlich fällt. Cullen G. 47.

G. 8. (123) *Catochus.* Spaſmus generalis ſenſim factus, ſine dyſpnoea. Ein allgemeiner Krampf, der langſam entſtehet und wobey der Athem nichts leidet. Cullen G. 47.

Ordo III. Clonici partiales. Partielle Zuckungen.

Agitatio inuita et coacta cuiusdam organi, vel artus, cuius motiuum non percipitur. Unwillkührliche und gezwungene Bewegung eines Werkzeugs oder Theiles, deren Ursache man nicht bemerkt. Cullen S. a. a. O.

G. 9. (124) *Nystagmus.* Spasmus clonicus oculi, palpebraeue. Convulsivische Bewegungen des Auges oder der Augenlieder.

G. 10. (125) *Carphologia.* Motus velut conuulsiuus manuum, quo aegri floccos e vestibus euellere, paleas colligere, muscas venari, etc. videntur. Eine gleichsam convulsivische Bewegung der Hände, wobey es scheint, als wenn die Patienten die Flocken von den Kleidern und den Bettdecken zupften, Strohhälmer zusammen läsen, nach Fliegen griffen u. s. w.

G. 11. (126) *Pandiculatio.* Distensio semiuoluntaria plurimum vel omnium successiue membrorum, vt plurimum cum oscitatione. Das Ausdehnen der Glieder, oder eine halbwillkührliche Ausdehnung der meisten oder aller Glieder nach einander, die gemeiniglich mit einem Gähnen verbunden ist.

G. 12. (127) *Apomyttosis.* Succussio cutis et capitis tremula, violenta, cum expiratione sonora, quasi stertorosa. Schaudern oder eine zitternde, heftige Erschütterung der Haut und des Kopfs, die mit einem starken schallenden,

lenden gleichsam schnarchenden Ausathmen verbunden ist.

G. 13. (128) *Conuulsio*. Agitatio inuita artus vel musculi breuis, et superstite in paroxysmis animae functionum exercitio. Zuckung. Eine wider Willen erfolgende kurze Erschütterung eines Gliedes oder Muskels, wobey der Patiente im Anfall sein Bewußtseyn behält. Cullen G. 49.

G. 14. (129) *Tremor*. Artus alterna per itus vel reditus frequentes motitatio, cum mouendi facultate concurrens. Zittern, oder eine oftmahlige hin und her erfolgende Bewegung eines Gliedes, die mit der Fähigkeit zur Bewegung übereinstimmt. Cullen bey G. 42.

G. 15. (130) *Palpitatio*. Pulsatio in regione cordis pulsui arteriarum numerō, minime vero intensitate respondens. Herzklopfen oder ein Schlagen in der Gegend des Herzens, das mit dem Pulsschlage in Ansehen der Anzahl, keinesweges aber in Ansehung der Kraft übereinstimmt. Cullen G. 53.

G. 16. (131) *Claudicatio*. Inter gradiendum cruris motus, quo centrum grauitatis trunci sensibiliter, dextrorsum vel sinistrorsum transfertur. Das Hinken, oder eine gewisse Bewegung des Beins bey dem Gehen, wodurch der Mittelpunkt der Schwere des Kör-

pers merklich auf die rechte oder linke Seite verschoben wird.

Ordo IV. Clonici generales. Allgemeine Zuckungen.

Spasmi clonici vel totius corporis, vel ad plures partes extensi. Zuckungen, die den ganzen Körper oder doch viele Theile desselben befallen. Cullen. a. a. O.

G. 17. (132) *Rigor.* Totius cutis succussio frigorifera. Eine frostbringende Erschütterung der ganzen Haut.

G. 18. (133) *Eclampsia.* Artuum vel musculorum plurimorum spasmus clonicus acutus, cum sensuum obscuratione. Plötzliche allgemeine Zuckungen, wobey der Patiente sein Bewußtseyn und den Gebrauch der Sinne u. s. w. verliert. Cullen G. 52.

G. 19. (134) *Epilepsia.* Spasmus clonicus periodicus, chronicus artuum, cum sensuum obscuratione. Epilepsie. Fallende Sucht oder periodische chronische allgemeine Zuckungen, wobey der Kranke das Bewußtseyn verliert. Cullen G. 52.

G. 20. (135) *Hysteria.* Artuum organorumque etiam internorum spasmus clonicus, tonicusue, paroxysmis fugacibus leuiter variantibus, cum mortis formidine intensissima.

Hyste-

Hysterischer Anfall, oder Zuckungen und Krämpfe der Glieder, und auch der innern Theile, die bald vorübergehen, leichte Abänderungen unter sich machen, und wobey der Patiente sehr ängstlich ist und sich für dem Tod fürchtet. Cullen S. 62.

G. 21. (136) *Scelotyrbe.* Motus semiuoluntarius vel vnius lateris, vel totius corporis, inter gradiendum, gesticulationem, aut ridiculam histrionis festinationem referens. Veitstanz, oder eine halbwillkührliche Bewegung der einen Seite oder des ganzen Körpers, bey dem Gehen, welches den Minen oder dem lächerlichen Gang eines Harlekins ähnlich ist. Cullen S. 50.

G. 22. (137) *Beriberia.* Motus gradientium genua retrahens cum tremore, formicationis sensu, vocis raucedine, indis familiaris. Eine in Indien gewöhnliche Krankheit, wobey die Knie zurück gezogen werden, und zittern, der Patiente in solchen eine Empfindung hat, als wenn Ameisen darinnen liesen, und dabey heischer ist.

Classis

Classis V. Anhelationes. Aengstliches Athemhohlen. Engbrüstigkeiten.

Agitatio inuita, defatigans, musculorum pectoris, vnde respiratio difficilis, frequens, sine febre acuta. Eine unwillkührliche und ermüdende Bewegung der Brustmuskeln, wodurch das Athemhohlen erschwert und geschwinder gemacht wird, wobey aber kein hitziges Fieber vorhanden ist. Cullen Cl. II. O. 3. und 4.

Ordo I. Spasmodicae. Krampfigte Engbrüstigkeiten.

Insultus fugaces, sed saepius iterati spasmodicorum motuum pectoris, cum respiratione sonora. Bald vorübergehende, aber öfters wiederkommende spastische Bewegungen der Brust, mit einem schallenden Athemhohlen.

G. 1. (138) *Ephialtes.* Anhelatio difficilis, querula, cum insomnio terrifico. Das Alpdrücken oder ein beschwerliches Athemhohlen, wobey der Patiente einen klagenden Ton von sich giebt und einen schreckhaften Traum hat. Cullen G. 67.

G. 2. (139) *Sternutatio.* Concussio violenta pectoris, cum respiratione veloci, narium interiora euerrente et sonora. Das Niesen

sen, oder eine heftige Erschütterung der Brust mit einem sehr geschwinden und mit einem Schall verknüpftem Athemhohlen, wodurch das was in der Nase inwendig befindlich ist, mit Gewalt ausgeleert oder ausgeschneuzt wird.

G. 3. (140) *Oscedo.* Diutina lenta, profunda inspiratio, ore hiante, saepius cum pandiculatione. Das Gähnen, oder ein langwieriges, langsames, tiefes Athemhohlen, wobey man den Mund öffnet, und öfters auch sich dehnt.

G. 4. (141) *Singultus.* Concussio diaphragmatis cum inspiratione subito interrupta, sonora. Der Schlucken: eine heftige Erschütterung des Zwerchfells mit einem plötzlich unterbrochenen und mit einem Schall verknüpften Einathmen.

G. 5. (142) *Tussis.* Concussio sonora, violenta pectoris cum exspiratione ad pulmonem a quodam obice liberandum. Der Husten. Eine mit einem Schall verknüpfte und heftige Erschütterung der Brust, mit einem Ausathmen, wobey man die Lungen von etwas, das sie beschwert, zu entledigen sucht. Cullen G. 39. beym Catarrh.

Ordo II. Oppressiuae. Anhaltende Engbrüstigkeiten.

Non fugaces, sed constantes respirandi difficultates,

tates, cum pectoris non raro oppressione, frequenti anhelitu, difficultate illius suspendendi, sine metu suffocationis. Nicht vorübergehende sondern anhaltende Engbrüstigkeiten, oft mit einer Beklemmung der Brust, öfterm kurzen Athemhohlen, und einer Schwierigkeit solches, ohne Gefahr des Erstickens auszusetzen.

G. 6. (143) *Stertor.* Respiratio inter inspirandum, sonum grauem, tremulum, in gutture edens, saepe cum alterno sibilo. Schnarchen, oder ein Athemhohlen, wobey man bey dem Einathmen einen tiefen, zitternden Ton in der Kehle hören läßt, auf den oft ein wechselsweises pfeifendes Geräusch bey dem Ausathmen folget.

G. 7. (144) *Dyspnoea.* Difficultas respirandi chronica, non intermittens, sine signis hydrothoracis vel empyematis. Eine chronische anhaltende Engbrüstigkeit ohne Zeichen einer Brustwassersucht oder Eiterbrust. **Cullen G. 55.**

G. 8. (145) *Asthma.* Difficultas respirandi periodice recurrens, chronica. Periodische chronische Engbrüstigkeit. **Cullen G. 54.**

G. 9. (146) *Orthopnoea.* Praeceps vt plurimum et acuta respirandi difficultas. Steckfluß, oder eine heftige Engbrüstigkeit, die den Patienten schleunig befällt. **Cullen G. 55.**

G. 10. (147) *Angina.* Difficultas respirandi, cum sensu obicis in gutture, et saepe deglutitione

difficili,

difficili, ſine phlegmaſia. Halsübel ohne Entzündung, oder eine Schwierigkeit des Athemhohlens, mit der Empfindung einer im Halſe befindlichen Hinderniß, und oft auch mit einem beſchwerlichen Hinterſchlingen, wobey aber keine Entzündung vorhanden iſt.

G. 11. (148) *Pleurodyne.* Pectoris, lateris-ve dolor pungitiuus, cum reſpirandi difficultate citra phlegmaſiam acutam. Bruſt- oder Seitenſchmerz. Ein ſtechender Schmerz in der Bruſt und Seite mit einer Schwierigkeit bey dem Athemholen, ohne daß eine hitzige Entzündungskrankheit vorhanden iſt. **Cullen** einige Arten bey G. 21.

G. 12. (149) *Rheuma.* Difficultas reſpirandi cum ſenſu grauitatis in pectore, quam comitantur vel praecedunt coryza, ſternutatio, raucedo. etc. Catarrh, oder beſchwerliches Athemhohlen mit der Empfindung einer Schwere und Drücken in der Bruſt, wobey ein Schnupfen, Nieſen, Heiſcherkeit und andere dergleichen Zufälle zugegen ſind, oder vorhergehen. **Cullen.** G. 39.

G. 13. (150) *Hydrothorax.* Difficultas reſpirandi decubitu horizontali aucta, cum faciei pallore, manuum et pedum oedemate, ſymptomatis ephialticis, alterutrius brachii ſtupore et aegritudine chronica, non

remit-

tente. Brustwassersucht. Ein beschwerliches Athemholen, das bey einer horizontalen Lage des Körpers vermehrt wird, wobey das Gesicht blaß aussiehet, die Hände und Füße mit einer wässerichten Geschwulst befallen sind, der Patiente Zufälle vom Alp (G. 138.) hat, der eine Arm eingeschlafen ist und der Patiente chronisch krank ist, ohne daß die Krankheit je nachlässet. Cullen 77.

G. 14. (151) *Empyema.* Symptomata hydrothoracis, praegressa pulmonis inflammatione suppurata et comitante febre hectica. Eiterbrust. Die Zufälle sind wie bey der Brustwassersucht, es ist aber eine Entzündung der Lunge vorhergegangen, die vereitert ist, und der Patiente hat noch ein hectisches Fieber dabey. Cullen bey G. 11.

Classis

Classis VI. Debilitates. Schwächen.

Impotentia clare et distincte sentiendi, appetendi, consueta vi artus organaue mouendi, nec non imaginandi, vigilandi, etc. Ein Unvermögen deutlich und bestimmt zu empfinden, zu verlangen, die Glieder mit der gewöhnlichen Gewalt zu bewegen, ingleichen ein Unvermögen der Einbildungskraft, Unvermögen zu Wachen u. s. w.

Ordo I. Dysaesthesiae. Fehler der Sinnen.

Impotentia clare ac distincte sentiendi sine sopore. Unvermögen klar und deutlich zu empfinden, ohne daß der Patiente in einem Sopor liegt. Cullen Cl. IV. O. 1.

G. 1. (152.) *Cataracta.* Visus debilitas ob maculam opacam pone pupillam. Staar, oder Schwäche des Gesichts wegen eines hinter der Pupille befindlichen Fleckens. Cull. G. 91.

G. 2. (153.) *Caligo.* Visus debilitas obicibus opacis citra pupillam positis. Verdunkelung oder Schwäche des Gesichts, wobey das verdunkelnde Hinderniß des deutlichen Sehens vor der Pupille liegt. Cullen G. 92.

G. 3. (154.) *Amblyopia.* Visus debilitas respective ad situm, gradum lucis, distantiam obiecti, oculis pellucidis. Schwäche des Ge-

in Rücksicht auf die Lage, den Grad des Lichtes, und die Weite des Gegenstandes, wobey die Augen selbst durchsichtig und hell sind. Cull. S. 92.

G. 4. (155.) *Amaurosis.* Visus debilitas absoluta sine vlla organorum opacitate inassueta. Schwarzer Staar. Völlige Schwäche des Gesichts ohne eine ungewöhnliche Undurchsichtigkeit der Werkzeuge des Sehens. Cull. S. 92.

G. 5. (156.) *Anosmia.* Odoratus debilitas aut olfaciendi impotentia. Schwäche oder gänzlicher Mangel des Geruchs. Cullen S. 97.

G. 6. (157.) *Agheustia.* Gustus debilitas aut gustandi impotentia. Schwäche oder gänzlicher Mangel des Geschmacks. Cullen S. 98.

G. 7. (158.) *Dysecoea.* Auditus debilitas obicibus extra labyrinthum positis. Schwäche des Gehörs, wo die Ursache desselben außer dem Labyrinth lieget. Cullen S. 95.

G. 8. (159.) *Paracusis.* Voces articulatas distincte audiendi difficultas vel impotentia. Schwierigkeit oder gänzliches Unvermögen, die Wörter deutlich zu hören. Cullen S. 96.

G. 9. (160.) *Cophosis.* Sonos etiam simplices percipiendi vel audiendi difficultas vel impotentia, obice intra vel vltra labyrinthum posito. Schwierigkeit und Unvermögen, auch selbst die einfachen Töne zu hören, wobey die

Ursache

Ursache innerhalb oder noch hinter dem Labyrinthe liegt. Cullen G. 95.

G. 10. (161.) *Anaesthesia.* Tactus in toto corpore debilitas vel obscuritas sine stupore et sopore. Schwäche oder Dunkelheit des Gefühls im ganzen Körper ohne Stupor und Sopor. Cullen G. 99.

Ordo II. Anepithymiae. **Schwäche der Arten des Verlangens.**

Appetituum sensitiuorum debilitas notabilis, vel suppressio insolita sine sopore. Eine merkliche Schwäche der verschiedenen Arten des sinnlichen Verlangens, oder eine ungewöhnliche Unterdrükkung derselben, ohne daß der Patiente in einem Sopor liegt. Cullen Cl. IV. O. 2. Abschn. 2.

G. 11. (162.) *Anorexia.* Appetitus esculentorum suppressio seu famis feriatio. Unterdrückung des Appetits zum Essen oder Mangel des Hungers. Cullen G. 44. und 106.

G. 4. (163.) *Adipsia.* Appetitus potulentorum suppressio seu sitis feriatio. Unterdrückung des Verlangens zum Trinken oder Mangel des Dursts. Cullen G. 107.

G. 13. (164.) *Anaphrodisia.* Appetitus venereorum seu libidinis suppressio. Mangel des Verlangens zum Beyschlaf. Cullen G. 108.

Ordo III. Dyscinesiae. **Unvermögen der Bewegung und auch oft der Empfindung in**

Werkzeugen, die der Gewalt des Willens unterworfen sind.

Impotentia motus ac saepe sensus in organis libertati subditis, vt lingua, larynge, artubus. Unvermögen der Bewegung und auch oft der Empfindung in Werkzeugen, die der Gewalt des Willens unterworfen sind, als der Zunge, des Kopfes der Luftröhre, u. s. w. Cullen Cl. IV. O. 3.

G. 14. (165.) *Mutitas.* Voces articulatas edendi impotentia. Stummheit oder Unvermögen, die Wörter deutlich auszusprechen. Cullen G. 110.

G. 15. (166.) *Aphonia.* Plenaria vocis suppressio, citra stuporem et syncopen. Gänzlicher Mangel der Sprache ohne Stupor und Sopor. Cullen G. 109.

G. 16. (167.) *Psellismus.* Quasdam syllabas litterasue pronuntiandi impotentia. Undeutliche Aussprache, oder Unvermögen einige Sylben und Buchstaben deutlich auszusprechen. Cullen G. 112.

G. 17. (168.) *Paraphonia.* Vocem solitam edendi impotentia. Unvermögen auf die gewöhnliche Art zu sprechen. Cullen G. 111.

G. 18. (169.) *Paralysis.* Motus aut tactus, vel vtriusque in vno tantum artu debilitas. Paralytische Lähmung oder Schwäche der Bewegung

gung oder des Gefühls, oder beyder zugleich in einem Gliede. Cullen G. 42.

G. 19. (170.) *Hemiplegia.* Debilitas motus aut tactus, vel vtriusque in alterutro corporis latere. Halbseitiger Schlag oder Schwäche der Bewegung oder des Gefühls, oder beyder zugleich in der einen Seite des Körpers. Cullen G. 42.

G. 20. (171.) *Paraplexia.* Debilitas sensus et motus in dimidio corporis transuersim sumti. Paraplexie oder Schwäche der Empfindung und Bewegung aller Theile, die unter einer gewissen in die Quere gehenden Stelle liegen. Cullen G. 42.

Ordo IV. Leipopsychiae. Ohnmachten.

Motum, viriumque vitalium debilitas. Ohnmacht oder Schwäche der Lebensbewegungen oder Lebenskräfte. Cullen Cl. II. O. 2.

G. 21. (172.) *Asthenia.* Totius corporis gradaria seu successiua debilitas, sensubus integris. Nach und nach oder stufenweise zunehmende Schwäche des ganzen Körpers, ohne daß dabey die Sinne etwas leiden.

G. 22. (173.) *Leipothymia.* Virium muscularium totius corporis subitanea imminutio, pulsu superstite. Leichte Ohnmacht, oder plötzliche Verminderung der Muskelkräfte des gan-

zen Körpers, wobey der Puls übrig bleibt. Cullen G. 43.

G. 23. (174.) *Syncope.* Motuum vitalium subitanea debilitas cum frigore, pallore, sensuumque obscuratione. Stärkere Ohnmacht oder plötzliche Verminderung der Lebenskräfte, mit einem Frost, Blaßwerden und Verdunkelung der Sinnen. Cullen G. 43.

G. 24. (175.) *Asphyxia.* Omnium motuum et sensuum apparens cessatio mortem fere referens. Asphyxie oder sehr starke Ohnmacht, wobey alle Bewegungen und Empfindungen dem Ansehen nach verlohren gehen, so daß der Patiente einem Todten ähnlich wird. Cullen G. 43. und G. 41.

Ordo V. Comata. Schlafsüchtige Krankheiten. Sensus omnis, appetitus, motus liberi, phantasiae, memoriaeque feriationes. Krankheiten, bey denen alle Empfindung, Verlangen, freywillige Bewegungen, die Phantasie und das Gedächtniß aufhören. Cullen Cl. II. O. 1.

G. 25. (176.) *Catalepsis.* Status soporosus cum artuum flexilitate et ad quosuis nouos situs retinendos aptitudine. Starrsucht mit Beweglichkeit, bey der sich der Patiente in einem soporösen Zufall befindet, die Glieder aber biegsam sind, und wenn man ihm eine gewisse Lage giebt, in solcher bleiben. Cullen G. 41.

G. 26. (177.) *Ecstasis.* Status soporosus a graui pathemate subito ortus, aegrum in eodem situ quo prehensus est retinens, sine aptitudine cataleptica. Entzückung, oder Starrsucht mit Unbeweglichkeit, oder ein soporöser Zustand, der plötzlich von einer heftigen Gemüthsbewegung entsteht, und bey dem der Patiente in dem Zustand bleibt, in welchem er davon befallen wurde, wobey aber doch die Glieder nicht so wie bey der vorigen Gattung biegsam sind. **Cullen G. 41.**

G. 27. (178.) *Typhomania.* Apparens sopor cum peruigilio reali, vel sopor leuis, e quo aegri facile excitantur cum delirio comitante. Wachende Schlafsucht, oder ein anscheinender soporöser Zustand, wobey aber die Patienten wirklich wachen, oder doch leicht erweckt werden und wobey ein Phantasiren vorhanden ist. **Cullen G. 41.**

G. 28. (179.) *Lethargus.* Status soporosus facile excitabilis, cum summo imaginationis et memoriae torpore ac febre. Leichte Schlafsucht oder soporöser Zustand, aus dem der Patiente leicht zu erwecken ist, der mit einer großen Trägheit der Einbildungskraft und des Gedächtnisses, und einem Fieber verknüpft ist. **Cullen G. 41.**

G. 29. (180.) *Cataphora.* Status somnolen-

tus facile excitabilis sine febre, delirio, et obliuione. Schlafsüchtiger Zustand, aus dem der Patiente leicht zu erwecken ist, ohne Fieber, Phantasien, und Vergeßlichkeit. Cullen G. 41.

G. 30. (181.) *Carus.* Sopor profundus sine stertore. Tiefer Sopor ohne Schnarchen. Cullen G. 41.

G. 31. (182.) *Apoplexia.* Sopor profundissimus cum stertore vel sonora respiratione. Sehr tiefer Sopor mit Schnarchen oder einem mit einem Schall verknüpften Athemholen. Cullen G. 41.

Classis

Classis VII. Dolores. Schmerzen.

Cuiusuis experientia cognoscendi, nulla definitione distincte explicabiles sunt. Man kann dieselben, da sie jeder aus seiner eigenen Empfindung kennt, nicht mit Worten genau beschreiben.

Ordo I. Vagi. Herumziehende Schmerzen, die keinen gewissen Sitz haben.

Dolores et molestiae vagae saepius vniuersales, aut cutaneae ad phlegmasias non referendae. Herumziehende Schmerzen oder Beschwerden, die keinen gewissen Sitz haben, oder in der Haut empfunden werden, und doch nicht zu den Entzündungsfiebern gehören.

G. 1. (183.) *Arthritis.* Articulorum dolor spontaneus periodicus. Gicht. Ein von freyen Stücken entstehender periodischer Schmerz in Gelenken. Cullen G. 23.

G. 2. (184.) *Ostocopus.* (*Gorraei* definit.) Ossium dolor non erraticus et internus in artubus. Festsitzende und innerliche Schmerzen in den Knochen der Glieder. Cullen.

G. 3. (185.) *Rheumatismus.* Dolor diuturnus in parte carnosa artuum. Chronischer Schmerz in den fleischigten Theilen der Glieder. Cullen G. 21.

G. 4. (186.) *Catarrhus.* Collo vicinarum partium dolor a frigore suscepto, cum tussi, coryza, etc. Catarrh. Schmerz in denen um den Hals liegenden Theilen von einer Erkältung mit Husten, Schnupfen u. s. w. **Cullen** G. 39.

G. 5. (187.) *Anxietas.* Molestia quae ad continuam loci mutationem cogit. Aengstlichkeit oder eine beschwerliche Empfindung, welche macht, daß man immer seine Lage verändern muß.

G. 6. (188.) *Lassitudo.* Molestia cum debilitate, quae ad quietem inuitat. Müdigkeit oder eine beschwerliche Empfindung mit einer Schwäche, welche uns antreibt die Ruhe zu suchen.

G. 7. (189.) *Stupor.* Molestia quae sensum tactus obscurat. Stupor oder eine beschwerliche Empfindung, welche das Gefühl stumpf macht.

G. 8. (190.) *Pruritus.* Molestia quae ad scalpendum nos cogit. Jucken. Beschwerliche Empfindung, welche uns zum Kratzen antreibt.

G. 9. (191.) *Algor.* Molestia qualis a summo aëris frigore excitatur. Frost, oder eine beschwerliche Empfindung, welche derjenigen gleicht, die durch einen sehr großen Grad der äußerlichen Kälte erreget wird.

G. 9. (192.) *Ardor.* Molestia qualis a summo aëris calore producitur. Hitze. Beschwer-

liche

liche Empfindung, welche derjenigen gleicht, die durch eine starke äußerliche Wärme erreget wird.

Ord. II. Dolores capitis. Schmerzen im Kopf.

Scilicet capillitii vel faciei. In dem behaarten Theil oder Gesicht.

G. 11. (193.) *Cephalalgia.* Grauatiuus capitis dolor. Drückender Kopfschmerz.

G. 12. (194.) *Cephalaea.* Periodicus, diuturnus, tensiuus capitis dolor. Periodischer, langwieriger, spannender Kopfschmerz.

G. 13. (195.) *Hemicrania.* Dolor alterutrius lateris frontis. Migräne, oder ein Schmerz auf der einen Seite der Stirne.

G. 14. (196.) *Ophthalmia.* Dolor oculi cum rubore, lucis intolerantia et lacrymatione. Augenschmerz oder Entzündung mit einer Röthe und Thränen der Augen, wobey der Patiente das Licht nicht vertragen kann. Cullen G. 8.

G. 15. (197.) *Otalgia.* Dolor aurium. Ohrenschmerz. Cullen G. 7. 1.

G. 16. (198.) *Odontalgia.* Dolor maxillarum dentiumue. Zahnschmerz. Schmerz in Zähnen oder der Kinnlade. Cullen G. 22.

Ord. III. Dolores pectoris. Schmerzen in der Brust.

Dolores

Dolores cordis et oesophagi, anhelationis expertes. Schmerzen des Herzens und der Speiseröhre, ohne ein damit verknüpftes ängstliches Athemhohlen.

G. 17. (199.) *Dysphagia*. Molestia deglutitionem impediens sine notabili respirationis laesione. Beschwerliches Hinterschlingen ohne merkliche Verletzung des Athemhohlens.

G. 18. (200.) *Pyrosis*. Sensus ardoris in ventriculo et oesophago sine febre acuta. Sodbrennen oder Empfindung eines Brennens im Magen und in der Speiseröhre, ohne daß ein hitziges Fieber vorhanden ist. Cullen G. 57.

G. 19. (201.) *Cardiogmus*. Grauis pertinaxque molestia in praecordiis cum sensu ponderis et magnae molis pulsantis a minimo motu increscens. Herzdrücken. Eine starke und hartnäckige Beschwerde in der Herzgrube mit der Empfindung einer großen Schwere und klopfenden Last, die sich durch die geringste Bewegung vermehret.

Ordo IV. Dolores abdominales interni. Innerliche Schmerzen des Unterleibes.

G. 20. (202.) *Cardialgia*. Molestia in stomacho syncopen minitans. Magenkrampf, der bis zur Ohnmacht heftig ist. Cullen G. 44.

G. 21. (203.) *Gastrodynia.* Quicumque dolor notabilis et constans in regione stomachi, qui continua animi defectione non stipatur, vt cardialgia, nec pyrexia vt gastritis. Magenschmerz, der zwar stark und anhaltend ist, aber nicht so wie die vorige Krankheit mit einer Ohnmacht begleitet ist, und bey dem auch kein Fieber, wie bey der Magenentzündung, (gastritis) vorhanden ist. Cullen G. 44.

G. 22. (204.) *Colica.* Dolor intestinorum, Schmerz in Gedärmen. Colik. Cullen G. 58.

G. 23. (205.) *Hepatalgia.* Molesta sensatio, grauatiua, tensiua, aut alia quaeuis in regione hepatis, sine pyrexia acuta. Leberschmerz, oder eine drückende, spannende oder andre üble Empfindung in der Gegend der Leber, ohne ein hitziges Fieber.

G. 24. (206.) *Splenalgia.* Dolor aut molestia in regione lienis sine pyrexia acuta. Milzschmerz. Schmerz oder Beschwerde in der Gegend der Milz ohne hitziges Fieber.

G. 25. (207.) *Nephralgia.* (*Zwingeri.*) Dolor lumbi alterutrius vreteris ductum sequens, cum nausea, testis retractione in viris, cruris stupore in foeminis etc. Nierenschmerz, oder Schmerz in der Lende, der sich längst des einen Harngangs erstrecket, mit Ekel, Zurückziehen des einen Hoden bey

Mannspersonen und einer Betäubung des Beins bey Frauenspersonen, u. s. w.

G. 26. (208.) *Dystocia.* Dolor vterinus in grauidis cum conatibus parturitionis. Geburtswehen. Schmerz der Gebärmutter bey Schwangern mit Geburtswehen.

G. 27. (209.) *Hysteralgia* (*Montalti.*) Dolor vteri sine nisu parturitionis. Schmerz in der Gebärmutter ohne Geburtswehen.

Ordo V. Dolores externi et artuum. Schmerzen in äußerlichen Theilen und Gliedern.

G. 28. (210.) *Mastodynia.* Dolor mammarum. Schmerzen der Brüste. Cullen G. 7. 1.

G. 29. (211.) *Rachialgia* (*Astrucii.*) Dolor abdominis et spinae dorsi in brachiorum paralysin aut conuulsiones desinens. Colik von Poitou. Schmerz im Unterleibe und Rückgrat, der sich in eine Lähmung der Arme oder Zuckungen endigt. Cullen G. 58.

G. 30. (212.) *Lumbago.* Dolor lumborum corporis erectionem impediens. Lendenweh, wodurch man verhindert wird, den Körper gerade in die Höhe zu richten. Cullen G. 21.

G. 31. (213.) *Ischias.* Peluis et coxendicis dolor claudicationem saepius inducens.

Hüft-

Hüftweh, oder Schmerz im Becken und der Hüfte, der oft ein Hinken verursacht. Cullen G. 21.

G. 32. (214.) *Proctalgia*. Dolor podicis citra tenesmum. Schmerz des Hintern ohne Stuhlzwang.

G. 33. (215.) *Pudendagra*. Dolor genitalium citra dysuriam. Schmerz der Zeugungstheile ohne beschwerliches Urinlassen.

Classis

Classis VIII. Vesaniae. Gemüthskrankheiten.

Error in imaginatione, appetitu, iudicio. Fehler der Einbildungskraft, des Verlangens, oder der Beurtheilungskraft. Cullen Cl. II. O. 4.

Ordo I. Hallucinationes. Fehler der Einbildung aus einem Fehler der Sinnwerkzeuge.

Errores imaginationis saluo intellectu ob organorum externorum vitio. Fehler der Einbildungskraft, wobey der Verstand nichts leidet, aus Fehlern der äußerlichen Sinnenwerkzeuge. Cullen Cl. IV. O. 1.

G. 1. (216.) *Vertigo*. Obiecta licet quiescentia e loco moueri vel in gyrum versari nobis videntur. Ipse aeger sibi quandoque nutare videtur. Schwindel. Es scheinen dabey die Gegenstände, ob sie gleich stille stehen, doch sich zu bewegen oder in einem Kreis herum zu drehen. Manchmahl glaubt der Kranke selbst zu wanken.

G. 2. (217.) *Suffusio*. Obiectorum, quae non sunt, imaginaria visio. Eingebildetes Sehen, von Dingen, die nicht wirklich vorhanden sind. Cullen G. 94.

G. 3. (218.) *Diplopia*. Obiectum duplicatum vel multiplicatum apparet. Doppelsehen, wo

die

die Gegenstände doppelt oder vielfach erscheinen. Cullen G. 94. 2.

G. 4. (219.) *Syrigmos.* Auditio imaginaria soni, cuius nullum est extra aures principium. Ohrenklingen, oder eingebildetes Hören eines Schalles, dazu keine Ursache außerhalb dem Ohre vorhanden ist. Cullen G. 96.

G. 9. (220.) *Hypochondriasis.* Morbus, diuturnus, quo affectus se in mortis periculo versari ex ructu, palpitatione, aliisque levidensibus malis, imaginatur. Hypochondrie, oder eine langwierige Krankheit, wobey der Kranke aus dem Aufstoßen, Herzklopfen und andern leichten Uebeln, die er empfindet, sich einbildet, in würklicher Todesgefahr zu seyn. Cullen G. 45.

G. 6. (221.) *Somnambulismus.* Somniantes e lecto surgunt, vigilantium munia exequuntur, et se saepe diuersis periculis exponunt. Nachtwandern. Die Patienten stehen im Traum auf, verrichten die Geschäfte wachender Personen, und setzen sich oft dabey verschiedenen Gefahren aus. Cullen G. 67.

Ordo II. Morositates. Fehler des Verlangens.

Cupiditates aut aduersationes deprauatae. Verderbte Neigungen und Verabscheuungen gewisser Dinge. Cullen Cl. III. O. 2. Abschnitt 1.

G. 7. (222.) *Pica*. Alimentorum consuetorum auersatio, cum inassuetorum, sanisque insalubrium appetitu. Ein Abscheu gegen die gewöhnlichen Nahrungsmittel, mit einem Appetit zu ungewöhnlichen und solchen Dingen, die Gesunden schädlich sind. Cullen G. 102.

G. 8. (223.) *Bulimia*. Appetitus esculentorum copiae maioris, quam quae digeri possit. Allzuheftiger Hunger, oder ein Appetit nach einer größern Menge von Speisen, als verdauet werden kann. Cullen G. 100.

G. 9. (224.) *Polydipsia*. Appetitus maioris solito copiae potulentorum. Allzustarker Durst, oder Appetit nach einer größern Menge von Getränken, als man sonst zu genießen pflegt. Cullen G. 101.

G. 10. (125.) *Antipathia*. Quorundam obiectorum tanta auersatio, vt ex eorum visu vel olfactu aeger grauia symptomata patiatur. Antipathie oder ein so großer Abscheu gegen gewisse Dinge, daß ihr Anblick oder Geruch gleich beträchtliche Zufälle hervorbringt.

G. 11. (226.) *Nostalgia*. Parentum patriaeue tanta cupiditas, vt hac non expleta aeger graui morbo decumbat. Heimweh, oder ein so großes Verlangen nach den Eltern und Vaterland, daß davon, wenn dieses Verlangen

nicht

erfüllt wird, eine schwere Krankheit entstehet. Cullen G. 65. und 105.

G. 12. (227.) *Panophobia.* Summus pauor inter dormiendum sine caussa euidenti. Heftiges Auffahren und Erschrecken im Schlafe, ohne eine deutlich in die Augen fallende Ursache. Cullen G. 65.

G. 13. (228.) *Satyriasis.* Effraenis, impudensque veneris cupiditas cum libidinosa penis tentigine. Heftiges und ungezähmtes Verlangen zum Beyschlaf bey Mannspersonen, mit einer Steifigkeit des männlichen Gliedes. Cullen G. 103.

G. 14. (229.) *Nymphomania.* In foeminis effraene veneris desiderium. Mutterwuth. Heftiges Verlangen nach dem Beyschlaf bey Frauenspersonen. Cullen G. 104.

G. 15. (230.) *Tarantismus.* Effraenis choreas agendi, vel saltandi cupiditas. Taranteltanz. Ein ungezähmtes Verlangen zu tanzen.

G. 16. (231.) *Hydrophobia.* Effraenis potulentorum auersatio, saepius a morsu animalis rabidi. Wasserscheu oder heftiger Abscheu gegen alles Geträncke, der oft die Folge des Bisses eines wüthenden Thieres ist. Cullen G. 63.

Ordo III. Deliria. Phantasiren.

Errores mentis iudicantis. Fehler der Beurtheilung. Cullen Cl. III. O. 4.

G. 17. (232.) *Paraphrosyne.* Delirium fugax, a veneno, aut altero morbo dependens. Phantasiren. Vorübergehendes Phantasiren von einem Gifte oder einer andern Krankheit. Cullen G. 66.

G. 18. (233.) *Amentia.* Delirium vniuersale mite, sine furore et audacia, cum morbo diuturno. Blödsinnigkeit. Allgemeiner aber nicht wüthender Wahnsinn bey einer chronischen Krankheit. Cullen G. 64.

G. 19. (234.) *Melancholia.* Delirium particulare mite, cum moerore, ac morbo diuturno. Melancolie. Partieller Wahnsinn ohne Wuth mit Traurigkeit und einer chronischen Krankheit. Cullen G. 65.

G. 20. (235.) *Mania.* Delirium vniuersale cum furore, vel audacia et morbo diuturno. Raserey. Allgemeiner wüthender Wahnsinn mit einer langwierigen Krankheit. Cullen G. 66.

G. 21. (236.) *Daemonomania.* Delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiae tribuitur. Ein melancholischer Wahnsinn, den man gemeiniglich der Gewalt des Teufels zuschreibt. Cullen G. 65.

Ordo

Ordo IV. Vesaniae anomalae. **Anomalische Gemüthskrankheiten.**

Morbi prioribus affines. Krankheiten, die den vorigen ähnlich sind.

G. 22. (237.) *Amnesia.* Omnis memoriae feriatio. Allgemeine Vergeßlichkeit. Cullen 64.

G. 23. (238.) *Agrypnia.* Peruigilium continuum immodicumue. Anhaltender und unmäßiger Mangel des Schlafs.

Classis IX. Fluxus. Widernatürliche Ausleerungen.

Eiectio fluidorum aut contentorum, quae quantitate, qualitate, desuetudine, notabilis est. Ausleerungen von Feuchtigkeiten oder andern in dem Körper enthaltenen Dingen, die ihrer Menge, Eigenschaften wegen, oder weil sie sonst ungewöhnlich sind, Aufmerksamkeit verdienen. Cullen Cl. IV. O. 4.

Ordo I. Sanguifluxus. Widernatürliche Ausleerungen von Blut oder Blutstürzungen.

Sanguinis vel sanguinolentae materiae eiectio sine alui fluxu. Abgang von Blut oder einer blutigen Materie ohne Bauchfluß. Cullen Cl. I. O. 4.

G. 1. (239.) *Haemorrhagia.* Fluxus sanguinis e naribus. Nasenbluten. Cullen G. 35.

G. 2. (240.) *Haemoptysis.* Sanguinis expectoratio cum tussi sine pyrexia acuta. Blutspeyen. Auswurf des Blutes mit Husten ohne ein hitziges Fieber. Cullen G. 36.

G. 3. (241.) *Stomacace.* Fluxus sanguinis e gingiuis saepius foetidis, putridisue. Bluten aus dem Munde, oder aus dem oft übelriechenden und faulen Zahnfleisch. Cullen B. I. S. 228.

G. 4. (242.) *Haematemesis.* Sanguinis reiectio

ex

ex oesophago cum vomitorio conatu. Blutbrechen. Cullen B. I. S. 229.

G. 5. (244.) *Haematuria.* Sanguinis fluidiue rubri per vias vrinarias emiſſio. Blutharnen. Cullen B. I. S. 230.

G. 6. (245.) *Menorrhagia.* Sanguinis per vterum aut vaginam fluxus vitioſus. Widernatürlicher Abgang des Blutes aus der Gebärmutter oder Mutterſcheide. Cullen S. 38.

G. 7. (245.) *Abortus.* Foetus immaturi, ſaepius cum menorrhagia ex vtero excluſio. Abortiren. Abgang der unreifen Frucht, der oft mit einer Blutſtürzung aus der Gebärmutter verknüpft iſt. Cullen S. 38.

Ordo II. Aluifluxus. Bauchflüſſe, oder widernatürliche Ausleerungen der im Canal der erſten Wege enthaltenen Dinge.

Materierum in primis viis contentarum vitioſa per os aut anum reiectio. Widernatürliche Ausleerung der in dem Canal der erſten Wege enthaltenen Dinge durch den Mund oder After.

I. Aluifluxus ſanguinolenti. Blutige Bauchflüſſe.

G. 8. (246.) *Hepatirrhoea.* Aluifluxus per inferiora ſeroſo-cruentus, nec ater, nec torminoſus. Leberfluß oder Bauchfluß, wodurch ein blutiges Waſſer abgeht, das nicht ſchwarz

ist, und wobey kein Schneiden und Bauchgrimmen vorhanden ist. Cullen G. 60.

G. 9. (247.) *Haemorrhois*. Fluxus cruentus ex podice, vel recto mariſcis ruptis obſito. Hämorrhoiden, oder Abgang von Blut aus dem Hintern und Mastdarm, wo aufgegangene Hämorrhoidalgeschwülste befindlich sind. Cullen G. 37.

G. 10. (248.) *Dyſenteria*. Frequens torminoſa, ſaepe teneſmodes, foecum cruentarum per inferiora deiectio. Die Ruhr oder Dysenterie. Ein öfterer mit Schneiden und oft mit Stuhlzwang verknüpfter Abgang von blutigen Excrementen. Cullen G. 40.

G. 11. (249.) *Melaena*. Fluidi atri per ſuperiora, vel inferiora frequens reiectio. Schwarze Krankheit oder Abgang einer schwarzen Materie durch Erbrechen oder den Stuhlgang.

II. Aluifluxus non ſanguinolenti.

G. 12. (250.) *Nauſea*. Inanis vomendi conatus, et flatus tantum per os emiſſio; affinis eſt aëri fluxibus. Ekel und Aufstoßen, oder eine vergebliche Bemühung zum Brechen, wobey nur die Luft oberwärts abgeht. Es kömmt diese Krankheit mit den Ausleerungen von Luft (aerifluxus ſ. unten S. 77.) überein. Cull. 44.

G. 13. (251.) *Vomitus*. Palpabilium materierum

rum, non cruentarum, facta per os, oesophagumque reiectio frequens. Erbrechen, oder häufige Ausleerung substantiöser nicht blutiger Materien durch den Mund. **Cullen** G. 44.

G. 14. (252.) *Ileus.* Atrox circa epigastrium dolor, seu gastrodynia, alui constipatio, et foeculentae demum materiae vomitio. Darmgicht. Heftiger Schmerz in der Gegend des Magens, mit Verstopfung, wobey endlich Excremente weggebrochen werden. **Cullen** 58.

G. 15. (253.) *Cholera.* Vomitio biliosa aut acris assidua, et diarrhoea violenta cum dolore abdominis, virium prostratione et non raro surarum crampis. Gallenkrankheit. Heftiges Erbrechen und Durchfall mit Schneiden im Leibe, Entkräftung und nicht selten einem Krampf in Waden, wodurch scharfe gallichte Materien ausgeleeret werden. **Cullen** G. 59.

G. 16. (254.) *Diarrhoea.* Excrementitiorum humorum frequens, vel intempestiua deiectio. Durchfall oder eine öftere und unzeitige Ausleerung von Materien, die den Excrementen ähnlich sind, durch den Stuhl. **Cullen** G. 60.

G. 17. (255.) *Coeliaca.* Albescentium, aut chylacearum materierum deiectio. Milchfluß, Milchruhr. Ausleerung von weißen und chylösen Materien durch den Stuhl. **Cull.** 60.

G. 18. (256.) *Lienteria.* Celeris statim a pastu facta ingestorum, vix mutatorum deiectio. Lienterie, oder geschwinder Abgang der erst genossenen kaum veränderten Dinge durch den Stuhl. Cullen G. 60.

G. 19. (257.) *Tenesmus.* Muci pauci frequens deiectio cum intensa deiiciendi cupiditate, et assiduo conatu. Stuhlzwang oder eine oft wiederholte Ausleerung von ein wenig Schleim durch den Stuhl mit einem heftigen und öftern Zwängen.

Ordo III. Serifluxus. **Seröse widernatürliche Ausleerungen.**

Fluxus quiuis nec cruentus nec aluinus. Alle Ausleerungen, die nicht blutig sind und nicht durch den Stuhl geschehen.

G. 20. (258.) *Ephidrosis* (*Hippocratis.*) Sudoris quantitate, qualitate, intempestiuitate, peccantis effluxus. Widernatürlicher Schweiß, oder Abgang eines Schweißes, der wegen seiner Menge, Eigenschaften oder weil er zur Unzeit geschiehet, widernatürlich beschaffen ist. Cullen G. 116.

G. 21. (259.) *Epiphora.* Vitiosus ex oculis humoris lacrymalis, sebacei, vel purulenti effluxus. Thränen der Augen, oder ein widernatürlicher Abgang der Thränen oder einer talgigten

gigten oder eitrigten Feuchtigkeit aus dem Auge. Cullen G. 117.

G. 22. (260.) *Coryza.* (*Hippocr. Gorraei* Def. Med.) Humores ſeroſi, mucoſiue e naribus effluxus ſine ozaena, ſaepius cum grauedine. Schnupfen, oder ein Ausfluß einer wäſſerichten und ſchleimichten Feuchtigkeit aus der Naſe, ohne ein vorhandenes Naſengeſchwür, oft mit einem Stockſchnupfen oder einer drückenden Empfindung im Kopfe. Cullen G. 39.

G. 20. (261.) *Ptyalismus.* Saliuae vel muci ſine expectoratione ac vomitione ex ore effluxus, aut emiſſio. Speichelfluß oder Ausfluß von Speichel oder Schleim aus dem Munde, ohne Auswurf aus der Bruſt oder Erbrechen. Cullen G. 118.

G. 24. (262.) *Anacatharſis* (*Hipp. Galen.* in Aph. 8. lib. 5.) Muci, lymphae, vel cuiuscunque humoris facta cum tuſſi expectoratio conſtans et notabilis. Ein anhaltender und beträchtlicher Auswurf aus der Bruſt von Schleim, Lymphe oder einer andern Feuchtigkeit. Cullen. G. 39.

G. 25. (263.) *Diabetes.* Subita poſt paſtum potulentorum cum magna ſiti per vrinae vias, emiſſio. Harnfluß, oder baldiger Abgang des genoſſenen Getränkes durch den Urin mit großem Durſt. Cullen G. 61.

G. 26. (264.) *Enureſis.* Inuoluntaria doloris

et

et ardoris expers mictio. Unvermögen den Harn zu lassen, ohne Schmerz und Brennen. Cullen G. 119.

G. 27. (265.) *Dysuria*. Difficilis et dolorifica, saepius ardens, urinae emissio. Beschwerliches und schmerzhaftes oft mit Brennen verknüpftes Urinlassen. Cullen G. 123.

G. 28. (266.) *Pyuria*. Purulenta, albescentis, aut viscido mucosae, materiei mictio. Abgang einer eiterigten, weißen oder schleimichten Materie durch den Urin.

G. 19. (267.) *Leucorrhoea*. Seroso-flauae, vel puriformis materiae ex vtero delapsus. Weisser Fluß, oder Abgang einer wässerichten gelben oder eiterähnlichen Feuchtigkeit aus der Gebärmutter. Cullen G. 38.

G. 30. (268.) *Gonorrhoea*. Stillicidium fluidi seminalis ex vrethra aut ex vagina. Saamenfluß oder Tripper. Tropfenweißer Abgang der Saamenfeuchtigkeit aus der Harnröhre oder der Mutterscheide. Cullen G. 120.

G. 31. (269.) *Dyspermatismus*. Seminis in actu venereo stillatitia, tarda, impedita, et ad generationem insufficiens emissio. Verhinderter Abgang des Saamens bey dem Beyschlaf, oder eine tropfenweis erfolgende langsame, verhinderte und zur Zeugung unzulängliche Art von Ausleerung des Saamens. Cull G. 124.

G. 32. (217.) *Galactirrhoea.* Stillicidium lactis ex mammis. Ausfließen der Milch aus den Brüsten.

G. 33. (271.) *Otorrhoea* (*Linn.* gen.) Fluxus ex auris cauo, ambitu, aut parte postica. Ausfluß aus dem Ohr, oder der Höhlung des Ohrs, dem äußern Ohr oder hinter dem Ohr.

Ordo IV. Aërifluxus. Abgang von Luft.

Flatus, halitusue vitiosa emissio. Ausleerung von Blähungen, oder sonst verdorbner Luft.

G. 34. (272.) *Flatulentia.* Flatuum ex primis viis per superiora aut inferiora frequens reiectio, borborygmis stipata. Abgang der Blähungen, der ober- oder unterwärts erfolget und mit Murren in Gedärmen verknüpft ist.

G. 35. (273.) *Aedopsophia.* Flatuum per vrethram, vaginam, vel vterum emissio. Abgang von Winden aus der Harnröhre, Mutterscheide oder Gebärmutter.

G. 36. (274.) *Dysodia.* Miasmatum foetidorum exhalatio. Stinkender Athem.

Classis IV. Cachexiae. Cachexien.

Coloris, figurae, molis in corporis habitu depravatio. Widernatürliche Beschaffenheit, Figur oder Größe der äußerlichen Theile. Cullen. Cl. III.

Ordo I. Macies. Magerkeit.

Corporis partium mollium extenuatio. Abnahme der weichen Theile des Körpers. Cullen Cl. III. O. 1.

G. 1. (275.) *Tabes.* Macies cum amphimerina lenta sine tussi. Magerkeit und Abzehrung mit einem alltäglichen remittirenden Fieber, ohne Husten. Cullen G. 68.

G. 2. (276.) *Phthisis.* Corporis emaciatio cum amphimeriana lenta, tussi, dyspnoea, et vt plurimum puris sputo. Lungensucht, oder Abnahme des Körpers mit einem schleichenden täglichen nachlassenden Fieber, Husten, beschwerlichen Athemhohlen, und gemeiniglich mit einem eitrigen Auswurf. Cullen bey G. 36.

G. 4. (277.) *Atrophia.* Macies sine febre. Abnahme des Körpers ohne Fieber. Cull. G. 69.

G. 4. (278.) *Aridura* (*Ettmuelleri.*) Macies vnius tantum partis. Schwinden oder Abnahme eines einzigen Theils.

Ordo II. Intumescentiae. Aufschwellungen.

Deformitas a volumine adaucto. Eine Ungestaltheit, die von der vermehrten Größe herrührt. Cullen Cl. III. O. 2.

G. 5.

G. 5. (279.) *Polysarcia.* Intumescentia vniversalis ab adipe, molesta et corporis agilitatem minuens. Allzugroße Fettigkeit des Körpers, welche Beschwerlichkeit erreget und die freye Bewegung desselben verhindert. **Cullen** G. 70.

G. 6. (280.) *Pneumatosis.* Elastica et flatulenta cutis intumescentia. Windgeschwulst, oder eine elastische von Luft herrührende Geschwulst der Haut. **Cullen** G. 71.

G. 7. (281.) *Anasarca.* Cutis totius intumescentia mollis, pallida, non elastica. Wassersucht des zellichten Gewebes am ganzen Körper, oder eine weiche, blasse, nicht elastische Geschwulst. **Cullen** G. 74.

G. 8. (282.) *Phlegmatia.* Artuum inferiorum turgescentia mollis, non elastica, cuti concolor, indolens. Weiche, nicht elastische, unschmerzhafte Geschwulst der untern Gliedmaaßen, die der Haut an Farbe ähnlich ist. **Cullen** G. 74.

G. 9. (283.) *Physconia.* Intumescentia abdominis a partibus solidis sine grauiditate et fluctuatione. Geschwulst des Unterleibes, die von festen in demselben verschlossenen Theilen entstehet, ohne daß eine Schwangerschaft oder Bewegung einer darinnen enthaltenen Feuchtigkeit vorhanden ist. **Cullen** G. 81.

G. 10.

G. 10. (284.) *Grauiditas.* Intumescentia abdominis ab hypogastrio incipiens, opus generationis subsequens et partu terminanda. Schwangerschaft, oder ein Aufschwellen des Unterleibes, das in der Gegend der Gebärmutter seinen Anfang nimmt, von der Empfängniß der Frucht entstehet, und sich mit der Geburt endiget.

Ordo III. Hydropes partiales. Wassersuchten des ganzen Körpers.

Tumores maiores sed non vniuersales, a fluido intra cauum capitis, abdominis, vteri, vel vesicae contento. Große aber nicht allgemeine Geschwülste, die von einer in der Höhlung des Kopfs, Unterleibes, der Gebärmutter oder Blase enthaltenen Feuchtigkeit entstehen.

G. 11. (285.) *Hydrocephalus.* Tumor capitis, facie saepius excepta, mollis aut elasticus, a fluidi intra ipsum congestione. Wassersucht des Kopfes. Wasserkopf. Eine Geschwulst des Kopfes, wobey aber oft das Gesicht frey bleibt, die von einer innerhalb des Kopfes enthaltenen Feuchtigkeit herrührt. Cullen G. 75.

G. 18. (286.) *Physocephalus.* Tumor totius capitis tensus, elasticus, sub digito crepitans. Windgeschwulst (G. 280.) des Kopfes.

G. 13. (287.) *Hydrorachitis* (*Morgagni.*) Tumor cysticus sero turgidus ex hiatu vertebrarum lumbarium in recens natis protuberans cum anaesthesia. Gespaltenes Rückgrat. Wassergeschwulst des Rückgrats, oder eine Sackgeschwulst, die mit einer wässerichten Feuchtigkeit erfüllt ist, von den offenstehenden Lendenwirbeln bey neugebohrnen Kindern entstehet, und mit einem Mangel der Empfindung verknüpft ist. Cullen G. 76.

G. 14. (288.) *Ascites.* Hydrops totius abdominis a fluido non elastico, seu grauis et fluctuosus. Wassersucht des Unterleibes. Bauchwassersucht, oder eine schwere und mit einer Fluctuation verknüpfte Geschwulst dieses Theils. Cullen G. 78.

G. 15. (289.) *Hydrometra.* Hypogastrii in mulieribus successiue crescens tumor, vteri figuram referens, pressioni cedens fluctuansve, ab ischuria et grauiditate diuersus. Wassersucht der Gebärmutter, oder eine in der Gegend der Gebärmutter entstehende Geschwulst, die, wenn man mit den Fingern darauf drückt, nachgiebt, und in der eine Fluctuation ist, wobey aber keine Verhaltung des Urins oder Schwangerschaft vorhanden ist. Cullen G. 79.

G. 16. (290.) *Physometra.* Constans, permanensque tumor leuis, elasticus, vteri figu-

ram et sedem referens in mulierum hypogastrio. Windgeschwulst oder Windsucht der Gebärmutter, oder eine beständig fortdauernde, leichte, elastische Geschwulst, welche die Gestalt der Gebärmutter und ihre Lage hat. Cullen G. 73.

G. 17. (291.) *Tympanites.* Hydrops totius abdominis a flatu, seu elasticus et leuis. Windsucht oder Geschwulst des ganzen Unterleibes von Blähungen, die elastisch und leicht ist. Cullen G. 72.

G. 18. (292.) *Meteorismus.* Inflatio flatulenta, vel epigastrii, vel in morbo acuto ipsius abdominis. Austreten von Blähungen in der Gegend des Magens, oder auch bey hitzigen Krankheiten des ganzen Unterleibes. Cullen G. 72.

G. 19. (293.) *Ischuria.* Tumor hypogastrii ex vrinae retentione saepius intra vesicam. Verhaltung des Harns oder eine Geschwulst in der Gegend der Blase, von dem zurückgehaltenen Harn, der oft in der Blase selbst befindlich ist. Cullen G. 122.

Man sehe die Arten derselben im ersten Theile bey der angeführten Gattung nach.

Ordo IV. Tubera. Geschwülste.

Tumores partium solidarum, non hydropici. Geschwülste fester Theile, die von keiner Anhäufung von Flüßigkeiten entstehen.

G. 20. (294.) *Rachitis.* Deformitas ex articulorum tumore duro, carnium marcore, capitis mole, cum ingenio praecoci, in puerulis. Englische Krankheit, oder eine Ungestaltheit des Körpers bey Kindern, die durch eine harte Geschwulst der Gelenke, Abnahme des Fleisches und Größe des Kopfes hervorgebracht wird, und gemeiniglich mit einem frühzeitigen Verstand verbunden ist. Cullen G. 82.

G. 21. (295.) *Scrophula.* Tumor scirrhosus glandularum colli, mesenteriique, cum labiis et naso crassioribus. Scropheln. Eine scirrhöse Geschwulst der Drüsen am Hals und im Gekröse, wobey die Lippen und Nase widernatürlich dicke sind. Cullen G. 83.

G. 2. (296.) *Carcinoma.* Vlcera cancrosa cum doloribus lancinantibus. Offener Krebs. Krebsartige Geschwüre mit heftigen bohrenden Schmerzen. Cullen G. 141.

G. 23. (297.) *Leontiasis.* Papillae setaceae vel corniculatae cutim exasperantes. Borsten- oder hornartige Warzen auf der Haut.

G. 24. (298.) *Malis.* Tumores saepius purulenti, vel vlcera, cum insectis vermiformibus, passim enata. Geschwülste, die oft eiternd sind, oder Geschwüre, die hin und wieder im

Körper entstehen, und in denen Würmer befindlich sind.

G. 25. (299.) *Frambaesia.* Excrescentiae fungosae, mori instar granulosae, saepius cum vlceribus etc. Die Yaws, oder schwammichte Auswüchse, die den Maulbeeren ähnlich sehen, aus kleinen Körnern bestehen und oft mit Geschwüren verknüpft sind. **Cullen** G. 88.

Ordo V. Impetigines. Chronische Hautkrankheiten.

Morbi chronici saepius contagiosi, qui cutis excrescentias, tumores gregales, exulcerationes, crustas etc. inducunt. Chronische oft ansteckende Krankheiten, welche Auswüchse, haufenweis bey einander stehende Geschwülste, Geschwüre, Borken u. s. w. auf der Haut hervorbringen. **Cullen** Cl. III. O. 3.

G. 26. (300.) *Syphilis.* Post impurum concubitum vlcuscula, porri, bubones, fici, primo vt plurimum in genitalibus, praegressa non raro gonorrhoea, dein pustulae crustosae, dolores nocturni, exostoses, caries, etc. in ceteris partibus. Venerische Krankheit. Nach einem unreinen Beyschlaf entstehen Geschwüre, Feigwarzen, Leistenbeulen, u. s. w. gemeiniglich zuerst an den Zeugungstheilen, nachdem meistens ein Tripper vorhergegangen

ist.

ist. Hierauf kommen borkigte Pusteln an andern Theilen des Körpers zum Vorschein, und es entstehen nächtliche Schmerzen, Knochengeschwüre, der Beinfraß u. s. w. Cullen G. 84.

G. 27. (301.) *Scorbutus.* Stomacace cum maculis liuidis, flauis, purpureo-violaceis potissimum tibiarum. Bluten des Zahnfleisches mit blauen, gelben und purpurblauen Flecken, die vornemlich an den Beinen zum Vorschein kommen. Cullen G. 85.

G. 28. (302.) *Elephantiasis.* Facies deformis tuberibus callosis, ozaena, raucedo, cutis elephantina crassa vnctuosa, in extremis artubus anaesthesia. Aussatz. Das Gesicht wird durch callöse Knoten verunstaltet, es entstehen stinkende Nasengeschwüre, und eine Heischerkeit, die Haut wird wie bey den Elephanten dick und schmierigt und die Patienten verlieren das Gefühl in den äußern Gliedern. Cullen G. 86.

G. 29. (303.) *Lepra.* Tubercula callosa, scabie maiora, vel crustis et squamis diffusa, herpetica, per cutim dispersa, pruriginosa. Aussatz der Griechen. Es entstehen callöse Knoten und Pusteln, die größer als bey der Krätze sind, mit Borken und Schuppen sich ausbreiten, flechtenartig sind, und ein starkes Jucken erregen. Cullen G. 87.

G. 30. (304.) *Scabies.* Pustulae crustosae, len-

tis magnitudine, pruriginosae, manus potissimum obsidentes. Die Krätze. Borkigte Pusteln von der Größe einer Linse, die Jucken erregen und besonders an den Händen zum Vorschein kommen. Cullen G. 147.

G. 31. (305.) *Tinea.* Crustae flauae vel griseae, vlcerosae, per caput dispersae. Grind. Böser Kopf: oder gelbe und graue schwärende Borken, die auf dem Kopfe hin und wieder entstehen. Cullen G. 146.

Ordo VI. Icteritiae. **Verderbung der Farbe der ganzen Haut.**

Totius cutis color inassuetus sine pyrexia acuta. Eine ungewöhnliche Farbe der Haut des ganzen Körpers ohne daß ein hitziges Fieber zugegen ist.

G. 32. (306.) *Aurigo.* Oculorum et cutis flavedo ad auream vel aurantiam vergens. Gelbsucht oder eine gelbe Farbe der Augen und Haut, die in das Gelbe oder Pomeranzenfarbige fällt. Cullen G. 90.

G. 33. (307.) *Melasicterus.* Cutis color niger vel atro liuidus, seu atrofuliginosus. Schwarzgelbe Sucht, wobey die Haut schwarz oder schwarzblau ist.

G. 34. (308.) *Phoenigmus.* Rubor diffusus, vel maculosus sine pyrexia. Eine verbreitete oder fleckigte Röthe der Haut, ohne Fieber.

G. 35. (309.) *Chlorosis.* Pallor, vel fuscus color cutis, oculis minime flauis, saepius cum pica. Bleichsucht. Eine blasse oder braune Farbe der Haut, wobey die Augen nicht gelb sind, und wobey oft ein Appetit nach widernatürlichen Speisen (Pica G. 222.) vorhanden ist. Cullen G. 46.

Ordo VII. Cachexiae anomalae. Anomalische Cachexien.

Signa classeos et affinitas cum prioribus et ordinibus. Krankheiten, welche die Kennzeichen dieser Classe haben, und den erstern Ordnungen derselben ähnlich sind.

G. 36. (310.) *Phthiriasis.* Exortus pediculorum vel insectorum pediculis affinium ex diuersis corporis partibus, quas porrigine, vlcusculisque, defoedant, aut puncturis, pruritu discruciant. Läusesucht, wobey dergleichen oder ihnen ähnliche Insecten an verschiedenen Theilen des Körpers entstehen und daselbst kleine Geschwüre und Jucken erregen.

G. 37. (311.) *Trichoma.* Capilli inuicem complicati, agglutinati in globos inextricabiles, saepius cum phthiriasi. Weichselzopf. Die Haare wickeln sich unter einander und kleben zusammen, so daß sie nicht gut aus einander gebracht werden können: oft ist eine Läusesucht vorhanden. Cullen G. 89.

G. 38. (311.) *Alopecia.* Capillorum lapsus cum cuticulae desquamatione. Ausfallen der Haare mit einem Abschuppen der Oberhaut.

G. 39. (313.) *Elcosis.* Numerosa vel ampla vlcera chronica, cariosa, foetida cum pyrexia lenta. Zahlreiche und große chronische übelriechende Geschwüre mit einer Beinfäule, wobey ein schleichendes Fieber ist. Kann zu Cullens G. 144. gerechnet werden.

G. 40. (314.) *Gangraena.* Initio mors partis, dein eius putrida dissolutio. Der kalte Brand, wobey der Theil erst abstirbt, hernach aber faulicht aufgelöset wird. Cullen bey G. 7.

G. 41. (315.) *Necrosis.* Partis mors, sine tumore praeuio, dein vero exsiccatio, induratio, nigredo. Trockner kalter Brand. Absterben des Theils ohne vorhergegangene Geschwulst, worauf derselbe austrocknet, hart und schwarz wird. Kann zu dem Sphacelus bey Cullens G. 7. gerechnet werden.

Zweyte

Zweyte Abtheilung.
Krankheitsgattungen nach der Bestimmung von Carl von Linne.

(Nach dessen Schrift: Genera morborum definita etc. Vpsaliae 1763.)

CLAVIS CLASSIVM.

MORBI

Febriles (e sanguine in medullam.)

	Exanthematici.	I.
	Critici.	II.
	Phlogistici.	III.
Temperati.		
Neruini.		
Sensationis	Dolorosi.	IV.
Iudicii	Mentales.	V.
Motus.		
	Quietales.	VI.
	Motorii.	VII.
Fluidi secretionis.		
	Suppressorii.	VIII.
	Euacuatorii.	IX.
Solidi.		
Interni	Deformes.	X.
Externi	Vitia.	XI.

Exanthematici. Febris cum efflorescentia cutis maculata.

Critici. Febris cum vrinae hypostasi lateritia.

Phlogistici. Febris cum pulsu, duro, dolore topico.

Dolorosi. Doloris sensatio.

Mentales. Iudicii alienatio.

Quietales. Motus abolitio.

Motorii. Motus inuoluntarius.

Suppressorii. Meatuum impeditio.

Euacuatorii. Fluidorum euacuatio.

Deformes. Solidorum facies mutata.

Vitia. Externa palpabilia.

Symptomata se habent ad morbum, vt folia et fulcra ad plantam.

Febris dignoscitur pulsu citato.

Cl. I. Exanthematici. Cullen Cl. I. O. 3.

O. I. Contagiosi.

1. *Morta.* *Phlyctaenae* (273) aliquot in abdomine siue artubus, magnitudine auellanae. *Febris* diaria (11) malignissima, funestissima. Cullen G. 33.

2. *Pestis.* *Anthraces* (272) seu *Bubones* (271) gangraenosi (233). *Febris* Synocha (12) acutissima, funestissima, Vertigo (74), Anxietas (89), Lipyria. Cullen G. 26.

3. *Variola.* *Pustulae* (274) erysipelaceae, suppurantes, escharoticae (280), deciduae, cicatrisantes (317). *Febris* Synochus (13), Cephalalgia (40), Lumbago (62). Cullen G. 27.

4. *Rubeola.* *Papulae* (275) vniformes, rubrae, euanescenti-furfuraceae. *Febris* Synocha (12), Sternutatio (154), Epiphora (172), Tussis (155) sicca. Cullen G. 29.

5. *Petechia.* *Sudamina* (321) liuido-lurida, superficialia, insensibilia. *Febris* exacerbans (23), Asthenia (92), Agrypnia (130). Cullen bey G. 34.

6. *Siphylis.* *Nodi* (262), *Vlcuscula*, *Myrmeciae* (279). *Febris* lenta (14) nocturna, dolore ostocopo (61), Marcore (209), Stranguria (196), Angina (46). Cullen G. 84.

O. II. Sporadici.

7. *Miliaria.* *Papulae* (275) rotundae, immersae, diuersicolores, confertae, intacta facie, pruriginosae. *Febris* Synocha (12), Sudore (207) foetido, punctorio. Cull. G. 30.

8. *Vredo.* *Sudamina* (321) inaequalia, ruberrima, dilatabilia, pruriginosa, fugacia, recidivantia, furfuraceo-euanescentia. *Febris* hectica (24) benigna, breuis. Cullen G. 32.

9. *Aphtha.* *Escharae* (280) albidae, rotundae, ductibus excretoriis internis innatae. *Febris* lenta (14), obscura, cum Somnolentia (96). Cull. G. 34.

O. III. Solitarii.

10. *Erysipelas.* *Macula* rubens. vrens, pressione dissimulanda, tumidiuscula, superficialis, dilatabilis, desquamatione finienda. *Febris* Synocha (12), initio acuta, cum inquietudine. Cullen G. 25.

Protypus Exanthematicorum *Erysipelas* (10) est.

Dysenteria (191) ad Contagiosos referreretur, modo Scabies (263) interna in oculos caderet.

Malignitatis symptomata inprimis sunt: *Lipothymia* (93), *Delirium* (65), *Vertigo* (74), *Obliuio* (107), *Anaesthesia* (118), *Lipyria*, *Carpologia* (135), *Anhelatio* (157), *Aphonia* (115), *Aglutitio* (164).

Cl. II.

Cl. II. Critici. Cullen Cl. I. O. 1.

O. I. Continentes. Cullen Cl. I. O. 1. a. 2.

11. *Diaria.* Febris terminanda intra ſeptimanam dimidiam. Cullen G. 4.

12. *Synocha.* Febris terminanda intra ſeptimanam vnicam. Cullen G. 4.

13. *Synochus.* Febris terminanda intra ſeptimanas duas vel tres. Cullen G. 6.

14. *Lenta.* Febris protrahenda vltra ſeptimanas tres. Cullen G. 6.

O. II. Intermittentes. Cullen Cl. I. O. 1. a. 1.

15. *Quotidiana.* Febris paroxyſmi ſimiles nyćthemeris ſingulis. Cullen G. 3.

16. *Tertiana.* Febris paroxyſmi ſimiles nyćthemeris alternis. Cullen G. 1.

17. *Quartana.* Febris paroxyſmi ſimiles nyćthemeris tertiis. Cullen G. 2.

18. *Duplicana.* Febris paroxyſmi ſimiles alternati. Cullen G. I. 1. c.

19. *Errana.* Febris paroxyſmi diſſimiles omnes. Cullen G. 2.

O. III. Exacerbantes. Cullen Cl. I. O. 1. a. 1.

20. *Amphemerina.* Febris continens (14) cum Quotidiana (15). Cullen G. III. 2.

21. *Tritaeus.* Febris continens (14) cum Tertiana (16). Cullen G. I. 2.

22. *Tetartophia.* Febris continens (14) cum Quartana (17). Cullen G. II. 2.

23. *He-*

23. *Hemitritaea.* Febris tritaeus (21) cum Amphemerina (20). Cullen G. I. 3.

24. *Hectica.* Febris lenta (14) cum Duplicana (18). Cullen bey G. VI.

Protypus Criticorum Tertiana (16) *fit, aut potius* Rheumatismus (62).

Apyria *est deflagratio febris.*

Phthisis (208) *posset post* Hecticam (24) *collocari, si ordo naturalis admitteret* et *expectoratio.*

Lethargus (98) *cum Febricula* his *affinis est.*

Cl. III. Phlogistici. Cullen Cl. I. O. 2.

O. I. Membranacei.

25. *Phrenitis. Inflammatio* (231) *Meningum. Febris* Synocha (12), Cephalalgia (40) Furor (68) Anxietas (89), Syringmos (72), Ophthalmia (43), Carpologia (135) Oblivio (107). Cullen G. 9.

26. *Paraphrenesis. Inflammatio* (231) *Diaphragmatis. Febris* Peripneumonia (34), Phrenitis (25). Cullen G. XI. 2.

27. *Pleuritis. Inflammatio* (231) *Pleurae. Febris* Synocha (12), Dyspnoea (160), Tussis (155), Haemoptysis (179), Pleuritica (53). Cullen G. 24.

28. *Gastritis. Inflammatio* (231.) *ventriculi. Febris* Amphemerina (20), Lipyria, Anxietas

tas (89), Vomitus (183) ingeſtorum, Cardialgia (48). Cullen G. 14.

29. *Enteritis. Inflammatio* (231) *Inteſtini. Febris* cum euacuatione abdominis, colica (50) atroci, tenſiua, calente. Cullen G. 15.

30. *Proctitis. Inflammatio* (231) *Ani. Febris* proctica (59) cum Teneſmo (193). Cullen G. VII. 1. 2.

31. *Cyſtitis. Inflammatio* (231) *Veſicae. Febris* Dolor Hypogaſtrii cum tumore inflammatorio, Dyſuria (57), Teneſmo (193). Cullen G. IX.

O. II. Parenchymatici.

32. *Sphacelismus. Inflammatio* (231) *Encephali. Febris* Synochus (13) Delirium (65), Carpologia (135), Aſthenia (92), Immobilitas, Anaeſtheſia (118), Aphonia (115). Cull. G. 9.

33. *Cynanche. Inflammatio* (231) *Faucis. Febris* Synocha (12), Tuſſis (155), Aglutitio (164), Orthopnoea (162), Angina (46) Suffocatio (158), Linguae intumeſcentia. Cullen G. 10.

34. *Peripneumonia. Inflammatio* (23) *Pulmonis. Febris* Synocha (13), Tuſſis (155), Haemoptyſis (179), Dyſpnoea (160), Interſcapulii dolor. Cubatus ſupinus. Cullen G. XI. 1.

35. *Hepatitis. Inflammatio* (231) *Iecinoris. Febris* Amphemerina (20), Tuſſis (155) ſicca,

Aſthma

Aſthma (161), Singultus (153). Hypochondrii dextri tenſio calens. Cullen G. 16.

36. *Splenitis. Inflammatio* (231) *Lienis. Febris* Tetartophia (22), Reſpiratio interſecta (149), Hypochondrii ſiniſtri tumor pulſatorius. Cullen G. 17.

37. *Nephritis. Inflammatio* (231) *Renis. Febris* Synochus (13) irregularis, Nauſea (182), Singultus (154), Ructus (181), Vrinae varietas, Obſtipatio (166), Lumbago (62) vrens, Femoris ſtupor (105). Cullen G. 18.

38. *Hyſteritis. Inflammatio* (230) *Vteri. Febris* Delirium (65), Spaſmus (121) Sardiaſis (125), Dolor Hypogaſtrii tumorque calens. Cullen G. 20.

O. III. Muſculoſi.

39. *Phlegmone. Inflammatio* (231) *Partis Externae. Febris* ex partis externae tumore pulſatorio, Rubore tenſiuo, calente. Cullen G. VII. 1.

Lipyria *dum externa frigent, interna fervent. Protypus Phlogiſticorum* Phlegmone (39) eſt. Delirium (65) *quaſi primus gradus Phrenitidis eſt.*

Cl. IV. Doloroſi.

O. I. Intrinſeci.

40. *Cephalalgia. Capitis* dolor totius aut portionis grauativus.

41. *He-*

41. *Hemicrania. Capitis* lateralis dolor tensivus. Cullen G. 39.

42. *Gravedo. Frontis* dolor pressorius.

43. *Ophthalmia. Oculi* dolor. Cullen G. 8.

44. *Otalgia. Auris* dolor. Cullen G. VII. 1. 2.

45. *Odontalgia. Dentis* dolor maxillaris, Cullen G. 22.

46. *Angina. Faucis* dolor cum suffocatione (158).

47. *Soda. Oesophagi* dolor rancido deurens ructibus (181) calidis. Cullen G. 44.

48. *Cardialgia. Cardiae* dolor scrobiculi subsyncopalis (94. Cullen G. 44.

49. *Gastrica. Ventriculi* dolor epigastrii.

50. *Colica. Intestini* dolor vmbilicalis cum torminibus (123). Cullen G. 58.

51. *Hepatica. Iecinoris* dolor Hypochondrii dextri.

52. *Splenica. Lienis* dolor Hypochondrii sinistri, suspiria (150).

53. *Pleuritica. Thoracis* dolor lateralis punctorius.

54. *Pneumonica. Pulmonis* dolor cum Orthopnoea (162), Tussi (155), Haemoptysi (179).

55. *Hysteralgia. Vteri* dolor.

56. *Nephritica. Renis* dolor.

57. *Dysuria.* *Vesicae* dolor. Cullen G. 123.

58. *Pudendagra.* *Genitalis* dolor.

59. *Proctica.* *Ani* dolor.

O. II. Extrinseci.

60. *Arthritis.* *Geniculorum* dolor periodicus; *a Synovia corrupta.* Cullen G. 23.

61. *Ostocopus.* *Articulorum* dolor internus fixus a *Periostio infecto.*

62. *Rheumatismus.* *Musculorum* dolor ad motum: *a Tunica cellullosa infecta.* Cullen G. 21.

63. *Volatica.* *Vasorum* dolor migrans.

64. *Pruritus.* *Cutis* titillatio occulta, *scalpendi necessitatem inducens.*

Raphania (145) *dolore intenso his affinis: Ob spasmos vero et Conuulsiones sequentibus.*

Cl. V. Mentales.

O. I. Ideales. Cullen Cl. III. O. 4.

65. *Delirium.* Insania acuta, transitoria, symptomatica cum febre.

66. *Paraphrosyne.* Insania acuta, *periodica*, sine febre. Cullen G. 66.

67. *Amentia.* Insania chronica, vniuersalis, innocua. Cullen G. 66.

68. *Mania.* Insania chronica, vniuersalis, furibunda. Cullen G. 66.

69. *Daemonia.* Insania chronica, partialis, furibunda;

ribunda; meticulosa, de Daemonibus. Cullen bey G. 65.

70. *Vesania.* Insania chronica, partialis, tranquilla. Cullen G. 65.

71. *Melancholia.* Insania chronica, partialis, moesta, meditabunda. Cullen G. 65.

O. II. Imaginarii.

72. *Syrigmos.* Perceptio *Soni* tinnitantis falsi. Cullen G. 96. 2.

73. *Phantasma.* Perceptio *Visibilis* obiecti falsi. Cullen G. 94.

74. *Vertigo.* Perceptio circumgyrationis falsae.

75. *Panophobia.* Imaginatio *mali* falsi in solitudine. Cullen G. 65.

76. *Hypochondriasis.* Imaginatio *fati lethalis* ex leui malo, Borborygmi (123), Ructus (181) acidi, Palpitationes (132), Praecordia tremula, Persuasio. Cullen G. 45.

77. *Somnambulismus.* Imaginatio *somniantis* fortior, qua motus voluntarii excitantur. Cullen G. 67.

O. III. Pathetici. Cullen Cl. IV. O. 2.

78. *Citta.* Desiderium *non esculenti* ingerendi. Cullen G. 102.

79. *Bulimia.* Desiderium *Cibi* inexplebile. Cullen G. 100.

80. *Polydipsia.* Desiderium *Potus* continuum. Cullen G. 101.

81. *Satyriasis.* Desiderium *Veneris* enorme. Cullen G. 103.

82. *Erotomania.* Desiderium *Amantium* pudicum. Cullen G. 65.

83. *Nostalgia.* Desiderium *Patriae* Affiniumue. Cullen G. 105.

84. *Tarantismus.* Desiderium *Choreae* (*saepe a morsura insecti*).

85. *Rabies.* Desiderium *mordendi* lacerandique innocuos (*saepe a Morsura Mammalis*).

86. *Hydrophobia.* Auersatio Potulentorum cum Rigore (141) et Sardiasi (125); (*Saepius praecedenti maritata*). Cullen G. 63.

87. *Cacositia.* Auersatio *Cibi* cum horrore.

88. *Antipathia.* Auersatio *Obiecti* particularis.

89. *Anxietas.* Auersatio *mundanarum rerum.* (*Cordis dolor*).

Cl. VI. Quietales.

O. I. Defectiui. Cullen Cl. II. O. 2.

90. *Lassitudo.* Debilitas constans musculorum ponderosa, quietem inducens.

91. *Languor.* Debilitas ſucceſſiua virium vitalium, non reparanda quiete et cibatione.

92. *Aſthenia.* Debilitas ſucceſſiua virium omnium.

93. *Lipothymia.* Defectio motus ſenſusque ſubita; ſuperſtite Pulſu Menteque. Cullen G. 43.

94. *Syncope.* Lapſus virium vitalium ſubitaneus; abolitis Pulſu, Reſpiratione, Senſu, Calore. Cullen G. 43.

95. *Aſphyxia.* Lapſus virium animalium vitaliumque perſiſtens. Cullen G. 43.

O. II. Soporoſi. Cullen Cl. II. O. 1.

96. *Somnolentia.* Sopor vigiliis protractior.

97. *Typhomania.* Sopor apparens cum Agrypnia (130). Cullen G. 41.

98. *Lethargus.* Somnolentia conſtans, leuis, febrilis, Delirio (65) obliuioſo. Cullen G. 41.

99. *Cataphora.* Sopor conſtans allocutione euigilans. Cullen G. 41.

100. *Carus.* Sopor conſtans cum inſenſibilitate, Reſpiratioueque tacita. Cullen G. 41.

101. *Apoplexia.* Sopor conſtans cum inſenſibilitate, Reſpirationeque ſtertoroſa (156). Cullen G. 41.

102. *Paraplegia.* Sopor constans partium sub thorace. Cullen G. 42.

103. *Hemiplegia.* Sopor constans lateris alterius. Cullen G. 42. 1. 2.

104. *Paralysis.* Sopor constans partis alicuius. Cullen G. 42. 1. 1.

105. *Stupor.* Sopor transitorius partis alicuius cum sensu formicationis.

O. III. Priuatiui. Cullen Cl. IV. O. 1. u. O. 2. Absch. 2.

106. *Morosis. Imaginationis* defectus. Cullen G. 64.

107. *Obliuio. Memoriae* defectus. Cullen G. 64.

108. *Amblyopia. Visus* obscuritas sine vitio sensibili. Cullen G. 92.

109. *Cataracta. Visus* priuatio cum vitio obseruabili. Cullen G. 91.

110. *Amaurosis. Visus* priuatio sine vitio sensibili, pupilla dilatata. Cullen G. 92.

111. *Scotomia. Visus* lipothymia (93) momentanea.

112. *Cophosis. Auditus* defectus. Cullen G. 95.

113. *Anosmia. Olfactus* defectus. Cullen G. 97.

114. *Ageustia. Gustus* defectus. Cullen G. 98.

115. *Apho-*

115. *Aphonia*. *Loquelae* priuatio. Cullen S. 109.

116. *Anorexia*. *Famis* defectus. Cullen S. 44. und 106.

117. *Adipsia*. *Sitis* defectus. Cullen S. 107.

118. *Anaesthesia*. *Tactus* sensationis defectus. Cullen S. 99.

119. *Atecnia*. *Libidinis* defectus. Cullen S. 108.

120. *Atonia*. *Fibrarum* muscularium contractionis defectus. Cullen S. 42.

Cl. VII. Motorii. Cullen Cl. II. O. 3.

O. I. Spastici.

121. *Spasmus*. *Artus* distentio violenta, subitanea, fugax.

122. *Priapismus*. *Penis* spastica intumescentia.

123. *Borborygmus*. *Intestinorum* contractio boans.

124. *Trismus*. *Mandibularum* clausura arcta, Cullen S. 48.

125. *Sardiasis*. *Oris* retractio risum mentiens, fugax.

126. *Hysteria*. *Praecordiorum* pressio sub pectore, cum Flatulentia (165), Suffocatione (158), Anxietate (89), Palpitatione (132), verticis pressione. Cullen S. 62.

127. *Tetanus.* *Corporis* rigiditas cum ſenſibilitate. Cullen G. 47.

128. *Catochus.* *Corporis* rigiditas cum inſenſibilitate. Cullen G. 47.

129. *Catalepſis.* *Corporis* totius recepta forma, conſtans, flexilis, cum inſenſibilitate. Cullen G. 41.

130. *Agrypnia.* Senſorii rigiditas ſpaſtica, continua. (*Pervigilium*).

O. II. Agitatorii.

131. *Tremor.* *Partium* agitatio continua, chronica, abque frigoris ſenſu. Cullen bey G. 42.

132. *Palpitatio.* *Cordis* Viſcerisue motus ſubſultorius. Cullen G. 53.

133. *Orgaſmus.* *Arteriarum* ſubſultus.

134. *Subſultus.* *Tendinum* ſubſultoria eleuatio.

135. *Carpologia.* *Digitorum* tremula contractio inſcia.

136. *Stridor.* *Manducatio* ſonora, vacua.

137. *Hippos.* *Palpebrarum* nictitatio frequentiſſima.

138. *Pſellismus.* Loquelae titubatio in quibusdam literis. Cullen G. 112.

139. *Chorea.* *Lateris* agitatio tremula, continua, inordinata. Cullen G. 50.

140. Be-

140. *Beriberi. Partium* tremor (131), Genuum contractura (299), Stupor (105), Raucedo (146).

141. *Rigor. Partium* vibratio periodica, cum frigoris intercutanei sensu.

142. *Conuulsio. Partium* agitatio violenta, periodica, cum sensibilitate. Cullen S. 49.

143. *Epilepsia. Corporis* agitatio periodica, chronica, cum insensibilitate. Cullen S. 52.

144. *Hieranosos. Corporis* agitatio continua, indolens, conuulsiua, cum sensibilitate. Cullen S. 49.

145. *Raphania. Articulorum* contractio spastica, cum agitatione conuulsiua, dolore violentissimo, periodico. Cullen S. 51.

Cl. VIII. Suppressorii.

O. I. Suffocatorii.

146. *Raucedo. Vocis* sibilans elocutio ab arescentia pneumatica. Cullen S. 39 und 111.

147. *Vociferatio. Vocis* dolorosa exaltataque exclamatio. *Ad corpus indurandum.*

148. *Risus.* Exspiratio profunda, agitatoria, cum Sardiasi (125). *Ad Sanguinem e Corde expellendum.*

149. *Fletus. Inspiratio* intersecta, singultuosa, cita, suspiriosa, cum moestitia, gemitu, lacry-

mis (172). *Ad sanguinem intra pulmones ingluttiendum.*

150. *Suspirium. Inspiratio* profunda, agitatoria, lenta. *Ad sanguinem e pulmonibus expellendum.*

151. *Oscitatio. Inspiratio* tarda, adaucta, hians, spasmodica. *Ad sanguinem propellendum per pectus.*

152. *Pandiculatio. Inspiratio* profunda, pressoria cum extensione corporis artuumque. *Ad sanguinem per vasorum anastomoses propellendum.*

153. *Singultus. Inspiratio* celer, conuulsiua, momentanea, iterata, sonora. *Ad Cardiam euacuandam.*

154. *Sternutatio. Exspiratio* sonora, conuulsiua, celer, inspirationi lentae succedens. *Ad sinum frontis euacuandum.*

155. *Tussis. Exspiratio* sonora, conuulsiua, periodica. *Ad tracheam euacuandam.* Cullen G. 39.

156. *Stertor.* Respiratio sonora, rauca, narium agitatione. *Ad mucum faucium subigendum.*

157. *Anhelatio. Respiratio* citatissima, profunda, leuis, fugax. *Ad sanguinem per pulmones accelerandum.*

158. *Suffocatio. Respiratio* angustatione faucium

cium continua, ſine febre. *A tracheae anguſtatione.*

159. *Empyema. Reſpiratio* grauis cum fluctuatione in cauo thoracis, poſt febrim. *A pure in cauum thoracis effuſo.* Cullen bey G. 11.

160. *Dyſpnoea. Reſpiratio* anhelosa (157), laborioſa, ſine ſenſu anguſtationis faucium. *A pulmonum ſubſtantia oppilata.* Cullen G. 55.

161. *Aſthma. Reſpiratio* ſtertoroſa (156), laborioſa, difficilis, chronica. *A bronchiis oppilatis.* Cullen G. 54.

162. *Orthopnoea. Reſpiratio* ſuſpirioſa (150), ſuffocatoria (158), acuta, ſubitanea. *A ſanguinis per pulmones difficili tranſitu.* Cullen G. 55.

163. *Ephialtes. Reſpiratio* profunda, ſuffocans (158), dormientis in dorſo cum ſomnio laborioſo. *Ab inteſtinorum inflatione premente.* Cullen G. 67.

O. II. Conſtrictorii.

164. *Aglutitio. Deglutitio* impedita.

165. *Flatulentia. Ructus* (181) Crepitusque (194) impeditus, cum abdominis intumeſcentia. Cullen G. 44.

166. *Obſtipatio. Foecum* exoneratio impedita. Cullen G. 121.

167. *Ischuria.* *Mictus* impeditus. Cullen G. 122.

168. *Dysmenorrhoea.* *Menstrua* suppressa s. dolorifica. Cullen G. 125.

169. *Dyslochia.* *Lochiorum* suppressio.

170. *Aglactatio.* *Lactis* defectus.

171. *Sterilitas.* *Geniturae* suppressio. Cullen G. 124.

Cl. IX. Euacuatorii. Cullen Cl. IV. O. 4.

O. I. Capitis.

172. *Otorrhoea.* *Auris* purulentus fluxus.

173. *Epiphora.* *Oculi* lacrymalis fluxus continuus. Cullen G. 117.

174. *Haemorrhagia.* *Naris* sanguineus fluxus Cullen G. 35.

175. *Coryza.* *Naris* mucosus fluxus, copiosus, continuus. Cullen G. 39.

176. *Stomacace.* *Oris* sanguinea e gingiuis, cruentatio. Cullen nach G. 38.

177. *Ptyalismus.* *Oris* saliualis e glandulis copiosissimus effluxus.

O. II. Thoracis.

178. *Screatus.* *Faucis* muci sonora euacuatio.

179. Ex-

179. *Expectoratio. Pulmonis* serosa e trachea euacuatio. Cullen S. 39.

180. *Haemoptysis. Pulmonis* sanguinea cum tussi euacuatio. Cullen S. 36.

181. *Vomica. Pulmonis* purulenta, copiosa, improuisa euacuatio. Cullen bey S. 11.

O. III. Abdominis.

182. *Ructus.* Reiectio *flatuum* frequens.

183. *Nausea.* Reiectionis *Cibi flatuumque* conatus inanis. Cullen S. 44.

184. *Vomitus.* Reiectio *ingestorum* conuulsiua. Cullen S. 44.

185. *Haematemesis. Vomitus* (184) sanguinis. Cullen nach S. 38.

186. *Iliaca. Vomitus* (184) cum obstipatione (166) fixa et Colica (50). Cullen S. 58.

187. *Cholera.* Vomitus (184) cum Diarrhoea (188), Colica (50). Cullen S. 59.

188. *Diarrhoea.* Deiectio *Foecum* liquidarum frequens. Cullen S. 60.

189. *Lienteria. Diarrhoea* (188) Cibi immutati. Cullen S. 60.

190. *Coeliaca. Diarrhoea* (188) Chymi. Cullen S 60.

191. *Cholerica. Diarrhoea* (188) rubella, absque Colica. Cullen S. 60.

191. *Dysenteria. Diarrhoea* (188) cruenta, cum

cum Colica (50), Tenesmo (194). Cullen S. 40.

193. *Haemorrhois.* Deiectio *sanguinis* cum Proctica (59), absque Colica. Cullen S. 37.

194. *Tenesmus.* Deiectio *Muci* frequens, parca, cum desiderio.

195. *Crepitus.* Deiectio *Flatuum* copiosa, crebra.

O. IV. Genitalium.

196. *Enuresis.* *Vrinae* stillicidium inuoluntarium, indolens. Cullen S. 119.

197. *Stranguria.* *Vrinae* parca, guttata, frequens dolorosa micturitio.

198. *Diabetes.* *Vrinae* copiosissimae frequens micturitio. Cullen S. 61.

199. *Haematuria.* *Vrinae* cruentae micturitio. Cullen nach S. 38.

200. *Glus.* *Vrinae* viscosae micturitio. Cullen S. 123.

201. *Gonorrhoea.* *Geniturae* stillicidium. Cullen S. 120.

202. *Leucorrhoea.* *Muci* e sinu muliebri effluxus. Cullen S. 38.

203. *Menorrhagia.* *Menstruatio* copiosa, inordinata. Cullen S. 38.

204. *Parturitio.* *Foetus* maturi enixus laboriosissimus.

205. *Ab-*

205. *Abortus.* *Foetus* praematura eiectio. Cullen G. 38.

206. *Mola.* *Massae* carneae, intus cysticosae; ex vtero eiectio.

O. V. Corporis externi.

207. *Galactia.* *Lactis* effluxus.

208. *Sudor.* *Seri* per poros copiosa, frequens sudatio. Cullen G. 116.

Cl. X. Deformes. Cullen Cl. III.

O. I. Emaciantes. Cullen Cl. III. O. 1.

209. *Phthisis.* Marcor cum Hectica (24), Tussi (155). Dyspnoea (160) Expectoratione (158) purulenta, copiosa. Cullen bey G. 36.

210. *Tabes.* Marcor cum Hectica (24) *absque expectoratione.* Cullen G. 68.

211. *Atrophia.* Marcor cum Atonia (120) *absque Expectoratione et Hectica.* Cullen G. 69.

212. *Marasmus.* Marcor cum Aridura (226), *absque Atonia, Expectoratione et Hectica.* Cullen G. 69.

213. *Rachitis.* Marcor carnium tumentibus artuum geniculis capiteque, ossibusque saepe flexilibus. Cullen G. 82.

O. II. Tumidosi. Cullen Cl. III. O. 2.

214. *Polysarcia.* *Corporis* pinguedinosa intumescentia. Cullen G. 70.

215. *Leu-*

215. *Leucoplegmatia. Corporis* emphysematosa (229) intumescentia. Cullen G. 71.

216. *Anasarca. Corporis* oedematosa (230) intumescentia. Cullen G. 74.

217. *Hydrocephalus. Capitis* oedematosa (230) intumescentia, hiantibus suturis cranii. Cullen G. 75.

218. *Ascites. Abdominis* oedematosa (230) intumescentia. Cullen G. 78.

219. *Hyposarca. Abdominis* nodosa intumescentia. Cullen G. 81.

220. *Tympanites. Abdominis* flatulenta (165) intumescentia, constans, sonora. Cullen G. 72.

221. *Grauiditas. Abdominis* a foetu intumescentia nimia.

O. III. Decolores.

222. *Cachexia. Pallor* corporis oedematosus (230), cum debilitate, moerore.

223. *Chlorosis. Viridi-cinereus* color faciei foemineae cum Citta (78). Cullen G. 46.

224. *Scorbutus. Opacitas* faciei cum Anorexia (116), lassitudine (90) matutina, Stomacace (175), labario (309). Cullen G. 85.

225. *Icterus. Flauedo* corporis cum vrina luteo-tinctoria, foecibus albidis, (*Obstipatio bilis*). Cull. G. 90.

226. *Ple-*

226. *Plethora. Rubedo* corporis a distentis vasis sanguineis, cum Dyspnoea (160).

Hydropis nomine veniunt *Anasarca* (216), *Ascites* (218), *Hyposarca* (219), *Hydrocephalus* (217), *Oedema* (230), et *Tympanites* (220).

Cl. XI. Vitia. Cullen Cl. IV.

O. I. Humoralia.

227. *Aridura.* Pars exsucca, emarcida, exantlatis humoribus, indolens.

228. *Digitium. Articuli* exsiccatio friabilis occulta. Digiti marcor dolore periodico intensissimo. Cullen G. 114.

229. *Emphysema. Flatus* intra tunicam cellulosam partis. Tumor elasticus, concolor, subdiaphanus, indolens. Cullen G. 71.

230. *Oedema. Lympha* stagnans intra tunicam cellulosam partis. Tumor digito premente foueolam admittens, concolor, vespertinus, indolens, Partis.

231. *Sugillatio. Cruor* effusus in tunicam cellulosam. Tumor obsoletus, latus, luridus. Cullen G. 28.

232. *Inflammatio. Sanguis* obstructus in vasis. Tumor tensus, calidus, ruber, pulsans, dolens. Cullen G. 7.

233. *Abscessus.* Inflammatio ſuppurata, in *pus* collecta. Tumor mollis, aequalis, pruriens. Cullen G. 7.

234. *Gangraena.* Inflammatio ſ. ſuppuratio ſuffocata, *mortua* ſerpens in tunica celluloſa. Cutis liuens, molliuſcula, putris cum veſiculis ſub epidermide, ſerpente vitio, margine ſubinflammato, ſubardente. Cullen bey G. 7.

235. *Sphacelus. Gangraena* (234) omnium ſolidorum partis. *Mortificatio* putrida ad oſſa penetrans, indolens, properans. Cullen bey G. 7.

II. Dialytica. Cullen Cl. IV. O. 8.

(*Solutiones* Continui.)

236. *Fractura. Oſſis* ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem. Cullen G. 148.

237. *Luxatura. Geniculi* ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem. Cullen G. 142.

238. *Ruptura. Tendinis* ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem.

239. *Contuſura. Fibrarum* ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem.

240. *Profuſio. Sanguinis* effluxus copioſus e ſubſtantiae diſſolutione. Cullen G. 115.

241. *Vulnus.* Subſtantiae diſſolutio partis mollis, hians, cruenta. Cullen G. 143.

242. *Amputatura.* Vulnus *detruncatione* partis totalis factum. Cullen G. 143.

243. *Laceratura.* Vulnus fibrarum Cutisque *laceratione* factum. Cullen G. 143.

244. *Punctura.* Vulnus *Tendinis* punctione factum Cullen G. 143.

245. *Morſura.* Vulnus *punctum* armis animalium veneratis.

246. *Combuſtura.* Vulnus *igne* factum, inducta Eſchara (281). Cullen G. 7.

247. *Excoriatura.* *Cutis* remota a carnibus viuis.

248. *Intertrigo.* *Cuticulae* eroſio madens dolensque. Cullen G. 7.

249. *Rhagas.* *Fiſſura* cutis arida.

O. III. Exulcerationes. Cullen Cl. IV. O. 8.

(*Suppurationes* apertae.)

250. *Vlcus.* *Vulnus ſuppuratum* partis carnoſae. Cullen G. 144.

251. *Cacoethes.* *Vlcus ſuperficiale* ſerpens, manans, perenne. Cullen G. 144.

252. *Noma.* Vlcus carnes integumentaque depaſcens, cicatricem inducens. Cullen G. 144.

253. *Carcinoma.* Vlcus *Scirrhi* (284) ſuppurati, *Vlcus* putridum, ſerpens, vaſis tumidis radicatum, periodice dolens. Cullen G. 144.

254. *Ozena.* Vlcus intra *antrum Highmori.* *Vlcus* occultum e Naribus foetens. Cullen G. 144.

255. *Fiſtula. Vlcus* cortice *calloſo-uaginatum.* *Vlcus* ſinuoſo penetrans, intus cortice obtectum, ore anguſtatum. Cullen G. 144.

256. *Caries.* Vlcus *oſſis* ſeparato perioſtio. *Vlcus* conniuens, cum raris punctionibus indolens, ſanie paſſim nigra ſe prodens. Cullen G. 149.

257. *Arthrocace.* Vlcus *medullae* cum oſſis Carie (256). Vlcus malignum, tumens, dolore oſtocopo (61). Cullen G. 7.

258. *Cocyta.* Animalculum venenatum intra partem receptum. *Partis* ſtigma dolore furioſo.

259. *Paronychia.* Serum corruptum ſub *tendinibus* perioſtioque. *Partis* rubor dolentiſſimus, os deſtruens. Cullen G. 7.

260. *Pernio.* Partis vſtio *Gelu* facta. *Pars* albo caeruleſcens, tempeſtatibus recrudeſcens, ſaepe exulcerans. Cullen G. 7.

261. *Preſſura.* Digiti inflammatio (232) a *frigore*, in caſum vnguis tendens. *Inflammatio* Digiti circum vngues in ſuppurationem vergens.

262. *Arctura. Vnguis* curuatura lateralis cutem

tem ſecans. *Inflammatio* digiti eum vlceratione laterali vnguis.

O. IV. Scabies.

* Multiplicatiua.

263. *Lepra. Puſtulae* (275), Eſchara (281) ſicca colorata, cum Nodis immerſis mobilibus indolentibus fuſcis Rhagadibusque (249). Cullen G. 87.

264. *Tinea. Puſtulae* (275) Capillitii ſiccae, eſchara (281) albo-flaueſcente, *Pilisque* abbreviatis erectis bulboſo radicatis. Cull. G. 146.

265. *Achor. Puſtulae* (275) exulcerantes, manantes communi pinguedinoſo. Cullen G. 144.

266. *Pſora. Puſtulae* ichoroſae, eſcharoticae (281), noctu imprimis pruriginoſae (64). Cullen G. 147.

267. *Lippitudo. Puſtulae* excoriantes *Palpebrarum* margines.

268. *Serpigo. Puſtulae* ſiccae, obſoletae, ſerpentes, ſubfarinaceo-deſquamantes.

269. *Herpes. Puſtulae* eſcharoticae (281), baſi communi eryſipelacea (10). Cullen G. 145.

270. *Varus. Puſtulae Glandularum ſebacearum* rubrae, diſperſae, chronicae. Cullen G. 7.

271. *Bacchia. Vari* (270) *faciei* cum nodis maculisque coloratis chronicis. Cullen G. 7.

** Simplex.

272. *Bubo. Glandula conglomerata* inflammata, in ſuppurationem tendens. Cullen G. 31.

273. *Anthrax. Glandula ſubcutanea* inflammata, in ſuppurationem malignam vergens. *Tumor* rotundus, eryſipelaceus (10), immerſus, dolentiſſimus, ſuppurandus apice acuto, puſtula purifera. Cullen G. 7.

274. *Phlyctaena. Veſicula* feroſa, diſtenta, pellucida, baſi inflammata, rupta dolens. Cullen G. 137.

275. *Puſtula. Veſicula* purulenta, turgens, dehiſcens pure. Cullen G. 7.

276. *Papula. Tuberculum* fractum, coloratum, inflammatum, vix ſuppurandum. Cull. G. 7.

277. *Hordeolum. Tuberculum* cyſticoſum, ouatum, in limbo pulpebrarum, ſuppurans ſaepius apice. Cullen G. 7.

278. *Verruca. Papilla* neruea intumeſcens, indurata. *Papula* durior, ſcabra ſicca, indolens. Cullen G. 133.

279. *Clauus. Verruca* (278) calloſa, in tendinibus radicata, baſi ſenſibilis. Cullen G. 134.

280. *Myrmecium. Verruca* (278) madida, mollis, denudata.

281. *Eſchara. Cruſta* mortua, ab humoribus extravaſatis coagmentata, decidua.

O. V.

O. V. Tumores protuberantes. Cullen Cl. IV. O. 6.

282. *Aneurisma.* *Arteriae* dilatatio. Tumor mollis, pulsans, concolor, rotundatus. Cullen G. 136.

283. *Varix.* *Venae* dilatatio. Tumor mollis, quiescens, concololor, rotundatus. Cullen G. 137.

284. *Scirrhus.* *Glandula* indurata. Nodus durus, asper, concolor, indolens, rotundatus, pressione insensilis. Cullen G. 129.

285. *Struma.* *Glandula* infarcta. Nodus indolens, solidiusculus, pressione obtuse sentiens. Cullen G. 83.

286. *Atheroma.* Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliusculus, indolens, absque cystide. Cullen G. 135.

287. *Anchylosis.* *Tumor Geniculorum* ligamenti capsulaeque tensione expressa Synouia. Tumor ad genicula, mollis, pulposus, concolor.

288. *Ganglion.* Tumor *Tendinibus* innatus, ouatus, mobilis, pulposus indolens. Cullen G. 136.

289. *Natta.* Tumor tunicatus, musculis irradicatus, eminens, pulposus, indolens.

290. *Spinola.* Tumor supra *vertebras lumborum* mollis, exiguus, vertebrarum processibus dehiscentibus. Cullen G. 76.

291. *Exostosis.* Tumor durus ex osse prominente enatus. Cullen G. 139.

O. VI. Procidentiae.

292. *Hernia.* *Intestini* obtecti vltra propriam sedem protusio. Cullen G. 140.

293. *Prolapsus.* *Viscus* nudum relaxatum, elongato propendens vltra proprium locum. Cullen G. 141.

294. *Condyloma.* *Tunica interior* relaxata gibba.

295. *Sarcoma.* *Caro nuda* enata e viuo vulnere. Cullen G. 132.

296. *Pterygium.* *Cuticula* excrescens e cantho oculi, superficiem eius obtegens.

297. *Ectropium.* *Palpebra* inferior resupinato-inuersa.

298. *Phimosis.* *Praeputii* intumescentia inflammata, glandem denudans incarceransve. Cullen G. 6.

299. *Clitorismus.* *Clitoridis* intumescentia extra sinum pudoris.

O. VII. Deformationes.

300. *Contractura.* *Geniculorum* fixatio rigida. Cullen G. 114.

301. *Gibber.* *Thoracis* dilatatio prominens.

302. *Cor-*

302. *Lordosis. Ossium* incuruatio.

303. *Distortio. Ossium* ad latus non naturale flexio.

304. *Tortura. Oris* ad latus flexio.

305. *Strabismus. Oculi* distorti et inaequaliter moti. Cullen G. 113.

306. *Lagophthalmia. Oculi* sursum visio palpebra superiore abbreuiata.

307. *Nyctalopia. Oculi* visus nocturnus.

308. *Presbytia. Oculi* visus remotus. Cullen G. 93.

309. *Myopia. Oculi* visus approximatus. Cullen G. 93.

310. *Labarium. Dentes* vacillantes in suis alveolis.

311. *Lagostoma. Labium* superius oris fissum.

312. *Apella. Praeputii* abbreuiatio absque inflammatione.

313. *Atreta. Meatus* corporis imperforatus.

314. *Plica. Capillorum* contortuplicatio indissolubilis. Cullen G. 89.

315. *Hirsuties. Pili* copiosiores longioresque.

316. *Alopecia.* *Pilorum* defluuium.

317. *Trichiasis.* *Ciliorum* distortio.

O. VIII. Maculae.

318. *Cicatrix.* *Callus* replens vlcerationes consolidatas.

319. *Naeuus.* *Macula* quaecunque congenita.

320. *Morphaea.* *Macula alba*, depressa, lata.

321. *Vibex.* Lineae *sanguinicolores* sub cuticula.

322. *Sudamen.* Maculae *rubrae*, pulicares, glabrae, pungentes, euanescentes.

323. *Melasma.* Macula *caerulescens* in parte tecta.

324. *Hepatizon.* Macula *grisea*, subaspera, pruriens.

325. *Lentigo.* Maculae *griseae*, confluentes, insensiles.

326. *Ephelis.* Color *fuscus* partis insolatae.

Heu mihi! tot mortes homini, quot membra; malisque
Tot sumus infecti, Mors vt Medicina putetur.

THEO-

THEORIA.

1. *Corpus* viuum conſtat *Medullari* cerebroſo, et *Corticali* ſolido fluidoque.

2. *Vita* ſentiens mouensque reſidet in Medullari primordiali, continuato, multiplicatiuo.

3. *Medullare* arcte cuſtoditum, neruis expanſis tentaculatum, fabricat ſuum Corticale ſolidum e fluidis vegetabilium, et fluida haec viciſſim per ſolida praeparat.

4. Medullare hoc *nutritur* tenuiſſimo ſpirituoſo liquido corticali, ſed *flagrat* electrico pulmonibus hauſto.

5. Medullare ſentiens ſe pandit ad *gratum* ſalutare, et mouens ſe retrahit ad *ingratum* noxium.

6. Fluidum corticale, e quo ſolida, ſoluitur deſtruiturque *Acidis* aut *Putridis*, vtrisque multiplicatiuis. Sic vitiatur Sanguis putrido, Serum acido.

7. His dum reſiſtit ſentiens mouens, oriuntur *Febres: Criticae* ab aceſcente, *Phlogiſtica* a putreſcente, et *Exanthematicae* a viuo? peregrino multiplicabili.

8. *Fluidorum* nociua ingrata eliminare ſtudet vita per vias naturales et artificiales, et quo haec periculoſiora, eo cutis, per datam ſic portam ſimul eiicit quaeuis impura: ſed duas portas ſimul apertas non facile admittit, ne exhauriatur*).

9. Quid-

*) Euacuationes duae ſimul et ſemel poſſunt vix ſtare.

9. Quidquid praecipue aduerſum ſentit, praecipue curat vel minora maioribus adſociat *), vt tota ſe his opponat.

10. *Corticale* ſolidum deteritur vitiaturque quotidie, adeoque quotidie reparandum; reparatur autem *Diaeta*, eaque multiplici: ab appropriata bene, ab erronea peruerſe, vnde defectus, *Morbi* dicti.

11. *Morbi* tolluntur contraria cauſa **), hanc vt citius natura obtineat, Toxica miſceantur ingerendis, *Medicamenta* dicta.

12. *Contraria* haec ex ſapidis in fluida ſolidaque et ex *Olidis* in medullare agentibus dignoſcenda ſunt. E contrariis itaque ſaporibus et odoribus primaria medicamenta eruenda; in his itaque *Clauis Materiae Medicae.*

Qualitates Medicamentorum.

I. Sapida.

Agunt in *Corticale* vitale.

	in *Fluidis*	in *Solidis*
1. *Aquoſa.*	Mundificantia,	Humectantia.
	Abſorbentia.	Exſiccantia, Sicca. 1.
2. *Acida.*	Refrigerantia,	Attenuantia.
	Balſamica.	Tonica, Amara. 2.
3. *Dulcia.*	Edulcorantia,	Impinguantia.
	Incidentia,	Corrodentia,
		Acria. 3.

4. *Viſ-*

*) Dolor dolorem trahit.

**) Morbi morbis curantur.

4. *Viscosa.*	Inuiscantia,	Lubricantia.
	Penetrantia.	Abstergentia, Salsa. 4.
5. *Pinguia.*	Obtundentia.	Emollientia.
	Inspissantia.	Adstringentia. Stiptica. 5.

II. Olida.

Agunt in *Medullare* animatum.

Sensum excitant *Aromatica*, sopiunt *Virosa*.
Motum spasticant *Orgastica*, euacuant *Nauseosa*.
Iudicium acuunt *Spirituosa*, confundunt *Tetra*.
Libidinem prouocant *Ambrosiaca*, suffocant *Hircina*.

Dritte Abtheilung.

Bestimmung der Gattungen der Krankheiten durch Rudolph August Vogeln.

Siehe dessen Definitiones Generum Morborum. Goettingae. 1764.

TABVLA CLASSIVM MORBORVM.

I. *Febres.* Innati caloris argumentum praeternaturale, cum oris siccitate et grauitate corporis. Cullen Cl. I. O. 1.

II. *Profluuia.* Humorum euacuatio, ab ordine, quantitate, aut qualitate naturali abhorrens. Cullen Cl. I. O. 5.

III. *Epischeses.* Excernendorum suppressiones. Cullen Cl. IV. O 5.

IV. *Dolores.* Sensationes molestae, corporis et animi tranquillitatem turbantes.

V. *Spasmi.* Solidorum mobilium contractiones vel agitationes. Cullen Cl. II. O. 3.

VI. *Adynamiae.* Sensationum, motuum, naturaliumue functionum defectus, aut imminutiones. Cullen Cl. II. O. 2. und Cl. IV. O. 2. A. 2.

VII. *Hy-*

VII. *Hyperaesthheses.* Sensationes auctae, vel perversae. Cullen Cl. IV. O. 2. A. 1.

VIII. *Cachexiae.* Male colorata corporis constitutio, cum debilitate. Cullen Cl. III.

IX. *Paranoiae.* Mentis aberrationes. Cullen Cl. II. O. 4.

X. *Vitia.* Mutationes in superficie corporis conspicuae. Cullen Cl. IV.

XI. *Deformitates.* Aberrationes solidorum ab ordine, positura, habitu, figura, numero, aliisque qualitatibus.

I. Fe-

Cl. I. Febres. Cullen Cl. I.

O. I. Intermittentes. Cullen Cl. I. O. 1. Abschn. 1.
Aeſtus ad ſummum 18 horas perdurat, dein aliquamdiu ceſſat, poſteaque reuertitur praeuio frigore.

1. Simplices.

1. *Quotidiana*. Quolibet die aut nocte recurrit. Cullen G. 3.

2. *Tertiana*. Vno die vel nocte una inuadit, ſequente intermittit, tertio repetit. Cullen G. 1.

3. *Quartana*. Vno die vel vna nocte inuadit, dein biduum intermittit, quarto iterum redit. Cullen G. 2.

4. *Quintana*. Singulo quinto die redit. Cullen G. 2.

5. *Sextana*. Singulo ſexto die repetit. Cullen G. 2.

6. *Septana*. Singulo ſeptimo die reuertitur. Cullen G. 2.

7. *Octana*. Quolibet octauo die redit. Cullen G. 2.

8. *Nonana*. Quouis nono die recurrit. Cullen G. 2.

9. *Decimana*. Quouis decimo die recurrit. Cullen G. 2.

10. *Vaga*. Alio poſt decimum diem, ſed haud fixo, recurrit. Cullen G. 2.

11. *Men-*

11. *Menstrua.* Viris circa fluxum haemorrhoidolem, vel etiam citra illum, foeminis circa catamenia accidit.

2. Duplicatae.

12. *Tertiana duplex.* Quotidie accidit, interdum quoque bis vno die vacuo, accessionis vero tempora alternis diebus respondent. Cullen G. I. 1. 2.

13. *Quartana duplex.* Inter quatuor dies tertium tantum a febre vacuum habet, et accessionis tempora alternatim praecedenti insultui respondent. Cullen G. 2. 1. d.

3. Triplicatae.

14. *Quartana triplex.* Quotidiana, paroxysmis quarto quouis die conspirantibus. Cullen G. 2. 1. e.

O. II. Continuae. Cullen Cl. I. O. 1. A. 2.

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, sed remissiones saltem inferunt cum exacerbationibus, quae vel quotidie, aut tertio die, aut quarto, alioue accedunt.

1. Simplices.

15. *Quotidiana continua.* Quotidie cum frigore accidit, calor vero per totum reliquum tempus durat. Cullen G. 3. 2.

16. *Synochus.* Facie rubra, cute humida, pulso magno et frequenti, crisi perfecta termi-

natur intra 21. dies. Species eius *Ephemera* est. Cullen S. 4. und 6.

17. *Amatoria.* Febris paucarum horarum a magno frigore incipiens, ex vehementi concubitus expectatione.

18. *Phrenitis.* Febris acuta, dolor capitis, delirium constans et vehemens. Cullen S. 6.

19. *Epiala.* In qua frigoris sensus perpetuus cum rigore contingit.

20. *Causos.* Febris ardentissima, tertio quoque die acerbior, cum immensa siti, et siccissima atque nigra lingua.

21. *Elodes.* Febris cum profusissimo ac perpetuo sudore inde a primo die, et magno virium lapsu. *Typhodes* et *Sudor Anglicanus* eius species sunt.

22. *Lethargus.* Febris in qua sopor et ab expergefactione delirium, mox opprimente iterum sopore. Cullen S. 41.

23. *Typhomania.* Febris ex phrenitide et lethargo mixta. Cullen S. 41.

24. *Leipyria.* Febris in qua extrema algent, interna vruntur, pulsus paruus et obscurus.

25. *Phricodes.* Febris cuius decursum crebri horrores rigoresue interpellant.

26. *Lyn-*

26. *Lyngodes.* Febris in qua aeger a principio vsque ad crisin singultit.

27. *Assodes.* Febris in qua aeger fere irrequietus est, et implacide molesteque habet, vel fastidio agitatur.

28. *Cholerica.* Febris cum vomitu frequenti atque torminosa alui deiectione. Cullen G. 60.

29. *Syncopalis.* Febris cui frequens lipothymia se intermiscet.

30. *Hydrophobia.* Febris cum auersatione liquidorum, singultu, conuulsione, et delirio. Cullen G. 63.

31. *Oscitans.* Febris cum perpetua oscitatione.

32. *Ictericodes.* Auriginosa febris, quae cutem colore flauo inquinat, citra hepatis inflammationem.

33. *Pestilentialis.* Febris pandemia, contagiosa, acutissima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut vesiculae oriuntur cum leipyria, ingenti siti, spiritu, sudore, et deiectionibus foetidis, delirio, nausea, vomitu, pulsuque paruo ac obscuro. Cullen G. 26.

34. *Siriasis:* Febris infantibus propria, in qua cutis sicca, pallida, inappetentia, oculi concaui, fontanellae subsidentia. Cullen G. 9.

2. Compositae.

1. Exanthematicae. Cullen Cl. I. O. 3.

35. *Variolosa.* Synochus contagiosa, a vomitu, cephalalgia, et lumbagine incipiens, in qua tertio die maculae erumpunt, sensim in pustulas purulentas, escharoticas, deciduas, abeuntes. Cullen G. 27.

36. *Morbillosa.* Synochus contagiosa, cum tussi sicca et madore oculorum, in qua maculae rubellae, latescentes, paullum eleuatae erumpunt, quae deinceps in tenuissimas squamulas soluuntur. Cullen G. 29.

37. *Miliaris.* Phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut sensus punctorius in dorso, crure, ac intestinis, aut stupor in digitis, pustulae prurientes milii seminis magnitudine, rubrae vel albae, sero primum limpido, deinceps subalbo perlarum colore non dissimili, plenae, facie intacta, sudor multus foetidus. Cullen G. 30.

38. *Petechialis.* Febris maligna, exanthemata morsibus pulicum fere similia, flauescentia, rubra, vel liuida. Cullen bey G. 34.

39. *Scarlatina.* Synochus, maculae coccineae crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis subflauis, ad instar capitis acicularum, ornatae, fugaces, in squamulas dehiscentes. Cullen G. 31.

40. *Vr-*

40. *Vrticata.* Synochus quotidiana continua mitior, tubercula puncturis vrticarum similia, rubra, prominentia, fugacia. Cullen G. 32.

41. *Bullosa.* Maligna, vesiculae sero sublimpido repletae, magnitudine nucis auellanae et maioris, in variis corporis partibus, facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes. Cullen G. 33.

42. *Varicella.* Variolae spuriae; ephemera, pustulae variolis simillimae, prurientes, primo die erumpentes et suppurantes, tertio resiccatae, et in squamulas deciduae, toto morbo intra septem dies ad summum terminato. Cullen G. 18.

43. *Pemphingodes.* Febris, quae pustulas in ore, phlyctides dictas, generat.

44. *Aphthosa.* Maligna cum vlcusculis in ore superficialibus, fungosis,, mucosis, quas *aphthas* vocant. Cullen G. 34.

2. Inflammatoriae. Cullen Cl. I. O. 1.

45. *Phrenismus.* Vera inflammatio cerebri aut membranarum eius; quam ex dolore capitis et vehementi delirio febrili vulgo definiunt,

*) Haec Varicella facillimo illudere Medicis sub specie variolosae potest, nisi ad decursum accuratissime attendant; vnde dein bis vel ter laborare homines variolis existimantur.

unt, quae ſigna vero admodum ambigua. Cullen G. 9.

46. *Chemoſis.* Vehemens adnatae oculorum inflammatio, vt ſuper corneam feratur, acerbus dolor, peruerſio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia. Cullen G. 8.

47. *Ophthalmites.* Inflammatio interiorum oculi membranarum et praecipue choroideae; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo *Phlegmone* dicitur. Cullen G. 8.

48. *Otites.* Inflammatio auris internae; dolor immanis in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

49. *Angina.* Faucium inflammatio; febris continua, reſpirandi ac deglutienti difficultas, praefocationis metus. Cullen G. 10.

50. *Pleuritis.* Pleurae inflammatio, febris continua, dolor in latere thoracis pungens, tuſſis ſicca, dyſpnoea. Cullen G. 11. 2.

51. *Peripneumonia.* Pulmonum inflammatio; febris continua, dolor thoracis obtuſus, grauatiuus, tuſſis humida aliquando cruenta, difficultas anhelitus anguſtiaue. Cullen G. 11. 1.

52. *Mediaſtina.* Mediaſtini inflammatio; febris continua, incendium in thorace, offendiculum quoddam ad ſternum in inſpiratio-

ne,

ne, respiratio frequens, tussis cum sputis coloratis, orthopnoea; an semper? Cullen G. 11.

53. *Pericarditis.* Pericardii inflammatio; omnia ut in mediastina, vrgente morbo syncope. Cullen G. 13.

54. *Carditis.* Cordis inflammatio, symptomata fere vt in peripneumonia, sed grauiora, dolor vehemens in regione cordis, palpitatio, pulsus frequens ac inaequalis, hydrophobia; an semper? Cullen G. 13.

45. *Paraphrenitis.* Diaphragmatis inflammatio, febris continua, dyspnoea, dolor e regione ventriculi cinguli instar ventrem supra lumbos ambiens, delirium. Cullen G. 11.

56. *Gastritis.* Ventriculi inflammatio; febris, leipyria, dolor et ardor in epigastrio, sitis, vomitus ingestorum, singultus. Cullen G. 14.

57. *Enteritis.* Intestini inflammatio; febris assodes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, flatuum et stercoris retentio, aut dysenteria. Cullen G. 15.

58. *Hepatitis.* Iecinoris inflammatio; febris continua, hypochondrii dextri dolor tensiuus, tussis sicca, icterus, interdum vomitio bilis et per aluum deiectio. Cullen G. 16.

59. *Splenitis.* Lienis inflammatio; febris con-

tinua, hypochondrii sinistri distentio atque tumor, dolor pulsans, molestus dexter decubitus. Cullen G. 17.

60. *Mesenteritis.* Mesenterii inflammatio; febris varia occulta et lenta phricodes aut quotidiana continua, dolor colicae similis, egestiones chylosae et ichorosae, nullo doloris sensu defluentes. Cullen G. 13.

61. *Omentitis.* Omenti inflammatio; febris continua cum dolore et tumore in regione epigastrica et hypogastrica. Cullen G. 13.

62. *Peritonitis.* Peritonaei inflammatio; febris assidua, tumor ventris, et dolor punctorius. Cullen G. 13.

63. *Myocolitis.* Musculorum abdominalium inflammatio; symptomata vt in peritonite.

64. *Pancreatica.* Pancreatis inflammatio. Notae deficiunt.

65. *Nephritis.* Renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, vrina pauca, flammea, vel nulla, stupor cruris vicini, dolor testis vicini, ructus, vomitio. Cullen G. 18.

66. *Cystitis.* Vesicae vrinariae inflammatio; febris leuior, hypogastrii dolor ardens, pressorius, frequens meiendi stimulus, ischuria, tenesmus. Cullen G. 19.

67. *Hy-*

67. *Hysteritis.* Vteri inflammatio; febris continua, delirium, tumor hypogastrii inflammatorius, dolor in lumbis et inguine. Cullen G. 20.

68. *Erysipelacea.* Ephemera, erysipelatis expulsionem efficiens. Cullen G. 25.

69. *Podagrica.* Continua, synochos, cum dolentissimo rubore in pede. Cullen G. 23.

70. *Panaritia.* Continua, panaritii grauioris comes.

71. *Cyssotis.* Ani inflammatio, dolor, tenesmus.

3. Symptomaticae.

72. *Apoplectica.* Continua apoplexiae superueniens.

73. *Catarrhalis.* Vespertina, catarrhis socia.

74. *Rheumatica.* Quotidiana continua rheumatismo iuncta, multus sudor, interdum pustulae purulentae.

75. *Haemorrhoidalis.* Ephemera, dolor spinae, haemorrhoides, aut saltem varices dolentes circa quartum diem erumpentes, quo febris finitur.

76. *Lactea.* Ephemera, aliquot diebus a partu incidens.

77. *Vulneraria.* Grauiori vulneri superueniens.

78. *Suppuratoria.* Partium internarum inflammationibus, dum in suppurationes transeunt, superueniens, continua.

79. *Lenta.* Febricula quotidiana in morbo longo. Cullen G. 6.

80. *Hectica.* Quotidiana continua vehementior in morbo longo, cum sudore colliquatiuo et phthisi. Cullen nach G. 6.

Cl. II. Profluuia. Cullen Cl. I. O. 5.

1. Haemorhagiae. Cullen Cl. I. O. 4.

81. *Haemorrhagia.* Sanguinis e vulnere profusio. Cullen G. 115.

82. *Epistaxis.* Sanguinis e naribus profusio. Cullen G. 35.

83. *Haemoptoe.* Sanguinis ex ore et faucibus eruptio.

84. *Haemoptysis.* Sanguinis e pulmonibus aut trachea reiectio per tussim. Cullen G. 36.

85. *Stomacace.* Gingiuarum cruentatio. Cullen nach G. 38.

86. *Odontirrhoea.* Sanguinis ex alueolo dentis euulsi eruptio.

87. *Otorrhoea.* Sanguinis ex aure effluxus.

88. *Ophthalmorrhagia.* Sanguinis ex oculo eiusue cantho aut palpebris eruptio.

89. *Hae-*

89. *Haematemesis.* Vomitus cruentus; sanguinis e ventriculo per vomitum reiectio. Cullen nach S. 38.

90. *Hepatirrhoea.* Fluxus hepaticus, diarrhoea aquosa rubella instar loturae carnium recentium. Cullen S. 60.

91. *Catarrhexis.* Sanguinis puri ex aluo profusio.

92. *Haematuria.* Mictio e renibus cruenta, quae sanguine vrinae exquisite permixto perfunditur, ut ea quasi dilutus et tenuis sit sanguis. Cullen S. 38.

93. *Cystirrhagia.* Mictio cruenta e vesica dolorifica, qua sanguis vrinam non aequaliter perfundit, ac in imo subsidens in grumos concrescit; eius quoque portio aut grumus interdum citra vrinam excidit. *Haemorrhoides vesicae* appellant. Cullen nach S. 38.

94. *Stymatosis.* Haemorrhagia penis sine vrina, nulloque voluntatis arbitrio.

95. *Haematopedesis.* Sudor sanguineus: Sanguinis tenuis e poris cutis eruptio.

96. *Menorrhagia.* Sanguinis inordinata et larga ex vulua profusio. Cullen S. 38.

97. *Abortio.* Sanguinis ex vtero grauido profluuium, cum foetu immaturo aut mola subsequente. Cullen S. 38.

a. Apo-

2. Apocenoses. Cullen Cl. IV. O. 4.

98. *Catarrhus.* Tussis frequens, acris, cum raucitate. Cullen G. 39.

99. *Epiphora.* Lachrymae inuoluntarium profluuium. Cullen G. 117.

100. *Coryza.* Catarrhus narium cum seri tenuioris destillatione. Cullen G. 39.

101. *Otopuosis.* Puris ex aure effluxus; catarrhus auris sordidus. Cullen G. 3.

102. *Otoplatos.* Humiditatis olidae retro aurem excretio.

103. *Ptyalismus.* Copiosa saliuae profusio. Cullen G. 118.

104. *Vomica.* Subitanea, copiosa puris aut sanguinis nigri e pulmonibus reiectio per tussim. Cullen bey G. 11.

105. *Diarrhoea.* Copiosum sinceriorum humorum ex aluo profluuium, sine vehementi sensu doloris. Cullen G. 60.

106. *Puorrhoea.* Puris sinceri ex aluo excretio.

107. *Dysenteria.* Frequens, pauca, torminosa ac tenesmodes alui deiectio. Cullen G. 40.

208. *Lienteria.* Laeuites intestinorum qua, quae per aluum descendunt, alimentis assumptis substantia et colore finitima. Cull. G. 60.

109. *Coeliaca.* Laeuium aequalium et quasi chyli aut cremoris specie deiectio. Cullen G. 60.

110. *Cho-*

110. *Cholera.* Vomitus bilioſi multi aluique deiectiones, cum periadynia. Cullen G. 59.

111. *Pituitaria.* Mera pituitae, loco ſtercoris, excretio diuturna, cum contabeſcentia. Cullen G. 60.

112. *Leucorrhois.* Pituitae ſincerae et cruentae ex aluo excretio teneſmodes, periodica. Cullen G. 6c.

113. *Eneureſis* ſeu incontinentia vrinae; mictio vrinae inuoluntaria conſtans, ſine acrimoniae et doloris ſenſu. Cullen G. 119.

114. *Diureſis.* Immodica vrinae prorſus aqueae excretio, in morbo ſpaſtico, periodica. Cullen G. 61.

115. *Diabetes.* Immodicum vrinae profluuium diuturnum, ſub quo corpus contabeſcit. Cullen G. 61.

116. *Puoturia.* Mictio purulenta.

117. *Chylaria.* Vrinae mucoſae, albae, paucae, et quaſi verminoſae, excretio. *Glus Linnaei.* Cullen G. 123.

118. *Gonorrhoea.* Inuita ſeminis, liquoris, proſtatarum, ichoris, citra venerem, citra libidinis inſomnia, citraque colis tentiginem, profuſio. Cullen G. 120.

119. *Leucorrhoea.* Fluor albus; nimia muci aut ichoris ex vulua profuſio. Cullen G. 38.

120. *Exo-*

120. *Exoneirosis.* Pollutio; inuoluntaria, at iucunda seminis ex rigido cole profusio.

121. *Hydropedesis.* Sudor immodicus. Cullen G. 116.

122. *Galactia.* Lactis ex mammis stillicidium.

123. *Hypercatharsis.* Immodica purgatio ex operatione violentioris medicamenti colliquantis, vrentis, stimulantis.

124. *Ecphyse.* Flatuum ex vrethra aut vteri vagina eruptio.

125. *Dysodia.* Exhalatio foetida ex toto corpore aut eius parte.

Cl. III. Epischeses. Cullen Cl. IV. O. 5.

126. *Grauedo.* Catarrhus narium impeditus cum carebaria, voce haud bene sonora, spiritu nonnihil difficili, qui nec nisi hiante ore duci potest. Cullen G. 39.

127. *Flatulentia.* Flatuum impedita, supra infraque expulsio, cum intumescentia ventris. Cullen G. 44.

128. *Obstipatio.* Stercoris excretio impedita. Cullen G. 121.

129. *Ischuria.* Vrinae suppressio. Cullen G. 122.

130. *Amenorrhoea.* Menstrui sanguinis ex vtero

ro fluxus, ex toto vel ex parte cohibitus. Cullen G. 125.

131. *Dyslochia.* Lochiorum suppressio aut imminutio.

132. *Deuteria.* Secundinarum retentio.

133. *Agalaxis.* Lactis defectus.

Cl. IV. Dolores.

134. *Anxietas.* Molesta sensatio circa praecordia, quae praesentem rerum statum fastidit.

139. *Blestrismus.* Incontinens corporis iactatio et inquietudo.

136. *Pruritus.* Dolorifica voluptas in cute, hominem ad scalpendum excitans.

137. *Catapsyxis.* Sensus frigoris dolorificus in parte musculosa aut cutanea.

138. *Rheumatismus.* Cutis et musculorum dolor. *Lumbago*, *ischias*, *glossagra*, et *pleurodyne Sauuage* sunt species. Cullen G. 21.

139. *Arthritis.* Articulorum dolor; cuius species *chiragra*, et *gonagra.* Cullen G. 23.

140. *Cephalalgia.* Capitis dolor breuis.

141. Ce-

114. *Cephalaea*. Capitis dolor longus. Cullen G. 65.

142. *Clauus*. Capitis dolor in vertice cum sensu frigoris.

143. *Hemicrania*. Capitis dolor tensiuus alterutrum eius latus occupans.

144. *Carebaria*. Molestia capitis velut grauitas quaedam.

145. *Odontalgia*. Dolor dentium. Cullen G. 22.

146. *Haemodia*. Dentium stupor cum dolore.

147. *Odaxismus*. Gingiuarum dolor infantilis in dentitione.

148. *Otalgia*. Dolor auris internae et externae. Cullen G. 7.

149. *Acataposis*. Deglutitio difficilis.

150. *Cionis*. Dolorifica vuulae crassities.

151. *Himantosis*. Eiusdem solito maior longitudo et gracilitas. Cullen unter G. 141.

152. *Cardiogmus*. Anxietas cordis dolorifica, cum sensu ponderis et pulsatione.

153. *Mastodynia*. Mammarum dolor. Cullen G. 7.

154. *So-*

154. *Soda.* Dolor vrens calidus e ventriculo in fauces assurgens. Cullen S. 44. und 57.

155. *Periadynia.* Ventriculi dolor.

156. *Pneumatosis.* Dolorifica ventriculi a flatibus distentio. Cullen S. 71.

157. *Cardialgia.* Ventriculi dolor vehemens spasticus, cum nausea saepeque vomitu. Cullen S. 44.

158. *Encausis.* Ardor in stomacho cum inextinguibili siti. Cullen S. VII. 2.

159. *Nausea.* Inane vomendi desiderium. Cullen S. 44.

160. *Colica.* Dolor spasticus intestinorum cum obstipatione, nausea, et vomitu. Cullen S. 58.

161. *Eilema.* Dolor in intestino fixus velut clavi muro impacti.

162. *Ileus.* Colica acuta vomitu demum excrementorum. Cullen S. 58.

163. *Stranguria.* Vrinae densae rubrae mictio parca, frequens, ardore in vrethra excepta.

764. *Dysuria.* Vrinae stillicidium dolorificum citra ardorem in vrethra. Cullen S. 122.

165. *Lithiasis.* Difficilis mictio a calculo in organis vropoeticis, cum arenulis in vrina subsidentibus.

166. *Tenesmus.* Impetuosa, dolorifica desidendi cupiditas, qua nihil praeter pauca mucosa et cruenta egeritur.

167. *Clunesia.* Dolor in podice. *Proctica Sauvag.* et *Linn.* Cullen G. 7.

168. *Cedma.* Dolor in partibus genitalibus. *Pudendagra. Linn.*

169. *Hysteralgia.* Dolor ventris parturientium similis.

170. *Dysmenorrhoea.* Prófluuium sanguinis vterini menstruum dolorificum. Cullen G. 125.

171. *Dystocia.* Partus laboriosus, difficilis.

172. *Atocia.* Partus difficillimus, qui sine arte prorsus absolui non potest.

173. *Priapismus.* Colis erectio dolorifica permanens, citra libidinis stimulum.

174. *Psoriasis.* Durities scroti cum intensa prurigine, et interdum quoque exulceratione.

175. *Podagra.* Dolor rheumatico-arthriticus in pede acutus. Cullen G. 23.

176. *Osteocopus.* Dolor in osse fixus.

177. *Psophos.* Strepitus ossium.

178. *Volatica.* Dolor per tractum maiorum cutis vasorum oberrans. Cullen G. 21.

179. *Epi-*

179. *Epiphlogisma.* Ardor alicuius partis velut a pruna obortus. In aure dicitur *Pyrosis.*

Cl. V. Spasmi. Cullen Cl. II. O. 3.

180. *Tetanus.* Totius corporis aut solius ceruicis distentio rigida, dolorifica, acuta, qua flecti haud possit. Cullen G. 47.

181. *Opisthotonus.* Eadem distentio, sed qua corpus in posteriora curuatur. Cullen G. 47.

182. *Episthotonus.* Eadem, sed qua corpus in anteriora curuatur. Cullen G. 47.

183. *Catochus.* Tetanus cum priuatione sensuum. Cullen G. 47.

184. *Tremor.* Leuior totius corporis aut membri singularis concussio, sine frigoris sensu. Cullen nach G. 42.

185. *Frigus.* Cum extrema partes membrorum inalgescunt.

186. *Horror.* Totius corporis algor cum tremore.

187. *Rigor.* Idem et violentior cum trismo et sensu frigoris in interioribus partibus.

188. *Epilepsia.* Agitatio conuulsiua vniuersalis, chronica, periodica, cum oppressione sensoriorum, exituque spumae ex ore. Cullen G. 52.

189. *Eclampsia.* Epilepsia acuta. **Cullen S.** 52.

190. *Hieranosos.* Agitatio corporis vel artuum conuulsiua, continua, chronica, cum integritate sensuum. **Cullen S.** 49.

191. *Conuulsio.* Agitatio corporis vel artuum violenta, periodica, cum integritate sensuum. **Cullen S.** 49.

192. *Raphania* (*Linnaei*). Conuulsio cum spastica articulorum contractione et dolore immani, periodica. **Cullen S.** 51.

193. *Chorea.* Conuulsio saltatoria aut procursiua. *Tarantismus* est species. **Cullen S.** 50.

194. *Crampus.* Digitorum manuum pedumque, aut crurum extensio vel contractio violenta, dolorifica, breuis.

195. *Scelotyrbe.* Immanis continuaque crurum contractio et obrigescentia. **Cull. S.** 50.

196. *Angone.* Faucium praefocatio acuta, sine inflammatione. *Angina conuulsiua* et *suffocatio hysterica* eius sunt species.

197. *Glossocele.* Linguae violenta, acuta, extrusio.

198. *Glossocoma.* Linguae violenta, acuta, reuulsio.

199. *Hippos.* Oculorum constans agitatio; malum ab ortu contractum.

200. *Illosis.* Oculorum peruersio acuta.

201. *Cinclesis.* Palpebrarum nictitatio perpetua.

202. *Cataclasis.* Alterutrius oculi occlusio spastica, acuta.

203. *Cillosis.* Cilii superioris perpetuus tremor.

204. *Sternutatio.* Membranae narium agitatio conuulsiua, impetuosam aëris inspirationem, similemque mox expulsionem per nares cum strepitu inducens.

205. *Tussis.* Conuulsiua et sonora aëris e pulmonibus expulsio. **Cullen** S. 39.

206. *Clamor.* Vocis anxia exaltatio.

207. *Trismus.* Stridor dentium inter se collisorum.

208. *Capistrum* s. *Spasmus Maxillae inferioris.* Immobilitas eius, qua os arcte clauditur. **Cullen** S. 48.

209. *Sardiasis.* s. *Spasmus Cynicus.* Spasmus musculorum faciei et oris, quo in obliquum torquentur.

210. *Gelasmus.* s. *Risus sardonius.* Inuoluntarius risus, sub quo animus non gaudio, sed dolore atque iracundia plerumque effertur.

211. *Incubus*. Suffocatio in somnio terrifico, respirationem offendens, vocemque intercipiens. Cullen G. 67.

212. *Singultus*. Inspiratio conuulsiua subitanea velocissima, sonora recurrens.

213. *Palpitatio*. Cordis, visceris, musculi, tendinis, arteriaeue, temporaria agitatio. Cullen zum Theil unter G. 53.

214. *Vomitus*. Violenta contentorum in ventriculo per os reiectio. Cullen G. 44.

215. *Ructus*. Violenta flatus ventriculi inclusi per os explosio.

216. *Ruminatio*. Cum cibus e ventriculo in os vicissim masticandus iterumque deglutiendus, citra voluntatem, impellitur.

217. *Oesophagismus* s. *Spasmus Oesophagi*. Ciborum deglutitorum in oesophago subsistentium remora dolorifica.

218. *Hypochondriasis*. Anxietas praecordialis, cum spasmis ventriculi ac intestinorum variisque congestionibus coniuncta, chronica. Cullen G. 45.

219. *Hysteria*. Eadem in mulieribus. Cullen G. 62.

220. *Phlogosis* s. *Aestus volaticus*. Subitus fugaxque aestus cum rubore faciei.

221. *Digitium.* Primae phalangis digitorum inuita et conſtans incuruatio. Cullen G. 114.

Cl. VI. Adynamiae. Cullen Cl. II. O. 2. und Cl. IV. O. 2. A. 2.

222. *Laſſitudo.* Ingrata et grauatiua ſenſatio impotentiae ad motum.

223. *Aſthenia.* Languor aut debilitas corporis.

224. *Torpor.* Senſus motusque imminutus in parte carnea.

225. *Adynamia.* Impotentia, qua ſe aegri nullo modo mouere aut in lecto erigere poſſunt.

226. *Paralyſis.* Senſus motusue aut vtriusque defectus in ſingulari parte externa. Cullen G. 42.

227. *Paraplegia.* Omnium partium ſub collo, aut ſaltem medii corporis artuumque inferiorum paralyſis. Cullen G. 42.

228. *Hemiplegia.* Paralyſis alterutrius lateris. Cullen G. 42.

229. *Apoplexia.* Subita functionum animalium ceſſatio, cum ſtertore et magno pulſu. Cullen G. 41.

230. *Catalepſis* ſ. *Catoche.* Subita functionum animalium ceſſatio, in qua correptus vigilantis formam figuramque retinet, articulique eum ſitum, qui ipſis datur. Cullen G. 41.

231. *Carus.* Veternus sopor, liberam respirationem sine stertore conseruans, ex quo aegri vix excitantur. Cullen G. 41.

232. *Coma* s. *Cataphora.* Sopor in quo aegri vellicati euigilant, et mox in ipsum relabuntur. Cullen G. 41.

233. *Somnolentia.* Inclinatio in somnum iusto maior.

234. *Hypophasis.* Albi oculorum inter dormiendum subapparitio.

235. *Ptosis.* Impotentia attollendi palpebram superiorem.

236. *Amblyopia.* Visus imbecillitas integro oculo. Cullen G. 92. und 93.

237. *Mydriasis.* Pupillae dilatatio, quae visioni nocet. Cullen G. 92.

238. *Amaurosis.* Caecitas sine sensibili oculorum labe, praeter mydriasin. Cullen G. 92.

239. *Cataracta.* Coecitas cum obscurata lente, retro pupillam conspicua. Cullen G. 91.

240. *Synizesis.* Coecitas cum pupillae coalitione. Cullen G. 91.

241. *Glaucoma.* Coecitas turbatis humoribus et oculo flaccido. Cullen G. 91.

242. *Achlys.* Corneae obscuritas, visum imminuens aut tollens. Cullen G. 91.

243. *Nyctalopia.* Visus noctu saltem contingens.

244. He-

244. *Hemeralopia.* Visus noctu abolitus.

245. *Hemalopia.* Visus dimidiatus.

246. *Dysecoia.* Imbecillitas auditus. Cullen G. 95.

247. *Surditas.* Auditus abolitus. Cullen G. 95.

248. *Anosmia.* Odoratus abolitus. Cullen G. 97.

249. *Apogeusis.* Gustus abolitus. Cullen G. 98.

250. *Asaphia.* Vocis obscuritas. Cullen G. 111.

251. *Clangor.* Vox acuta cum stridore. Cullen G. 111.

252. *Raucitas.* Vox aspera et obscura, quae vix nisi a prope adstantibus exaudiri potest. Cullen G. 39. und 111.

253. *Aphonia.* Vocis priuatio. Cullen G. 109.

254. *Leptophonia.* Vitium vocis nimium gracilis. Cullen G. 111.

255. *Oxyphonia.* Vox acuta, qualis edi solet cum eiulatu et planctu. Cullen G. 111.

256. *Rhenophonia.* Vox nasalis, quae ex naribus haud simul editur. Cullen G. 111.

257. *Mutitas.* Loquelae priuatio. Cullen G. 110.

258. *Traulotis.* Blaesitas. Vitiosa litterarum *s* et *r* pronuntiatio. Cullen G. 112.

259. *Psellotis.* Balbuties. Cum inter pronun-

ciandum aut littera aut ſyllaba aufertur et eliditur. Cullen G. 112.

260. *Iſchnophonia.* Vitium pronuntiationis, quo ſyllaba ſyllabae cito copulari non poteſt. Cullen G. 112.

261. *Battariſmus.* Vitium pronuntiationis, quo ſermo praecipitatur, vnaque ſyllaba aliquoties cum celeritate repetitur. Cullen G. 112.

262. *Suſpirium.* Inſpiratio lenta, profunda, gemebunda

263. *Oſcitatio.* Inſpiratio tarda, profunda, aperto ore.

264. *Pandiculatio.* Oſcitatio cum artuum extenſione.

265. *Apnoea.* Reſpiratio adeo rara et parua, vt plane ſpiritus periiſſe videatur.

266. *Macropnoea.* Reſpiratio per longa interualla contingens.

267. *Dyſponea.* Reſpirandi difficultas continua, leuior. Cullen G. 55.

268. *Aſthma.* Reſpiratio difficilis periodica, chronica, cum ſenſu auguſtiae in faucibus. Cullen G. 54.

269. *Orthopnoea.* Reſpiratio ſuffocatoria acuta, non niſi erecto ceruice peragenda. Cullen G. 55.

270. *Pnigma.* ſ. *Catarrhus Suffocatiuus.* Difficillima

cillima respiratio, cum subitanea sensuum motusque interceptione, stertore, pulsuque intermittente.

271. *Renchus* s. *Stertor*. Sonus ex naribus editus.

272. *Rhochmos*. s. *Ronchus*. Sonus stertorosus intra fauces.

273. *Lipothymia*. Subita sensus motusque interceptio, cum sudore frigido, tinnitu aurium, pulsu ac respiratione debili. Cullen G. 43.

274. *Syncope*. Eadem grauior, nullo pulsu, nulla respiratione perceptibili, abolitoque omni sensu, et extincto calore. Cullen G. 43.

275. *Asphyxia*. Abolitio pulsus. Cullen G. 43.

276. *Apepsia*. Concoctionis ciborum in ventriculo priuatio. Cullen G. 44.

277. *Dyspepsia*. Tarda difficilisque concoctio. Cullen G. 44.

278. *Diaphthora*. Ciborum corruptio in ventriculo. Cullen G. 44.

279. *Anorexia*. Inappetentia sine fastidio ciborum. Cullen G. 106.

280. *Anatrope*. Inappetentia nauseabunda.

281. *Adipsia*. Sitis defectus. Cullen G. 107.

282. *Acyisis*. Sterilitas muliebris; conceptionis defectus.

283. *Age-*

283. *Agenesia*. Rei venereae impotentia in viro; libidinis defectus. Cullen G. 108. und 124.

284. *Anodynia*. Doloris defectus.

Cl. VII. Hyperaesthises. Cullen Cl. IV. O. 2. A. 2.

285. *Antipathia*. Certarum rerum visu, olfactu, aut gustu percipiendarum, talis auersatio, vt ex earundem perceptione grauia symptomata inducantur.

286. *Agrypnia*. Somni defectus.

287. *Phantasma*. Perceptio corporum ante oculos obuersantium, quae non adsunt. Cullen G. 94.

288. *Caligo*. Qua subito visui omnia nigra se repraesentant. Cullen G. 91.

289. *Haemalopia*. Qua omnia rubra apparent.

290. *Marmaryge*. Fulgor ante oculos coruscans. Cullen G. 94.

291. *Dysopia*. Visus duplicatus. Cullen G. 93.

292. *Susurrus*. Soni non existentis perceptio. Cullen G. 96.

293. *Vertigo*. Imaginatio, qua omnia homini cum semetipso circumagi videntur.

294. *Apogeusia*. Sapor in ore deprauatus.

295. *Polydipsia.* Continuum potus desiderium. Cullen G. 101.

296. *Bulimus.* Vehemens fames, cum lipothymia. Cullen G. 100.

297. *Addephagia.* Voracitas. Cullen G. 100.

298. *Cynorexia.* Fames canina; addephagia cum vomitu subsequente. Cullen G. 100.

299. *Allotriophagia.* Rerum non esculentarum deuoratio arbitraria. Cullen G. 102.

300. *Malacia.* Earundem anxia appetentia. Cullen G. 102.

301. *Pica.* Certi cibi assumendi, aut rei olfaciendae vehemens desiderium. Cullen G. 102.

302. *Bombus.* Murmur ex flatibus, quod auribus percipitur.

303. *Celsa.* Sensus flatus, vaporis, aut formicarum oberrantium subter cute.

Cl. VIII. Cachexiae. Cullen Cl. III.

304. *Cachexia.* Corpus graue atque iners, colore pallido squalidum.

305. *Chlorosis.* Cachexia in virginibus colore ex pallido virescente. Cullen G. 46.

306. *Icterus.* Cachexia cum flauo cutis colore, vrina obscure rubra, tingente immissa linteamina colore croceo. Cullen G. 90.

307. *Melanchlorus.* Cachexia cum subnigra cutis

tis colore, vrina de natiuo statu haud decedente.

308. *Atrophia.* Extenuatio corporis, aut partis eius, sine febre lenta et hectica. Cullen S. 69.

309. *Tabes.* Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, at sine dyspnoea et tussi. Cullen S. 68.

310. *Phthisis.* Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, dyspnoea et tussi*). Cullen bey S. 36.

311. *Hydrothorax.* Cachexia cum dyspnoea et effusione aquae intra pectus, strepitum concussione intus facientis. Cullen S. 77.

312. *Rachitis.* Atrophia infantum cum epiphysium protuberantia. Cullen S. 82.

313. *Anasarca.* Totius corporis intumescentia, aquosa, mollis, digiti impressi vestigium aliquamdiu retinens, cum pallore cutis. Cullen S. 74.

314. *Ascites.* Tumor abdominis, scroti, et crurum aquosus, cum atrophia superiorum partium. Abdomen impulsum sonum collectae permotaeque intus aquae praebet. Cullen S. 78.

315. *Hy-*

*) In *Atrophia* sola pinguedo absumitur, nec aeque restituitur; in *tabe* et *phthisi* caro simul minuitur.

315. *Hydrocystis.* Hydrops saccatus pleurae, peritonaei, aut visceris abdominalis.

316. *Tympanites.* Tumor abdominis renitens, pulsatione sonitum edens, cum obstipatione et atrophia. Cullen G. 72.

317. *Hysterophyse.* Tumor hypogastrii ab vtero flatu distento. Cullen G. 73.

318. *Scorbutus.* Cachexia cum lassitudine, maculis artuum liuidis, stomacace, vlceribus. Cullen G. 85.

319. *Siphylis.* Cachexia contagiosa ex contagio venereo, cum tumoribus ossium et vlceribus faucium partiumque obscoenarum, praegressis plerumque bubonibus aut gonorrhoea. Cullen G. 84.

320 *Lepra Graecorum* s. *Psora.* Pertinacissima scabies totius corporis vel partis, sicca, dura, aspera, serpentibus pustulis furfuracea. Cullen G. 87.

321. *Elephantiasis* s. *lepra Arabum.* Mutatio cutis in tumores liuidos, duros, saniem foetidam crustosam emanantes. Cullen G. 86.

322. *Elephantia Arabum.* Eadem duntaxat in pede valde tumido et duro. Cullen G. 86.

323. *Plica* s. *Rhopalosis.* Vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab humore glutinoso ita in cirrhos contorquentur, vt explicari nullo modo possint. Cullen G. 89.

324. *Phthi-*

324. *Phthiriasis.* Morbus pedicularis, quo pediculi variis in corporis partibus copiose emergunt.

325. *Physconia.* Intumescentia abdominis longa, a magnitudine habituue visceris mutato. Cullen G. 81.

326. *Paratyisis.* Grauiditas a natura abhorrens retardatione aut alieno situ foetus extra vterum.

327. *Gangraena.* Inflammatae partis liuor et mortificatio foetida, cum pustulis ichorosis; sensus doloris hebes. Cullen nach G. 37.

328. *Sphacelus.* Perfecta mortificatio, qua pars sensum, motum et innatum calorem tota amisit, fitque prorsus nigra, mollis, putris, et cadauerosa. Cullen nach G. 7.

Cl. IX. Paranoiae. Cullen Cl. II. O. 4.

329. *Athymia.* Animi abiectio, consternatio, tristitia, desperatio.

330. *Delirium* (*Paraphrosyne.*) Mentis alienatio in febre haud constans, nec furibunda. *Carpologia* eius est species. Cullen G. 66. n. 3.

331. *Mania.* Insania longa, ridicula aut furibunda. *Furorem vterinum* et *Satyriasin* pro speciebus habeo. Cullen G. 66.

332. *Melancholia.* Insania longa cum modestia ac timore. *Nostalgia* eius species est. Cullen G. 65.

333. *Ec-*

333. *Ecstasis.* Insania, quae breui tempore durat. Cullen G. 41.

334. *Ecplexis.* Excessus mentis, qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa causa affertur.

335. *Enthusiasmus.* Est veluti cum quidam in sacris faciendis mente capiuntur, si qua viderint audiuerintue.

336. *Stupiditas, Morosis, Fatuitas.* Mentis imminuta et infirma functio, seu quaedam ignauia, citra delirium et soporem. Cullen G. 44.

337. *Amentia, Anoia.* Imaginationis vel mentis occasus atque priuatio, qua iam ab ipso ortu affecti vix mentis inopia loqui discunt. Cullen G. 64.

338. *Obliuio,* Memoriae priuatio. Cullen G. 64.

339. *Somnium.* Visum, quod in somno recurrit, tanquam verum sit existimatum. *Pauor* eius est species. Cullen G. 67.

340. *Hypnobatasis.* Somnium in quo homo assurgit, ambulat, et diuersa vigilantium opera exercet. Cullen G. 67.

Cl. X. Vitia. Cullen Cl. IV.

O. 1. Inflammationes.

341. *Ophthalmia.* Inflammatio albi oculorum. Cullen G. 8.

342. *Blepharotis.* Inflammatio palpebrarum.

343. *Eryſipelas.* Inflammatio lata cutis, quae ſplendet et leuiter ac aequaliter tumet. Cullen G. 7. 2.

344. *Hieropyr.* Eryſipelas cum eminentibus ardentibus puſtulis. *Zoſter* dicitur, ſi abdominis cutem occupat. Cullen G. 7. 2.

345. *Paronychia.* Inflammatio dolorifica in ſummitate digitorum. Cullen G. 7.

346. *Onychia.* Inflammatio digiti lateralis ab vngue profundius in cutem demerſo.

347. *Encauſis.* Inflammatio cutis ab uſtione. Cullen G. 7.

348. *Phimoſis.* Inflammatio, aut oedematodes tumor praeputii, quo glans nudari non poteſt. Cullen G. 7.

349. *Paraphimoſis.* Inflammatio praeputii, retro glandem adducti, ut eam tegere non poſſit. Cullen G. 7.

350. *Pernio.* Cutis rubor ardens, pruriens, a frigore; in exulcerationem tendens. Cullen G. 7

O. 2. Tumores. Cullen Cl. IV. O. 6.

351. *Phlegmone.* Tumor dolens renitens inflammatorius cum rubore, oui ſaltem gallinacei magnitudine. Cullen G. 7.

352. *Furun-*

352. *Furunculus.* Tuberculum acutum apostematodes, ouum columbium, magnitudine non excedens. Cullen G. 7.

353. *Anthrax.* Quasi malignus furunculus, qui partem mox adurit, pustulas circum se ardentissimas ciet, tandem crusta nigra vel cinerea obducitur, et corruptae carnis lobum excutit, qua excidente vlcus cauum sordidumque manet. Cullen G. 7.

354. *Abscessus.* Collectae in inflammato loco materiae in pus aut in alienam substantiam conuersio. Cullen nach G. 7.

355. *Onyx.* Abscessus inter corneae laminas.

356. *Hippopyon.* Abscessus intra oculum.

357. *Phygethlon.* Phlegmone in glandulis emergens. Cullen G. 7.

358. *Empyema.* Abscessus in thorace. latus aut partem eius in tumorem attollens, cum febre hectica, praegressa pleuritide vel peripneunonia. Cullen nach G. 11.

359. *Phyma.* Tumor glandularum, simplici phlegmone atque phygethlo minor, planior, minusque rubens ac dolens.

360. *Ecthymata.* Tubercula ex cute subito erumpentia, modo rubra fugacissima.

361. *Vrticaria.* Tubercula puncturis vrticarum similia, rubra, prurientia, fugacia, acuta. Cullen G. 32.

362. *Parulis.* Tuberculum dolens inflammatum in gingiuis. Cullen G. 7.

363. *Epulis.* Tuberculum in gingiuis sine inflammatione.

364. *Anchylops.* Tumor durus inflammatorius apostematodes in cantho oculi interno.

365. *Paraglossa.* Lingua tumida.

366. *Chilon.* Labium tumidum ct inflammatum. Cullen G. 44.

367. *Scrofula.* Tumor glandularum colli et mesenterii indolens obduratus. Cullen G. 83.

368. *Bubon.* Tumor glandulae inguinalis. Cullen G. 131.

369. *Bronchocele.* Tumor glandulae thyreoideae.

370. *Parotis.* Tumor glandulae eiusdem nominis. Cullen G. 131.

371. *Gongrona.* Collum tumidum.

372. *Sparganosis.* Tumor mammarum in lactantibus a lactis copia.

373. *Coi-*

373. *Coilima.* Iutumeſcentia abdominis ſubita, flatulenta.

374. *Scirrhus.* Tumor durus, indolens, concolor, renitens. Cullen G. 129.

375. *Cancer.* Tumor durus, dolore lancinante grauis, inaequalis, liueſcens aut nigricans. Cullen G. 130.

376. *Sarcoma.* Carnis incrementum tuberculi tumoriſue ſpecie. Cullen G. 132.

377. *Polypus.* Sarcoma intra nares, praelongum, pluribus appendicibus adhaerens.

378. *Condyloma.* Tuberculum durum, pene indolens in ani margine. Eius ſpecies *Ficus* et *Thymus* a figura ita dictae.

379. *Ganglion.* Tumor durus, concolor, indolens tendini inſidens. Cullen G. 136.

380. *Ramula, Batrachus.* Tumor ad frenulum linguae folliculoſus materiam ſpiſſam aut tofaceam complexus.

381. *Terminthus.* Tuberculum rotundum, nigrum, praeſertim in tibiis enaſcens, humorem glutinoſum et ſubrubrum exulceratione emittens. Cullen G. 7.

382. *Oedema.* Tumor frigidus, laxus, mollis, indolens, circumſcriptus aut diffuſus, preſſo digito cedens.

383. *Encephalocele.* Cerebrum per hiatum calvae extrorſum eminens.

384. *Hydrocephalum.* Capitis monſtroſus tumor a collecta aqua in cute aut ſubter caluaria. Cullen G. 75.

385. *Hydrophthalmia.* Totius oculi tumor cum aliquo dolore, adeo vt is palpebris operiri non poſſit.

386. *Spina bifida.* Tumor aquoſus exiguus, in nucha aut inferiore ſpinae loco, poſterioribus vertebrarum dehiſcentibus proceſſibus emergens. Cullen G. 76.

387. *Hydromphalus.* Tumor vmbilici ab humore in eodem conſiſtente.

388. *Hydrocele.* Tumor tumicarum, quibus teſtis comprehenditur, aquoſus. Cullen G. 80.

389. *Hydrops ſcroti.* Tumor tunicae ſcroti celluloſae aquoſus. Cullen G. 80.

390. *Steatites.* Abdominis intumeſcentia pinguedinoſa, grauiditatem mentiens. Cullen G. 70.

391. *Pneumatoſis.* Totius corporis intumemeſcentia a flatu. Cullen G. 71.

392. *Emphyſema.* Tumor mollis, frigidus, in ſingulari parte ab aëre celluloſum cutis habitum ingreſſo formatus. Cullen G. 71.

393. *Hyſteroptoſis.* Vteri vel vaginae procidenden-

dentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens. Cullen G. 141.

394. *Cystoptosis.* Membranae vesicae vrinariae interioris protuberantia extra vrethram. Cullen G. 141.

395. *Archoptoma.* Intestini recti procidentia. Cullen G. 141.

396. *Bubonocele.* Tumor in inguine ex annulo musculi obliqui ab ingresso intestino omentoue, vel vtroque coniunctim. Cullen G. 140.

377. *Oscheocele.* Idem in scroto tumor. Cullen G. 140.

398. *Omphalocele.* Idem ex vmbilico. Cullen G. 140.

399. *Merocele.* Tumor ab intestino infra ligamentum Poupartii elapso. Cullen G. 140.

400. *Enterocele Oualaris.* Hernia intestinalis foraminis oualis in superiori et interna femoris parte prope perinaeum. Cullen G. 140.

401. *Ischiatocele.* Tumor ab intestino per hiatum intra ligamenta sacro-ischiatica elapso. Cullen G. 140.

402. *Elytrocele.* Hernia in vagina vteri eminens. Cullen G. 140.

403. *Hypogastrocele.* Hernia intestini ventralis. Cullen G. 140.

404. *Cystocele.* Prominentia vesicae per mus-

culi obliqui annulum, sub qua vrina nonnisi presso exterius tumore redditur. Cullen S. 140.

405. *Cyrtoma.* Tumor particularis abdominis a flatibus.

406. *Hydrenterocele.* Tumor ex hermiosa et hydropico compositus. Cullen S. 140.

407. *Varix.* Tumor venae mollis, liuidus, aut niger. Cullen S. 127.

408. *Aneurisma.* Tumor arteriae mollis et pulsans. Cullen S. 126.

409. *Cirsocele.* Tumor arteriarum venarumque spermaticarum inaequalis, renitens.

410. *Gastrocele.* Hernia ventriculi; tumor inter cartilaginem xiphoiden et vmbilicum inque ipso illo, post pastum auctus, dolore stomachi, vomitionibusque stipatus. Cullen S. 140.

411. *Hepatocele.* Hernia ab hepate facta ventralis, vel vmbilicalis congenita. Cullen S. 140.

412. *Splenocele.* Hernia a liene, ventralis aut inguinalis. Cullen S. 140.

413. *Hysterocele.* Hernia vteri ventralis aut inguinalis. Cullen S. 140.

414. *Hygrocirsocele.* Aquosus et varicosus tumor vasorum testis.

415. *Sar-*

412. *Sarcocele.* Teſtis ſarcoma aut ſcirrhus.

419. *Phyſocele.* Tumor a flatu herniam mentiens.

417. *Exoſtoſis.* Tumor in oſſe circumſcriptus. Cullen S. 139.

418. *Hyperoſtoſis.* Tumor totius oſſis. Cullen S. 139.

419. *Paedarthrocace.* Tumor oſſis, dolore grauis, in exulcerationem tendens. Cullen S. 7.

420. *Encyſtis.* Tumor frigidus, indolens, membrana incluſus, et materiam ſpiſſam complexus. *Atheroma*, *Steatoma*, *Teſtudo*, *Talpa*, *Meliceris* eius ſpecies. Cullen S. 135.

421. *Staphyloma.* Protuberantia corneae obſcuratae.

422. *Staphyloſis.* Procidentia vueae ex cornea diſrupta. Cullen S. 141.

423. *Fungus.* Tumor ad articulum mollis, oedematodes. Cullen S. 11.

424. *Tofus.* Tuberculum, tofaceam materiam complexum, in morbo articulari.

425. *Flemen.* Tumor pedis circa talos.

O. 3. Extuberantiae*).

426. *Verruca.* Tuberculum ſupra cutim durum, aſperum, ſeſſile vel penſile. Vnde ſpecies *Acrochordon*, *Acrothymium*, *Myrmecium*. Cullen G. 133.

427. *Porrus.* Verruca in obſcoenis mollis, madida, tactu dolens. Cullen G. 132.

428. *Clauus.* Tuberculum album, rotundum, calloſum in digitis plantisque pedum. Cullen G. 134.

429. *Callus* ſ. *Tylloma.* 1. Obducta ſumma cutis ex labore in palmis aut pedum plantis. 2. Tunica pallida, dura, quae ſine ſenſu eſt, in vlcere. Cullen G. 134.

430. *Encanthis.* Intumeſcentia carunculae lacrymalis.

431. *Pladarotis.* Tuberculum fungoſum, molle in interiore palpebra.

432. *Pinnula.* Excreſcentia corneae tunicae inhaereſcens.

433. *Pterygium.* Excreſcentia, membranulae forma, rubra ſupra album oculi.

434. *Hordeolum*, *Crithe.* Tuberculum calidum in abſceſſum fere deſinens, quod e palpebrae margine atque e cilio prorumpit. Cullen G. 7.

436. *Va-*

*) *Extuberantiae* ſupra cutem eminent: *tumores* intra aut ſubter eam exiſtunt.

435. *Grando.* Tuberculum durum, palpebrae fere ſuperiori innaſcens.

436. *Varus, Ionthos.* Tuberculum in facie durum, exiguum, rubrum, fere calloſum, diſperſum, multiplex. Cullen S. 7.

437. *Gutta roſacea.* Varus quaſi confluens, cum rubedine aſpera maculoſa. Cullen S. 7.

438. *Ephelis.* Aſperitas quaedam et durities mali coloris in facie.

439. *Eſoche.* Tuberculum intus in ano latens.

440. *Exoche.* Idem foris eminens.

O. 4. Puſtulae et Papulae.

441. *Epinyctis.* Puſtula ardens alba, ſubrubra aut ſubliuida, ſanie ſubcruenta repleta, ciceris aut fabae magnitudine, circa quam vehemens inflammatio et dolor.

442. *Phlyctaena.* Puſtula ſubflauo humore diſtenta, lucida, illi ſimilis, quae ab ambuſtione erumpit, non manifeſto dolens. In capite *Pſydracium* vocatur. Cullen S. 137.

443. *Herpes. Serpigo.* Papula ardens, cutem ſerpentibus minimis puſtulis erodens. *Purpura Scorbutica,* quam vocant, veriſſima ſerpigo eſt. Cullen S. 145.

444. *Scabies.* Durities cutis rubicundior, ex qua pustulae oriuntur, quaedam humidiores, quaedam ficciores, saniem rodentem, exulcerantem, crustas formantem, et contagiosam complexae. Cullen G. 147.

445. *Aquula.* Pustula palpebrarum, vel pinguis quaedam materia, cuti earundem substrata.

446. *Hydroa. Boa. Sudamina.* Pustulae milii magnitudine, aquosae sine rubore et sine vllo dolore, ex sudoribus repente sparsim toto corpore emergentes.

447. *Variola.* Pustula purulenta ex macula rubra in synocho emergens, contagiosa. Cullen G. 27.

448. *Varicella.* Pustula similis acuta, ex macula rubra in ephemera erumpens, non contagiosa. Cullen G. 28.

449, *Purpura.* Pustula pruriens, seminis milii magnitudine, rubra vel alba, lucida, acuta. Cullen G. 30.

450. *Encauma, Phlyzacion.* Pustula ab vstione contracta.

O. 5. Maculae.

451. *Ecchymoma.* Macula a sanguine per cutem quasi effuso liuida vel nigra. Illa *Pelioma*, haec *Malasma* speciatim dicitur. Cullen G. 128.

452. *Pe-*

452. *Petechiae.* Maculae pulicum morſui ſimiles, magnitudine et colore, interdum tamen etiam liuidae in febre acuta. Cullen nach G. 34.

453. *Morbilli.* Maculae acutae, rubellae, lateſcentes, et plerumque confluentes, inque ſquamas defluentes, in febre acuta. Cullen G. 29.

454. *Scarlatae.* Maculae latiores ac rubicundiores quam morbilli, ſubflauis nodulis ornatae, in febre acuta. Cullen G. 31?

455. *Lentigo.* Maculae lentis magnitudine, fuſca, mnltiplex, in facie potiſſimum et in manibus emergens.

456. *Vrticaria.* Maculae ſubtumidae, rubentes, fugaces. Cullen G. 32.

457. *Stigma.* Macula coloris coccinei.

458. *Vibex.* Linea coccinea, qualis relinquitur e flagellis.

459. *Vitiligo.* Macula foeda, fere ſubaſpera, diſperſa, ſerpens, alba (*Alphos*) aut nigra (*Melas*).

460 *Leuce.* Alphos in qua albi et lanugini ſimiles pili.

461. *Cyaſma.* Macula fuſca in fronte, labiis, aut manibus grauidarum. Cullen G. 3.

462. *Lichen. Impetigo.* Macula ſubrubra aſpera,

pera, dura, ſicca, cum ingenti prurigine.

463. *Seline.* Macula alba in ungue.

464. *Nebula.* Macula alba in cornea.

O. 6. Diſſolutiones. Cullen Cl. IV. O. 8.

1) Apoſpaſmata.

465. *Vulnus.* Solutio partis ſolidae, mollis a cauſa mechanica, cum effluxu ſanguinis. Cullen G. 143.

466. *Ruptura.* Solutio partis ſolidae, mollis, internae, ab interna cauſa, cum haemorrhagia.

467. *Rhagas.* Solutio cutis linearis arida. Cullen G. 143?

468. *Fractura.* Diſſolutio oſſis tranſuerſa aut obliqua, Cullen G. 148.

469. *Fiſſura.* Eadem recta, et vt ligni in longitudinem. Cullen G. 148?

470. *Plicatio.* Oſſium longorum contuſio et contorſio citra fracturam. Cullen G. 13.

471. *Thlaſis.* Caluaria depreſſa citra fracturam.

472. *Luxatio.* Dimotio oſſis ex articulo ſuo perfecta. Cullen G. 142.

373. *Subluxatio.* Cum os ab oſſe paulum recedit, eaque inter ſe dehiſcunt. Cullen G. 142?

474. *Dia-*

474. *Diachalasis*. Suturae dimotio. Cullen G. 142?

475. *Attritio*, *Ecthlimma*. Dissolutio cuticulae et cutis a compressione. Cullen G. 142?

476. *Porrigo*, *Pityriasis*. Resolutio cutis in tenues squamulas, deciduas.

477. *Aposyrma*. Cutis abrasio, dilaceratio. Cullen G. 142?

478. *Anapleusis*. Ossis corrupti squamula.

479. *Spasma*. Species solutionis continui tendinum, ligamentorum, citra ruptarum, membri mobilitatem dolorificam inducens.

480. *Contusio*. Cutis musculorumque conquassatio dolorifica, plerumque cum ecchymomate, at citra vulnus aut substantiae manifestam deperditionem.

481. *Diabrosis*. Erosio cutis a re acri et mordaci interna vel externa.

482. *Agomphiasis*. Dentium vacillatio.

483. *Eschara*. Cutis pars dehiscens a viua carne, et in crustam emortuam mutata.

484. *Piptonychia*. Vnguis destructio et casus.

485. *Ca-*

O. 2. Exulcerationes.

485. *Cacoethes.* Vlcus fere magnum oris tumentibus atque callosis. Cullen G. 144.

486. *Therioma.* Vlcus in quo caro computrescit, atque mollis et cadauerosa reddita tetrum odorem exhalat. Cullen G. 144.

487. *Carcinoma.* Cancri conuersio in vlcus, quod nigrum est, putridum, deterrimi odoris, et vehementer dolet. Cullen G. 144.

488. *Phagedaena.* Vlcus serpens, sed solam cutem rodens ac depascens. Cullen G. 144.

489. *Noma.* Vlcus quod non affectam tantum partem, sed et vicinas exedit et absumit. Cullen G. 144.

490. *Sycosis.* Vlcus, in quo multa caro excrescit. Cullen G. 144.

491. *Fistula.* Vlcus altum, angustum, callosum. Cullen G. 144.

492. *Sinus.* Vlcus altum, quod ab angusto ore orsum intus curuatum ampliatur, sine callo. Cullen G. 144.

493. *Caries.* Vlcus in osse cum substantiae et periostei corruptione, qua os spongiosum et friabile redditur. Cullen G. 149.

494. *Achores.* Vlcuscula capitis manantia, plurimis ac minimis foraminulis, vnde tenuis et glutinosa sanies exit, cutem perforantia. Cullen G. 144.

495. *Crusta*

495. *Crusta lactea.* Achores in facie. Cullen G. 144.

496. *Fauus*, *Cerion.* Vlcus multis foraminibus, sed maioribus ac in achore, peruium, ex quibus melli similis hnmor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus musculosis, articulis, et plantis pedum, oritur.

497. *Tinea.* Vlcus capitis, quod densissimam, durissimam aridissimamque crustam facit, serpens, pilis abbreuiatis. Cullen G. 146.

398. *Argemon.* Exulceratio in cornea.

399. *Aegilops.* Anchilops in vlcus conuersum.

500. *Ozaena.* Vlcus narium putridum, e quo graueolens mucus exstillat. Cullen G. 144.

501. *Aphthae.* Vlcera oris aut pudendorum, superficaria, mucosa. Cullen G. 34.

502. *Intertrigo.* Excoriatio cutis madens ac rodens, a sudoris vel vrinae acrimonia. Cullen G. 7.

503. *Rhacosis.* Excoriatio scroti laxati.

O. 7. Concretiones.

504. *Ancyloblepharon.* Palpebrarum inter se conglutinatio.

505. *Synizesis.* Pupillae concretio. Cullen G. 91.

506. *Dacryoma.* Punctorum lacrymalium coalitus.

507. *Ancyloglossum.* Linguae concretio cum partibus subiectis, loquelam, suctum, deglutitionemque impediens.

508. *Ancylosis.* Articulorum rigor, quo flexus eorundem aut extensio prohibitur.

509. *Cicatrix.* Callus a conglutinato vulnere vlcereue relictus. *Leucoma* in cornea dicitur.

510. *Dactylion.* Digitorum concretio.

Cl. XI. Deformitates.

511. *Phoxos.* Cui caput acuminatum et fastigiatum.

512. *Gibber.* Protuberantia spinae dorsalis, omoplatae, ossiumue thoracis. Eius species *Cyphosis*, *Lordosis*, *Scoliosis*, et *Seisis*.

513. *Caput obstipum.* Incuruatio colli.

514. *Strabismus.* Oculorum distortio et inaequalis motus. Cullen G. 113.

515. *Myopiasis.* Qua propinqua cernimus, remota vero parum vel nihil omnino. Cullen G. 93.

516. *Lagophthalmus.* Vitium superioris palpebrae

pebrae, ſi illa parum deſcendit oculumque non claudit.

517. *Trichiaſis.* Obuerſio ciliorum ad oculum.

518. *Ectropium.* Vitium palpebrae inferioris, quo parum ſurſum attollitur, ſed hiat, aut extrorſum euerſa eſt.

519. *Entropium.* Palpebrae inferioris inuerſio introrſum.

520. *Rhoeas.* Defectus carunculae lacrymalis, epiphoram faciens.

521. *Rhyſſemata.* Rugae et ſordes, quae in ſenili facie cernuntur.

522. *Lagocheilos*, *Labium leporinum.* Diuiſum ſemel vel bis labium.

523. *Malacoſteon.* Oſſium mollities.

524. *Hirſuties.* Praeternaturalis pilorum in parte generatio.

525, *Canities.* Capillorum color albus ante legitimam aetatem.

526. *Diſtrix.* Exilitas pilorum, modum excedens.

727. *Xiraſia.* Lanuginoſa pilorum ſuperficies quaſi puluere ſint conſperſi.

528. *Phalacrotis.* Pilorum caſus, qui tabeſcentibus et ex morbo grauiore conualeſcentibus euenit.

529. *Alopecia*. Pilorum defluuium, aream relinquens. *Ophiasis* eius species, item *Caluities* et *Pelada*.

530. *Madarosis*. Ciliorum defluuium.

531. *Ptilosis*. Eadem cum duritie callosa palpebrarum.

532. *Rodatio*. Ciliorum decurtatio.

533. *Phalangosis*. Ciliorum duplex vel triplex acies.

534. *Coloboma*. Defectus particulae in parte aliqua corporis.

535. *Cercosis*. Clitoris praelonga.

536. *Cholosis*. Claudicatio, quando crus vel longius vel breuius fit.

537. *Gryposis*. Vnguium aduncatio.

538. *Naeuus*. Tuberculum, maculaue congenita.

539. *Monstrositas*. Deformitas multiplex congenita.

540. *Polysarcia*. Corpulentia excedens. Cullen S. 70.

541. *Ischnotis*. Excessiua corporis gracilitas.

542. *Rhicnosis*. Cutis corrugatio cum extenuatione corporis.

543. *Varus.* Cui crura introrſum verſa.

544. *Valgus.* Cui crura extrorſum diſtorta.

545. *Leiopodes, Plancus, Plautus.* Cui pedum medium ab inferiori parte non eſt cauum, ſed planum.

546. *Apella.* Cui praeputium citra inflammationem contractum eſt, vt glandem non tegat.

547. *Hypoſpadiaeos.* Cui glans non antice, ſed inferne ſub frenulo perforata.

548. *Vrorhoeas.* Cui vrina ex vrethra in perinaeo exeſa effluit.

549. *Atreta.* Cuius anus aut naturalia occluſa.

550. *Saniodes.* Cui thorax tabulae ritu eſt anguſtus.

551. *Cripſorchis.* Cuius vnus teſtis aut ambo abſconditi.

552. *Hermaphroditus.* Cui vitioſa naturalium conformatio, ita vt vtriusque ſexus adeſſe videantur.

553. *Dionyſiſcus.* Cui prope tempora duae eminentiae oſſeae, quaſi cornua naſcuntur.

554. *Artetiſcus.* Qui membri alicuius defectum patitur.

555. *Nefrendis.* Qui dentibus caret.

556. *Spanopogon.* Qui raram habet barbam, et cui e mento pili excidunt.

557. *Hyperartetiſcus.* Cui membrum aliquod ſuperfluum.

558. *Galiancon.* Cui brachium altero breuius.

559. *Galbulus.* Cui flauedo corporis congenita.

560. *Mola.* Maſſa carnea, fibroſa, vaſculoſa, ex vtero excreta. Ouum deforme.

Nec ſilentio prorſus transeunda ſunt vitia quaedam occulta, quae non niſi in cadauerum ſectione ſe offerunt; Velut *Hydrops pericardii: concretiones viſcerum: oſſeſcentiae cartilaginum, membranarum, muſculorumque: varices venarum maiorum: hydatides: polypi cordis* et *vaſorum: poſitura viſcerum peruerſa: bullae aëreae in venis* et *pulmonum ſuperficie: aneuriſmata aortae: anguſtiae praeternaturales vaſorum et ductuum, ipſorumque concretiones.*

Vierte Abtheilung.

J. B. Mich. von Sagar Krankheitssystem oder systematische Eintheilung der Krankheiten.

(Aus dessen Systema morborum symptomaticum, nach der zweyten verbesserten Ausgabe, Wien, 1783.)

SYSTEMA MORBORVM SYMPTOMATICVM.

CLAVIS CLASSIVM.

I. *Vitia*: symptomata externa, euidensia, palpabilia, absque notabili cachexia, pyrexia.

II. *Plagae*: continui solutiones, morbi proprie chirurgici, persaepe sat graues.

III. *Cachexiae*: coloris, figurae, molis, in corporis habitu sine notabili febre, deprauatio.

IV. *Dolores*: sensationes molestae ad febres non referendae.

V. *Fluxus*: exitus insolitus cuiusuis solidi, vel fluidi e corpore, est character huius classis.

VI. *Suppressiones*: meatuum impeditio, hinc excretionum in sanitate consuetarum retentio.

VII. *Spasmi*: contractio inuita constans, vel interpolata musculorum motum localem efficientium.

VIII. *Anhelationes:* motus spasmodici iterati, defatigantes pectoris, cum respiratione sonora, molesta, absque pyrexia notabili.

IX. *Debilitates*: impotentia sentiendi, appetendi, imaginandi, organa artusque mouendi more ad sanitatem necessario.

X. *Exanthemata*: febris cum efflorescentia cutis varia maculosa, pustulosa, papulosa, phlyctaenoidea et asthenia.

XI. *Phlegmasiae*: febris cum pulso duro, dolore topico, inflammatione partis externae, vel internae, sanguine misso crusta inflammatoria tecto, vrina plus tincta.

XII. *Febres*: frigus, calor, pulsus frequens, respiratio aucta viribus artuum imminutis, deprauatis; vel viribus vitalibus pulsu et respiratione vix mutatis, virium artuum summa prostratio.

XIII. *Vesaniae*: error mentis in imaginatione, appetitu, iudicio, aut memoria.

Classis

Classis I. Vitia. Cullen Cl. IV.

Character Classis. Syndromes symptomatum cutaneorum in solidis leuidensium, palpabilium, sine febre, cachexia, manifestis.

Ordo I. Maculae: mutationes coloris natiui.

1. (1) *Leucoma*: macula opacans corneam *).

2. (2) *Vitiligo*: macula cutim deprimens, corymbosa locum, fixum non seruans in quo nascatur.

3. (3) *Ephelis*: macula cutis corymbosa, fusca glabra, raro partes tectas afficiens.

4. (4) *Naeuus*: macula congenita protuberans, vel non.

5. (5) *Ecchymoma*: macula a sanguine sub cute effuso nigricans, vel atrorubra, coerulea, liuescens, in gilbum successiue desinens. Cullen S. 128.

Ordo II. Efflorescentiae: tumores humorales exigui, gregales absque pyrexia, et notabili cachexia.

*) Die eingeschlossenen Zahlen sind die fortlaufenden Zahlen der Gattungen in der ersten Ausgabe, die bey Cullen (siehe unsern ersten Theil) überall angeführet werden.

6. (6) *Pustula*: phyma paruulum, linearis diametri apice suppurans rumpendum, subinde in crustam abiens. Cullen S. 7.

7. (7). *Papula*: phyma seu efflorescentia paruula linearis diametri desquamanda, nec suppurans, vt in morbillis. Cullen S. 7.

8. (8) *Phlyctaena*: vesicula linearis plerumque fluido seroso plena, fastigiata: plerumque sponte rumpitur. Cullen S. 137.

9. (9) *Bacchia*: maculae faciei guttatae plus, vel minus prominentes, aut asperae, squamulas, vel furfures saepius dimittentes, diuturnae. (in naso et partibus adiacentibus). Cullen S. 7.

10. (10) *Varus*: tuberculum durum, constans, pisi plerumque magnitudine in glandulis sebaceis. Graecis *Terminthus*. Cullen S. 7.

11. (11) *Herpes*: papularum prurientium corymbus in squamas furfuraceas fatiscentium. Cullen S. 145. *)

12. (14)

*) Weggelassen sind in der zweyten Ausgabe: *Epinyctis* der ersten Ausgabe (12): Phlyctaenarum atro-rubranum congeries, maxime in tibiis, noctu potissimum acriter prurientium.

Hemeropathos (13): Papulae rutilae crura obsidentes, extra lectum illico apparentes, importune prurientes, n lecto euanescentes, diuturnae.

12. (14) *Psydracia*: efflorescentia rosacea, rubra, erysipelatosa absque febre notabili.

13. (15) *Hydroa*: exanthemata miliaria (subito exorta) phlyctaenoidea, sine febre et asthenia.

Ordo. III. Phymata: tumores humorales solitarii.

14. (16) *Erythema*: phyma rubrum, calens, diffusum sine febre. Cullen G. 7.

15. (17) *Oedema*: phyma album, indolens, molle, frigidum, laxum, foueam digiti impressi aliquo tempore retinens.

16. (18) *Emphysema*: phyma pallidum, frigidum, elasticum, concussum crepitans, resonans. Cullen G. 71.

17. (20) *Inflammatio*: est tumor sphaeroideus rubore, calore, tensione et dolore pulsatili insignis, solitarius, sat extensus, in suppurationem vergens; *erysipelas* contra non suppuratur, et *phlegmone* habet magnam febrim coniunctam; saepius nihilominus inflammatio in phlegmonem transit. Cullen G. 7.

18. (23) *Furunculus*: phyma subdurum inflammatorium, prominens, profunde rubrum sphaeroideum, ordinario iuglandis magnitudine

dine, vorticem habens in fundo digeri nescium, (fibrosum). Cullen G. 7.

19. (21) *Bubo:* phyma scirrhoso-inflammatorium in glandulis inguinalibus. Cull. G. 131.

20. (22) *Parotis*: bubo iuxta aurem, parotidis glandulae, in suppurationem vergens. Cullen G. 131.

21. (24) *Anthrax*: phyma apice gangraenosum, in radio inflammatum, vrens. Cullen G. 7.

22. (26) *Paronychia*: inflammatio extremi digiti cum calore saepius perterebrante. Cullen G. 7.

23. (27) *Phimosis*: inflammatio praeputii glandem denudatam stringens et excludens, vel inclusam incarcerans. Cullen G. 7.

24. (19) *Scirrhus:* phyma durum, indolens, frigidum, cuti concolor, in locis glandulosis. Cullen G. 129.

25. (25) *Cancer*: phyma scirrhosum lancinans: (vel phyma lancinans, venis varicosis profunde rubris, nigris, liuidis obsitum, cinctum facile sanguinantibus, repraesentantibus pedes cancri). Cullen G. 130.

Ordo IV. Excrescentiae: tumores a solidis adauctis per nutritionem auctam morbosam.

26. (28) *Sarcoma*: excrescentia carnosa plerumque rubra mollis. Cullen G. 132.

27. (29)

27. (29) *Condyloma*: excreſcentia cutanea tendinea firmior carnibus et cute, oſſibus mollior, non elaſtica).

28. (30) *Verruca*: excreſcentia cutanea globoſa, vix ſenſibilis indolens, praerupta ſeu aſpera ſuperficie). Cullen G. 133.

29. (31) *Pterygium*: excreſcentia plana (carnea vel membranacea in oculi cantho, alam expanſam vtcunque referens, verſus corneam ſe extendens, creſcens.

30. (32) *Hordeolum*: excreſcentia dura, vel hydatidoſa in palpebrarum marginibus, ſaepius granum hordei aequans, ſolitaria, ſenſu plerumque carens. Cullen G. 7.

31. (33) *Trachelophyma*: excreſcentia varia gutturis, non purulenta neue inflammatoria).

32. (34) *Exoſtoſis*: excreſcentia oſſis morboſa, ad duritiem eiusdem proxime accedens, plerumque partialis. Cullen G. 139.

Ordo V. Cyſtides: tumores capſulati vario humore aut materia referti.

33. (35) *Aneuryſma*: cyſtis arterioſa ex ſitu et pulſatione ſynchrona cum arteriis noſcenda. Cullen G. 126.

34. (36) *Varix*: cyſtis venoſa; ſitus, rubedo et pruritus, varicem definit: (ſeu Dilatatio venae rubrae, nigreſcens ad preſſionem recedens,

dens, subito rediens pressione cessante, plerumque pruriens, mordicans). Cull. S. 127.

35. (37) *Marisca*: tumor sanguine turgens in margine podicis seu orificii ani, isque pertinax: proxime ad sarcoma accedit. (ex sanguine in textum vasorum minimorum effuso ruber, dolens, variae formae et magnitudinis. (vide *Haemorrhoidem*.) Cullen S. 37.

36. (38) *Hydatis*: cystis lymphaticorum vasorum dilatatorum lympham continens. Cullen S. 137.

37. (39) *Staphyloma*: opacitas et extraordinaria seu praeternaturalis crassities corneae, ob humorem inter eius membranas effusum.

38. (40) *Lupia*: est cystis materiam pultaceam, vel mellis consistentiam referentem, haud purulentam continens, frigida, mobilis et plerumque indolens. Cullen S. 135.

39. (41) *Hydarthrus*: hydrops articuli in capsa eiusdem, vel cellulis vicinis extra capsam positis. (Tumor fluctuans sine coloris mutatione, pulsatione). Cullen S. 138.

40. (42) *Apostema*: cystis purulenta (vel ichoroso-purulenta. Noscitur ex fluctuatione praegressa inflammatione, albedine, remissione doloris et pulsationis). Cull nach S. 7.

42. (43) *Exomphalus*: cystis vmbilicalis saepius

us aquosa, ad situm mutatum non recedens, nec reponibilis.

42. (44) *Oscheophyma*: cystis in scroto non reponibilis (variis fluidis turgens). Cull. G. 80.

Ordo VI. Ectopiae: partium contentarum in variis cauitatibus a sua solida sede dimotio sensibus patula, ob relaxationem continentium. Cullen Class. 4. Ord. 7.

43. (45) *Exophthalmia*: ectopia oculi. Cullen unter G. 141.

44. (46) *Blepharoptosis*: ectopia palpebrae (s. palpebrae vtriusque vel alterutrius morbosa elongatio, retractio, intra vel extrauersio cum symptomatis cuique ectopiae propriis.) Cullen G. 141.

45. *Exiris*: est ectopia iridis (et varia deformitas). Cullen G. 141.

46. (47) *Hypostaphyle*: ectopia vuulae (s. procidentia vel elongatio vuulae relaxatae, inflammatae, muco plenae, vlceratae, incrassatae, attenuatae vel bicornis). Cullen G. 141.

47. (48) *Paraglossa*: ectopia linguae (s. linguae magnitudo minuta vel aucta; vel plane soluto, aut elongato frenulo, in fauces eiusdem reuolutio). Cullen G. 141.

48. (49) *Proptoma*: ectopia appendicum externarum corporis morbosa (diuersa a dictis generibus.) Cullen G. 141.

49. (50)

49. (50) *Exania*: ectopia seu prolapsus ani (s. sphincteris ani vel et intestini recti inuersi procidentia extuberans, rubra, reducibilis, semper extra strangulationem). Cullen G. 141.

50. (51) *Exocystis*: ectopia seu prolapsus aut inuersio tunicae internae vesicae vrinariae (quae soluta peu vrethram foras pendet). Cullen G. 141.

51. (52) *Hysteroptosis*: ectopia vteri (seu procidentia tumorem sistens in vagina vel quandoque extra genitalia pendentem, vndique liberum, menses stillantem, saltem initio reponibilem, cum doloribus hypogastrii, inguinum, vrinae difficultate, animi deliquiis; haec omnia tactus obstetricius definit.) Cullen G. 141.

52. (53) *Colpoptosis*: prolapsus vaginae (s. tumor in sinu muliebri, vel extra pendens, annularis, mollis, perforatus (prolabitur subinde tantum vna ruga vaginae,) per quod foramen digitus immissus altius orificium vteri vterumque in suo quasi sede, absque *colpocele* deprehendit. Hic prolapsus est reponibilis. Torquet insuper aegram dysuria, tenesmus cet). Cullen G. 141.

53. (54) *Gastrocele*: hernia epigastrii seu scrobiculi cordis (vel ad minus tumor supraumbili-

bilicum insolitus, herniosus, ventriculum aut alia intestina illapsa continens, cuti concolor, reponibilis, in decubitu dorsali sponte recedens, indolens, ex relaxatione integumentorum et peritonaei vndecunque orta natus, vomitum causans). Cullen S. 140.

54. (55) *Omphalocele*: hernia vmbilicalis (s. tumor herniosus ad vmbilicum, reponibilis, cuti concolor, indolens plerumque, ex relaxatione integumentorum et peritonaei natus, varia viscera continens). Cullen S. 140.

55. (56) *Laparocele*: hernia ventralis seu abdominalis (in quocunque loco abdominis aliis herniis non dicato natus). Cullen S. 140.

56. (57) *Merocele*: hernia cruralis (in suprema et anteriore parte femoris ad exitum vasorum cruralium: in foeminis praecipue). Cullen S. 140.

57. (58) *Bubonocele*: hernia inguinalis (per annulum vasorum spermaticorum). Cullen S. 140.

58. (59) *Opodeocele*: hernia foraminis oualis (s. tumor in summo femine ad latus genitalium egrediens, per sinuositatem ossis ischii superiorem vasis transmittendis dicatam. In foeminis prope labium vuluae visitur; reponibilis, cuti concolor, mollis; dum paruus est

tumor vix obſeruatur; ſubinde eſt elaſticus. Cullen G. 140.

59. (60) *Iſchiocele*: eſt hernia emergens per inciſuram oſſis ſacri, decubitu prono reponibilis. (Rarum et ſat adhuc obſcurum genus.) Cullen G. 140.

60. (61) *Colpocele*: hernia vaginalis (reponibilis, in decubitu ſupino natibus eleuatis ſponte recedens plerumque; indolens, absque ſignis aliorum tumorum, qui hic enaſci ſolent.) Cullen G. 140.

61. (62) *Perinaeocele*: hernia in perinaeo (ad vnam, vel alteram vel plane vtramque partem raphes, vt Auctor (*Sagar*) in puella paruula vidit. Mollis, reponibilis, cuti concolor; ſubin eſt effectus dyſtociae.) Cullen G. 140.

62. (63) *Peritonaeorixis*: eſt hernia quaecunque ex praedictis ob rupturam peritonaei emergens. — (*Rixis* peritonaei ſigna ſunt crepitus in violentia aliqua maiore peritonaeum lacerante, herniae ſubita et magna protuberantia, eruptio, dolor in regione rixis maior aut minor.) Cullen G. 140.

63. *Pleurocele*: eſt tumor inter coſtas prominens, emergens, plerumque reponibilis, in inſpiratione creſcens. Cullen G. 140.

64. (64) *Encephalocele*: hernia ſeu ectopia cerebri per fiſſuram, vel ſuturas dilatatas oſſium

ossium cranii emergens. (Ectopia herniosa cerebri aut cerebelli vel vtriusque simul per hiatum ossium cranii necdum sat cohaerentium, relaxata pariter lamina vtraque durae matris et piae externa tenuissima pellucida: symptomata subin non magna, subin contra grauissima causans.) Cullen S. 140.

65. (65) *Hysteroloxia*: vteri obliquitas (noscenda ex orificii vterini directione mutata, palpo externo abdominis, tum aliis symptomatis inconsuetis: vt ischuria, dysuria, enuresi, obstipatione etc.)

66. (66) *Parorchidium*: ectopia testiculi (seu potius eius a situ naturali aberratio.) Cullen S. 141.

67. (67) *Exarthrema*: ossium mobilium luxatio (noscenda ex impotentia ad motum consuetum, mutatione natiuae conformationis, dolore, protuberantia insolita, cauitate, musculorum tensione, conuersione artus, accurtatione membri vel praelongatione.) Cullen S. 142.

68. (69) *Diastasis*: ossium immobilium recessus. (Cognoscibilis cauitate insolita vno in loco, in altero vero tumore, mutatione

positurae et reliquis symptomatis oculo et tactui patentibus.) *).

Ordo VII. Deformitates: vitia potius formam quam sanitatem laedentia.

69. *Atretismus*: concretio meatuum in sanitate patulorum **).

70. (76) *Anchylomerisma*: partium alias distinctarum insolita concretio.

71. *Dialysis*: solutio partium, quae in sanitate perfecta integrae esse debent ***).

72. (74) *Polymerisma*: est excedens numerus partium: vt sex digiti.

73. *Defectus*, carentia partium corporis, quae alias adesse solent et debent †).

74. *Asymetria*, est carentia proportionis partium corporis alias solita ††).

75. (71) *Lordosis*, insolita curuatura ossium longi-

*) *Loxarthrus* (S. 69. ed. prior.) ossium articulatorum situs relatiuus in alienum constanter mutatus, seu obliquitas respectiua persistens citra exarthema et spasmum. vid. *Subluxatione* et *Distorsione*.

**) Neue Gattung.

***) Neue Gattung.

†) Neue Gattung.

††) Neue Gattung.

longiorum (vel potius: partium) corporis humani.

76. (70) *Gibbositas*: thoracis dilatatio prominens, huiusque cauum componentium ectopia (s. potius ossium pectus vel peluim componentium indecora prominentia a tumore, luxatione, diastasi, torsione, pressione aut alio principio nata.

77. *Errorloci*: haec deformitas obseruatur, dum quaedam partes insolita loca occupant. (Sic *Errores loci* ab autoribus obseruati sunt, dentales, oculares, vuluares, hepatici) *) **).

*) Neue Gattung.

**) *Lagostoma* (72 ed. prior.) Labium oris fissum.

Apella (73 ed. prior.) Praeputii vel alterius appendicis mollis, breuitas, paruitas.

Epidosis (75) Appendicum mollium incrementum, insuetum, sanum. Species sunt penes praelongi, auriculae pendentes, praeputia longissima, clitorismus, caro pubis foeminarum Africanarum, nasones, labia tumida oris. Zum Theil Cullen G. 141.

Hirsuties (77): Pili copiosiores, longiores, vel in locis, vbi non soleant crescere, obuii.

Classis II. Plagae. Cullen Cl. IV. und Cl. IV. O. 8.
Continui solutiones: morbi proprie chirurgici persaepe sat graues.

Ordo I. Solutiones: recentes, casuales, plerumque cruentae.

1. (78) *Vulnus*, continui solutio molli in parte potissimum, hians, labiata, cruenta, ab instrumento mechanico scindente facta. Corneae vulnus cruorem non fundit. Cullen G. 143.

2. (79) *Punctura*, continui solutio intus extensa tantum, eaque instrumento pungente facta. Cullen G. 143.

3. (80) *Sclopetoplaga*, est vulnus a glandibus e bombardis, aut sclopetis explosis illatum, vaginatum, decursum glandis exprimens, oblongum, lateribus contusis. Cullen G. 143.

4. (81) *Morsus*, est plaga recens, quam animalia dentibus impressis inferunt. Cullen G. 143.

5. (82) *Excoriatio*, est epidermidis, vel cutis ipsius a carnibus separatio, detractio. Cullen G. 143.

6. (83) *Contusio*, partis cuiuscunque in minimis

nimis fibris aut vasculis attritio, fractio, solutio, vexatio (cum ecchymomate).

7. (84) *Ruptura*, ligamentorum, tendinum, vel membranarum, vel musculorum solutio inaequalis per tensionem facta vires illorum excedentem.

Ordo II. Solutiones, artificiales, recentes, cruentae.

8. (85) *Operatio*, studiosa solutio continui ad aliquid eximendum, meatum parandum, dilatandum.

9. (86) *Amputatio*, vulnus detruncatione partis totalis factum. Cullen G. 143.

10. (87) *Sutura*, studiosis puncturis mediante acu factis, filisque traiectis, solutorum contractio, approximatio; (*sutura sicca* non spectat huc, quia non est plaga).

11. (88) *Paracentesis*, punctura artificialis in aliquod cauum corporis plerumque acu triquetra cannulata facta.

Ordo III. Solutiones, incruentae, materiam purulentam, ichorosam, serosam continentes, fundentes, antiquae, nec ad priores referendae.

12. (89) *Vlcus*, solutio continui mollis, anti-

qua, pus, ichorem, saniem etc. alens, fundens. Cullen S. 144.

13. (90) *Exulceratio*, excoriatio suppurans (seu vlcus superficiale). Cullen S. 144.

14. (91) *Fistula*, vlcus cortice calloso seu condylomatoso vaginatum, (oblongum) ore angustatum. Cullen S. 144.

15. (92) *Sinus*, est cauitas vlcerosa ampla, saepe multiplex, ore angusto vel nullo. Cullen S. 144.

16. (93) *Eschara*, crusta mortua sicca partis mollis saepius causticis facta.

17. (94) *Caries*, ossis erosio caua, aspera, periostio denudata, plerumque nigra vel flaua: vel est tantum ossis color flauus, vt in dentibus, vel fuscus et niger siue asperitate. Ossa cariosa sunt fragilia, friabilia, vel exfoliabilia). Cullen S. 149.

18. (95) *Arthrocace*, vulgo *Spina ventosa* est vlcus medullae cum ossis carie, exostosi: vel est tumor integumentorum et ossis natus a carie ossis, nata ex vlcere medullae. Causa huius plagae est acrimonia deposita in medullam ossis, hancque corrumpens. Cullen S. 7.

Ordo IV. Solutiones anomalae continui, nec ad priores referendae.

19 (96)

19. (96) *Rhagas*, fiſſura cutis, cuticulae, in labiis oris etc. arida.

20. (97) *Ambuſtio*, plaga igne facta (ſeu ignis flamma, corporibusque ex igne candentibus, liquidis feruentibus, aut radiis ſolis in focum coactis, corpori illata), ſuccedentibus inflammatione, phlyctaenis, aut eſchara.

21. (98) *Fractura*, diuiſio caſualis oſſium in fragmenta ſeparabilia. Cullen G. 148.

22. (99) *Fiſſura*, diuiſio caſualis oſſium, rimam referens, hancceue non penitus ſeparans.

Classis III. Cachexiae. Cullen Cl. III.

Vitiosus corporis habitus quoad volumen, aequalitatem, colorem.

Ordo I. Macies: diminutio voluminis corporis ex consumptione pinguedinis, vel defectu sanguinis. Cullen Cl. III. O. 1.

1. (100) *Tabes*, macies cum amphimerina lenta, sine tussi (purisue anacarthasi). Cullen G. 68.

2. (101) *Phthisis*, macies cum amphimerina lenta, tussi (dyspnoea) et (vt plurimum) anacatharsi purulenta. Cullen nach G. 36.

3. (102) *Atrophia*, macies sine febre (notabili) et sine tussi. *Marasmus* aliorum. Cullen G. 69.

4. (103) *Haemataporia*, macies ex inopia sanguinis. Virium debilitas: pertinax aurium sibilus, anorexia, facies lurida, epithelio tecta pallidissima, alui fluxus, diabetes, sudores profusi, lipothymiae, tibiae tumidae, subin hydrothorax his succedens, vigiliae, suspiria, animi abiectio, moeror, mortis timor, vrina pallida, venae abditae, pulsus vacuus, sanguinis profluuia praegressa. Aliquanto aër euolutus locum sanguinis in vasis occupat vel lympha.

5. (104) *Aridura*, macies et exſiccatio vnius tantum membri vel partis corporis (ſine febre).

Ordo II. Intumeſcentiae: deformitas ex volumine, mole partium auctis. Cullen Cl. III. O. 2.

6. (105) *Plethora*, intumeſcentia vniuerſalis ex abundantia nimia boni ſanguinis. Amyſtidis et ventris cultus, pulſus plenus aut ſuppreſſus, venarum amplitudo conſpicua; aeſtus et grauitas totius corporis, reſpirandi difficultas, laſſitudo ſpontanea, ſtupor artuum, ſomni turbati, partes epithelio tectae ruberrimae, temperamentum ſublaxum, ſanguineum).

7. (106) *Polyſarcia*, intumeſcentia vniuerſalis (mollis, pallidula) ab adipe nimium aucto. Cullen G. 70.

8. (107) *Pneumatoſis*, intumeſcentia vniuerſalis ab aëre ad attactum crepitans, reſonans, (elaſtica) leuis. Cullen G. 71.

9. (108) *Anaſarca*, intumeſcentia vniuerſalis oedematoſa (non elaſtica, veſtigium digiti impreſſi ſeruans, pallida, frigida, haud crepitans). Cullen G. 74.

10. *Phlegmatia*, intumeſcentia partium inferiorum oedematoſa, cuti concolor, indolens, foueam digiti impreſſi ſeruans notabili tempore, non elaſtica. Cullen G. 74.

11. (116)

11. (110) *Physconia*: intumescentia, abdominis praeternaturali a partibus solidis aut visceribus adauctis, absque grauiditate et fluctuatione et elasi, ad tactum dura resistens, parenchymatica. Cullen G. 8.

12. (111) *Grauiditas*, intumescentia abdominis ab hypogastrio incipiens, opus generationis subsequens et partu terminanda; adsunt simul varia pathemata grauidarum, menostasia, mutationes oris tincae, et demum motus infantis in vtero obseruatur.

Ordo III. Hydropes partiales, tumores a fluidis in cauitatibus congestis praeternaturaliter, vt in abdomine etc.

13. (112) *Hydrocephalus*, hydrops capitis a sero. Cullen G. 75.

14. (113) *Physocephalus*, hydrops seu tumor capitis emphysematosus (elasticus, sub digito premente crepitans).

15. (114) *Hydrorachitis*, tumor cysticus ex hiatu vertebrarum in recens natis protuberans, liquidum continens. Vulgo *Spina bifida*. — (Est verus hydrops theeae spinalis). Cullen G. 76.

16. (115) *Ascites*, hydrops totius abdominis a fluido non elastico, grauis et ad palpum fluitans

fluitans (cum polydipſia, vrina pauca lixiuiali, lateritia). Cullen G. 78.

17. (116) *Hydrometra*, tumor hypogaſtrii ſine grauiditate ab vtero fluidis diſtento, rotundus, grauis, fluctuans ad palpum ſeu manupercuſſionem, leges grauitatis ſequens. Dolor inguinum, ſpirandi difficultas, menoſtaſia, rigores, mammarum mollities, phlegmatia et tactus orificii vterini diagnoſin firmant. Cullen G. 79.

18. (117) *Phyſometra*, tumor hypogaſtrii a flatu vterum diſtendente, rotundus, elaſticus, leuis, bombos ad preſſionem abdominis per orificium vteri emittens. Cullen G. 73.

19. (118) *Tympanites*. Hydrops ſeu tumor totius abdominis a flatu in eodem contento, elaſticus, leuis, et ad percuſſionem crepitans, reſonans cum ructibus, borborygmis, conſtipatione et doloribus abdominis. Cullen G. 72.

20. (119) *Meteoriſmus*, eſt intumeſcentia flatulenta epigaſtrii, hypochondriorum, vel totius abdominis fugax et plerumque indolens.

Ordo IV. Tubera, tumores partium ſolidarium non hydropici, externi, cum cachexia.

21. (120) *Rachitis*, eſt deformitas ex articulorum tumore duro, carnium marcore, capitis

pitis mole (sterni protuberantia) patens; ingenium praecox in infantibus, ossium flexilitas (et carnis flacciditas.) Cullen G. 82.

22. (121) *Scrophula*, tumores subscirrhosi glandularum colli mesenteriiue cum labiis et naso crassioribus — Scrophula ordinario mollior est scirrho. Cullen G. 83.

23. (122) *Carcinoma*, vlcera cancrosa (sordida, labiis duis euersis, scirrhosis) doloribus lancinantibus, serpentia, ichorem acrem, rodentem pluentia; (Excrescentiae fungosae et) vasa vicina tumida, atrorubra sunt; color luridus corporis, lipothymiae saepe comites (et febris hectica). Cullen G. 144.

24. (123) *Leontiasis*, cognoscitur hic morbus ex papillis setaceis, vel corniculatis cutim exasperantibus; aspectus hominis ferinus.

25. (124) *Malis*, tumores saepius purulenti, vel vlcera cum insectis vermiformibus passim enata: (aut ab insectis vermiformibus vel horum laruis exitata, quae in iis nidulantur et ex apertis prodeunt).

26. (125) *Frambaesia*: excrescentiae fungosae mori fructus instar granulosae, haud raro cum vlceribus. (Morbus contagiosus aliquando et congenitus apud Americanos.

Vlcera

Vlcera dyſepulota ſunt, et exoſtoſes, caries, anchyloſes et macies comitantur. Cullen G. 88.

Ordo V. Impetigines: morbi plerumque contagioſi, chronici, cutis excreſcentias, tumores gregales, exulcerationes, cruſtas eſcharoticas producentes. Cullen Cl. III. O. 3.

27. (126) *Syphilis*: vlcuſcula, porri, bubones, ficus, nodi, tophi, poſt gonorrhoeam ſyphiliticam plerumque; dein puſtulae cruſtoſae, dolores nocturni oſteocopi, exoſtoſes, caries, macies et color luridus morbum adeſſe palam profitentur, Cullen G. 84.

28. (127) *Scorbutus*: ſtomacace, maculae liuidae, violaceae in tibiis, laſſitudo matutina, lurida facies, vrina pellicula tecta, eiusdem ſedimentum craſſum et arenuloſum ſunt indicia ſcorbuti. Cullen G. 85.

29. (128) *Elephantiaſis*: facies deformis, tubera calloſa, ozaena, raucedo vocis, cutis elephantina craſſa, vnctuoſa et in extremis artubus anaeſtheſia. Cullen G. 86.

30. (129) *Lepra*, cognoſcitur ex puſtulis verrucoſis duris, craſſis, vel ſquamis ſiccis eſcharoticis, imbricatis, in corymbos diſpoſitis, pruriginoſis: puſtulae ſunt ſubin herpetoſae humidae, (exulceratae) ſubin ſiccae;

vnde

vnde iam *ſicca*, iam *humida lepra*. Cullen G. 87.

31. (130) *Scabies:* papulae (ſeu puſtulae vel phlyctaenae lympham aut ſaniem continentes) pruriginoſae, lentis magnitudine, inter digitos et in poplite etc.: primum phlyctaenoideae, dein cruſta albicante ex pure vel muco quaſi nata tectae. (Contagioſus morbus et inoculabilis flexuras artuum maxime occupat, ſquamis caret). Cullen G. 148.

32. (131) *Tinea*: cognoſcitur ex cruſtis flauis, vel griſeis, vlceroſis, per caput diſperſis. — (Videtur eſſe ſcabies capitis et nihil aliud). Cullen G. 146.

Ordo VI. Icteritiae: cognoſcuntur hae ex totius cutis colore inſolito, pallido, flauo, nigro, lurido, rubro, ſine pyrexia notabili.

33. (132) *Aurigo*: flauedo cutis ad aureum vel aurantium tendens colorem, praeſertim vero ſcleroticae. Cullen G. 90.

34. (133) *Melaſicterus*: color cutis et ſcleroticae niger, atroliuidus, fuliginoſus (cum moeſtitia et perturbatione mentis).

35. (134) *Phoenigmus*: color ruber cutis, maculoſus diffuſus, abſque pyrexia.

36. (135) *Chloroſis*: eſt pallor, vel fuſcus color

color cutis, (faciei vel totius corporis) oculis haud flauis, (cum asthenia et dyspnoea) plerumque cum pica. Cullen G. 46.

Ordo VII. Cachexiae anomalae: patent ex signis classeos et affinitate cum prioribus ordinibus, quin iisdem intrudi possint.

37. (136) *Phthiriasis*: exortus pediculorum cum (porrigine), exulceratione (pruritu) et alopecia (et cachexia).

38. (137) *Trichoma*: cognoscitur ex capillis inuicem complicatis et agglutinatis inextricabiliter, subin cum phthiriasi. (Haereditarius et contagiosus morbus est, Hebraeorum in Sarmatia endemius, criticus, hac enim via miasma plicae exit). Cullen G. 89.

39. (138) *Alopecia*: est capillorum lapsus, cuticulae desquamatio.

40. (139) *Elcosis*: copiosa, ampla vlcera, chronica, foetida, cariosa cum febricula lenta (*amphimerina*) — *Purulentia* Cl. *Lieutaud*.

41. (140) *Gangraena*: mors celer partis mollis, dein resolutio, foetor, liuor laxa (s. anaesthesia, immobilitas, frigus, phlyctaenae lympham continentes, fundentes flauam; flacciditas, liuiditas et partis mors in cute et membrana cellulosa, vel in omnibus ad

ossa vsque; textus facilis laceratio et dissolutio putrida cum foetore cadaueroso. **Cullen bey S. 7.**

42. (141) *Necrosis:* partis mollis mors, sine praeuio tumore, (inflammatione, mollitie et dissolutione foetida,) lenta, ordinario cum dolore rodente, (et stupore demum) exsiccatio, induratio, nigredo partis.

Classis

Classis IV. Dolores.

Ingrata et molesta sensatio, aut imaginatio, qualis ex neruearum partium laceratione, rosione, vstione, pressione, tensione, distractione, oritur, reliqua symptomata superans, hanc classem definit.

Ordo I. Dolores vagi, saepius vniuersales, aut cutanei ad phlegmasias non referendi.

1. (142) *Arthritis*: articulorum dolor spontaneus, periodicus a synouia corrupta. Cullen G. 23.
2. (143) *Osteocopus*: ossium dolor non erraticus, nec periodicus, internus, in artubus ex periostio et medulla infectis (ex pressione non exacerbans.) Cullen G. 222.
3. (144) *Rheumatismns*: dolor diuturnus in parte carnosa (tendinosa) artuum, vel membranis musculos inuoluentibus sine phlegmasia, rheumate, catarrho, erysipelate, cum sanguine crusta gelatinosa tecto; (vrina saepe ad sulphureum colorem accedit.) Cull. G. 21.
4. (145) *Catarrhus*: colli colloue vicinarum partium dolor a frigore suscepto cum tussi, coryza, febricula vespertina amphimerina. Cullen G. 39.

5. (146) *Anxietas*, molestia ad loci mutationem continuam cogens, saepe cum suspiriis et pulsu in inspiratione intermittente.

6. (147) *Lassitudo*: molestia cum debilitate virium, quae ad quietem inuitat.

7. (148) *Stupor*: molestia sensum tactus obscurans (cum grauitate membri.)

8. (149) *Pruritus*: molestia ad scalpendum cogens.

9. (150) *Algor*: molestia qualis a summo aëris frigore excitatur, (iam cum phricasmo, rigore, vel conuulsione corporis, iam sine his symptomatibus.)

10. (151) *Ardor*: molestia qualis a summo aeris calore producitur.

Ordo II. Dolores capitis, faciei, vel capillitii.

11. (152) *Cephalalgia*: grauatiuus capitis dolor, nec diuturnus, (seu sensatio molesta, quae refert caput interius distensum, turgidum et quasi grauatum, malum haud chronicum.)

12. (153) *Cephalaea*: periodicus saepe, diuturnus et tensiuus capitis dolor: (videtur sola diuturnitate a cephalalgia differre.)

13. (154)

13. (154) *Hemicrania*: dolor alterutrius lateris frontis (ad tempora, frontem ac oculos, isque vehemens ſaepe et periodicus quandoque.)

14. (155) *Ophthalmia*: dolor oculi ſaepiſſime cum rubore, inflammatione, et lucis intolerantia (et lacrymatione vel ſiccitate.) **Cullen G. 8.**

15. (156) *Otalgia*: dolor aurium. **Cullen G. 7.**

16. (157) *Odontalgia*: dolor maxillarum dentiumque (cum vigiliis ſaepius et ptyaliſmo, maxillae, genarum aut gingiuarum tumore.) **Cullen G. 22.**

Ordo III. Dolores pectoris, interni, anhelationis expertes.

17. (158) *Pyroſis*: ardor oeſophagi ad ventriculum extenſus (ſine febre; vulgo *Soda* dicitur.) **Cullen G. 57.**

18. (159) *Cardiogmus*: dolor cordis cum eius pulſatione inſolita: (ſeu grauis pertinaxque moleſtia in praecordiis cum ſenſu ponderis auctaeue molis et pulſatione, quae ad minimum motum augetur.)

Ordo IV. Dolores abdominis interni.

19. (160) *Cardialgia*: moleſtia in regione ventriculi (et ad epigaſtrium) ſyncopen minitans. **Cullen G. 44.**

20. (161) *Gastrodynia*: dolor vehemens epigastrii stomachiue (sine syncope et pyrexia.) Cullen G. 44.

21. (162) *Colica:* dolor intestinorum (potissimum intestini crassi regiones occupans huiusque officia turbans) sine inflammatione (et febre notabili, cum pulsu plerumque suppresso, rariore et obstipatione.) Cullen G. 58.

22. (163) *Hepatalgia:* dolor hypochondrii dextri hepatisue (grauatiuus, tensiuus at sine pyrexia acuta.)

23. (164) *Splenalgia*: dolor seu molestia in regione lienis (pertinax, grauatiuus, tensivus, cum aliquali dyspnoea, pulsu in inspiratione intermittente, tumore et duritie sine pyrexia)

24. (165) *Nephralgia*: dolor lumbi alterutrius vreteris ductum sequens, cum nausea, vomitu, testiculi retractione, cruris stupore, sine febre notabili (sine pyrexia acuta.)

25. (166) *Hysteralgia*: dolor vteri sine nisu parturitionis et phlegmasia notabili.

Ordo V. Dolores externarum partium locales fixi.

26. (167)

26. (167) *Mastodynia:* dolor mammarum. Cullen G. 7.

27. (168) *Rachialgia*: dolor abdominis et spinae dorsi atrox, (pressione non crescens, cum vmbilici subin retractione, alui constipatione), in brachiorum paresin (manuum torpores aut conuulsiones vel contracturas artuum) desinens. Cullen G. 58.

28. (169) *Lumbago:* dolor lumborum erectionem corporis impediens (sine nausea, vreterum dolore, femoris stupore, vrinaeque vitiis. Dolor est in musculis spinae dorsi, aut ligamentis.) Cullen G. 21.

29. (170) *Ischias*: peluis et coxendicis totiusque femoris dolor, saepius claudicationem inducens et difficultatem gradiendi, standi; frigus partis et conatus ad deponendam aluum augent dolorem. Cullen G. 21.

30. (171) *Proctalgia*: dolor podicis, citra tenesmum. Cullen G. 7.

31. (172) *Pudendagra*: dolor genitalium absque ischuria aut dysuria.

32. (173) *Digitium*: dolor periodicus articuli cuiusdam digiti cum emaciatione, ossis friabilitate, sine omni phlegmasia. Cullen G. 114.

Classis V. Fluxus. Cullen Cl. IV. Ord. 4.

Exitus insolitus cuiusuis fluidi, vel solidi e corpore.

Ordo I. Sanguifluxus: sanguinis, vel saltem sanguinolentae materiae eiectio sine alui fluxu. Cullen Cl. I. Ord. 4.

1. (179) *Haemorrhagia*: est sanguinis fluxus e naribus. Cullen G. 135.

2. (175) *Haemoptysis*: sanguinis expectoratio cum tussi sine pyrexia notabili. Cullen G. 36.

3. (176) *Stomacace*: Sanguis dissolutus promanat e gingiuis laxis, sordidis et foetidis, sponte vel ad leuem harum attactum. Cullen G. 38.

4. (177) *Haematemesis*: sanguinis reiectio ex oesophago cum vomitorio conatu, (anxietate magna et animi deliquiis): obseruantur et faeces alui sanguine tinctae (nigricantes.) Cullen nach G. 38.

5. (178) *Haematuria*: sanguinis fluidiue rubri sanguinolenti per vias vrinarias emissio seu exitus. Vel: Effluxus seu mictio cruoris, vrinae cruentae ex vesica, vel seminis sangui-

ſanguinolenti ex vrethra vel penis corpore. Cullen nach G. 38.

6. (179) *Metrorrhagia*: ſanguinis ex vtero aut vaginae vaſis fluxus vitioſus, nimius. Cull. G 38.

7. (180) *Abortus*: foetus immaturi ſaepius cum metrorrhagia ex vtero excluſio. — (Symptomata ſunt laſſitudo, anorexia, frigus, mammarum flacciditas, lumbago, hyſteralgia, lipothymia cet.) Cullen G. 38.

Ordo II. Aluifluxus ſanguinolenti.

8. (181) *Hepatirrhoea*: eſt aluifluxus per inferiora ſanguinolentus, nec ater, nec torminoſus. Cullen G. 60.

9. 182) *Haemorrhois*: eſt fluxus cruentus ex podice, vel recto mariſcis ſaepe obſito (ſ. ſanguifluxus ex tuberculis, mariſcis, rubris duris, dolorificis finem recti obſidentibns vel in recto latentibus; ſentiunt poſteriora tubercula aegri in recto ſaepius obſtipati et digitus immiſſus inteſtino haec offendit; ſanguis in depoſitione alui praecedit, vel adminus comitatur excrementa.) Cull. G. 37.

10. (183) *Dyſenteria*: eſt frequens torminoſa, ſaepe teneſmoidea, mucoſo-ſanguinolentarum foecum per aluum decompoſitio. Cullen G. 40.

11. (184) *Melaena*: fluidi atri per ſuperiora, vel inferiora frequens reiectio.

Ordo III. Aluifluxus non ſanguinolenti.

12. *Nauſea*: eſt inanis vomendi conatus et flatuum, vel muci aut ſaliuae ex ore exiguae per os reiectio. (Adeſt anorexia, gaſtrodynia, motus oſſis hyoidis ad ſuperiora, ptyaliſmus, capitis ad anteriora inclinatio; tremor labii inferioris etc.) **Cullen** S. 44.

13. (186) *Vomitus:* eſt palpabilium materierum non cruentarum facta per os oeſophagumque, reiectio frequens ex ventriculo. — (Cauſa eſt antiperiſtaltica ventriculi contractio, concurrente diaphragmatis et muſculorum abdominalium preſſione cum ſimultanea exſpiratione; pulſus eſt contractus, rigidus et frequens. **Cullen** S. 44.

14. (187) *Ileus*: gaſtrodynia, obſtipatio, anxietas et vomitus demum faeculentae materiae determinant hunc morbum. (Symptomata principalia huius morbi ſunt, atrocia circa vmbilicum tormina, ructus, nauſea, ſingultus, inteſtinorum volutatio, virium proſtratio, pertinax alui obſtipatio et vomitus demum faeculentus.) **Cullen** S. 58.

15. (188) *Cholera*: eſt ſyndrome ex vomitu, diarrhoea, gaſtrodynia et ſubin ſurarum crampo. **Cullen** S. 59.

16. (189) *Diarrhoea*: eſt excrementiciorum humo-

humorum frequens, copiosior, fluidior, vel intempestiua deiectio per aluum. Cullen S. 60.

17. (190) *Coeliaca:* est albescentium, aut chylosarum materierum per aluum deiectio plerumque profusa cum torminibus et prostratione virium. Cullen S. 58.

18. (191) *Lienteria*: est vix mutatorum ingestorum celer deiectio. Cullen S. 60.

19. (192) *Tenesmus*: est muci pauca et frequens deiectio per anum, cum intensa deiiciendi cupiditate, et conatu, et plerumque proctalgia.

20. (193) *Proctorrhoea*: est exitus muci albi, flauescentis ex podice, vasis haemorrhoidalibus externis vel internis. (Vide *Lieutaud* Tom. I. p. 396. No. 4.) (Ordinarius humor spissior est, dum ex internis vasis stillat scybalaque procedit. — Pruritus in podice incommodans.)

Ordo IV. Serifluxus fluidi nec sanguinolenti, nec per aluum, effluxusque morbosus e corpore humano.

21. (194) *Ephidrosis*: est sudoris quantitate, qualitate, aut intempestiuitate peccantis excedentis effluxus. Cullen S. 116.

22. (195) *Epiphora*: est viciosus ex oculis humoris

humoris lacrymalis, sebacei aut purulenti effluxus. Cullen G. 117.

23. (196) *Coryza*: est humoris serosi mucosiue e naribus effluxus, sine (vel cum) ozaena, plerumque cum grauedine. Cullen G. 39.

24. (197). *Ptyalismus*: est saliuae muciue vberior, frequentior ex ore reiectio, aut destillatio. Cullen G. 118.

25. (193) *Anacatharsis*: est muci, lymphae purisue e pectore facta per os cum tussi, reiectio (frequens, notabilis et morbosa). Cull. G. 39.

26. (199) *Diabetes*: nimia, subita post potum crudae vrinae per vias proprias voluntaria emissio, cum siti (anorexia). Cullen G. 61.

27. (200) *Enuresis*: inuoluntaria doloris et ardoris expers mictio (quae saepius insciis accidit). Cullen G. 119.

28. (201) *Pyuria*: est purulentae, albescentis, aut viscido-mucosae materiae mictio voluntaria, vel effluxus involuntarius.

26. (202) *Leucorrhoea*: est serosae flauae, putridae, puriformis, foetidae, atrae materiae ex vtero delapsus, effluxusue diuturnus. Cullen G. 38.

30. (203) *Lochiorrhoea*: lochiorum nimius fluxus (puerperam debilitans).

31. (204) *Gonorrhoea*: est stillicidium fluidi seminalis, vel puriformis ex pene vel vagina (sine mictione). Cullen. S. 120.

32. (205) *Galactirrhoea*: est stillicidium lactis ex mammis (vel locis insolitis).

33. (206) *Otorrhoea*: est fluxus ex auris cauo, ambitu, aut parte postica insolitus et morbosus (serosus, purulentus, foetidus).

Ordo V. Aërifluxus, est flatus halitusue vitiosa emissio.

34. (207) *Flatulentia*: est morbus flatuum per superiora vel inferiora, emissione frequente et borborygmis designatus. Cullen S. 44.

35. (208) *Aedopsophia*: est flatuum ex vesica per vrethram vel ex vtero per vaginam emissio.

36. (209) *Dysodia*: est foetor sudoris, variorumque miasmatum exsudantium. (Exhalant tales vapores e naribus, ore, vulua, inguinibus, axillis et pedibus).

Classis

Classis VI. Suppreſſiones.

Meatuum impeditio; hinc ſolitarum in ſanite excretionum impedimentum et emanſio. *Suppreſſorii morbi* Illuſtr. *Linné*.

Ordo I. Suppreſſiones humorum ſeroſorum.

1. (210) *Adiapneuſtia*: tranſpirationis naturalis et liquoris cutis organa humectantis ſuppreſſio.

2. (211) *Sterilitas*: foecunditatis ſeu conceptus impeditio, geniturae ſuppreſſio.

3. (212) *Iſchuria*: vrinae retentio ſecretae a renibus, vel ipſius ſecretionis ſuppreſſio et ſublatio; tumor quandoque hypogaſtrii et ſtupor renum adeſt cum veſica vacua, ſingultu, anorexia, vomitu, ptyaliſmo vrinoſo, ephidroſi. Cullen G. 122.

4. (213) *Dyſuria*: difficilis, guttata et dolorifica ſaepiusque ardens vrinaee miſſio, ſeu mictio. (Eſt fluxus vrinae pro parte, et non in integrum vt in iſchuria, ſuppreſſus. Cullen G. 123.

5. (214) *Aglactatio*: lactis defectus. Cullen

6. (215) *Dyſlochia*: eſt lochiorum ſuppreſſio et intempeſtiua ceſſatio.

Ordo

Ordo II. Suppreſſiones ingerendorum ſeu conſtrictiones meatuum ingerenda alias in ſanitate admittentium.

7. (216) *Dyſphagia*: deglutitio vitiata, impedita (abſque notabili reſpirationis laeſione et phlegmaſia).

8. (217) *Angina*: reſpiratio impedita, cum dyſphagia, abſque phlegmaſia (ſiue dein adſit dyſphagia, ſiue non).

Ordo III. Suppreſſiones imi ventris, ſeu alui, haemorrhoidum et genitalium foeminini ſexus.

9. (218) *Dyſmenorrhoea*: menſtrua ſuppreſſa ac dolorifica cum lumbagine, cephalalgia, dyſpnoea, palpitatione cordis etc.)

10. (219) *Dyſtocia*: partus difficilis, impoſſibilis, ſeu dolorifica laborioſa vltra modum foetus excluſio aut ſecundinarum, vel penitus impoſſibilis.

11. (220) *Dyſhaemorrhois*: ſuppreſſio ſuetatarum haemorrhoidum; (dum fluxus ſuetarum haemorrhoidum periodicus ſaepius ſupprimitur ex quacunque occaſione, ante annum circiter 60.65. quo hic fons ſponte ſiccari ſolet; oriuntur lumbago, iſchias, vertigo, cephalalgia, tenſio ceruicis, anxietas, dyſpnoea,

pnoea, colica etc. — Haemorrhoidum fluxus qui vltra annum 65. protrahitur, iam morbosus haberi debet etc.

12. (221) *Obstipatio*: faecum alui exoneratio impedita; vel plane nulla etiam medicamentis prolici possunt excrementa. — Rarus est morbus per se, saepissime vero symptoma cet. **Cullen G. 121.**

Classis

Classis VII. Spasmi. Cullen Cl. III. O. 3.

Character classis: contractio constans, vel interpolata musculorum motum localem efficientium, eaque inuita.

Ordo I. Spasmi tonici partiales: rigiditas organi, vel artus determinati.

1. (222) *Strabismus*: oculi alterutrius spasmus tonicus axium opticorum diuergentiam inferens (vel conuergentium nimiam,) seu spasmus tonicus oculi, vnde huius axis cum alterius axi ad vnum obiectum non conuergi videndum. Cullen G. 113.
2. (223) *Trismus*: maxillae inferioris spasmus tonicus, vel clonicus (vulgo *tortura oris*) Cullen G. 48.
3. (224) *Obstipitas*: (vulgo *torticollis*) colli spasmus tonicus vel clonicus capitis natiuam mobilitatem tollens et directionem mutans. Cullen G. 114.
4. (225) *Contractura*: est artus cuiusdam vt brachii, cruris etc. constans et diuturna rigiditas sensim exorta. Cullen G. 114.
5. (226) *Crampus*: subitanea, fugax, dolorifica musculi vnius vel plurium, rigiditas, contractio, cum dolore subin atroci et clamore.

6. (227) *Priapismus*: penis iniucunda (et sine appetitu libidinis) erectio, rigiditas.

Ordo II. Spasmi tonici generales: rigiditas totius fere corporis.

7. (228) *Tetanus*: spasmus generalis tonicus subito ortus cum dyspnoea. (Rigent musculi omnes et corpus inflexile seruant, cum dyspnoea et rubore faciei. Vel rigent musculi solum posteriores corporis aut anteriores, et corpus flectunt horribiliter, et flexum seruant plerumque diutius). **Cullen G. 47.**

8. (229) *Catochus*: spasmus generalis sensim ortus, sine dyspnoea (agitatione pectoris, faciei rubore, chronicus). **Cullen G.** 47.

Ordo III. Spasmi clonici partiales: agitatio inuita et coacta cuiusdam organi aut artus, cuius actionis motiuum non percipitur.

9. (230) *Nystagmus*: spasmus clonicus oculi, vel palpebrae (aut pupillae).

10. (331) *Carphologia*: est motus velut conuulsiuus manuum, quo aegri floccos e vestibus, tegumentis euellere, paleas colligere, muscas venari etc. videntur.

11. (232) *Subsultus*: est motus palpitans aut

tremulus

tremulus tendinum iuxta carpum potiſſimum obſeruabilis, vel totius corporis.

12. (233) *Pandiculatio*: ſpaſmus artus ſucceſſiue extendens per vices, plerumque cum oſcitatione, ſemivoluntarius *).

13. (235) *Conuulſio*: agitatio inuita artus, vel muſculi cum animae libertate in reliquis, et circumſtantiarum perceptione, recurrens. Cullen S. 49.

14. (236) *Tremor*: artus alterna per itus et reditus frequens motitatio cum mouendi voluntate concurrens: (qua ceſſante ceſſat quoque tremor.) Cullen nach S. 42.

15. (237) *Palpitatio*: pulſatio in regione cordis inſolita, pulſui arteriarum numero, minime vero intenſitate reſpondens (ſeu eſt pulſatio in regione cordis inſolita cum pulſu intermittente, caprizante, tremulo, ſubduro, inaequali ordinato, debili quandoque et dyſpnoea ad quemlibet motum notabili. Cullen S. 53.

16. (238) *Claudicatio*: eſt inter gradiendum cruris motus, quo centrum grauitatis trunci ſenſibiliter dextrorſum, vel ſiniſtrorſum transfertur: (ſeu eſt vitioſus gradiendi mo-

 dus,

*) Ausgelaſſen iſt: (234) *Apomyttoſis*. Succuſſio cutis et capitis, cum trunci totius agitatione tremula et violenta; adeſt ſimul exſpiratio ſonora, quaſi ſtertoroſa.

dus, quo truncus corporis ſingulis paſſibus huc vel illuc nimium inclinat, vnde crus indecore mouetur, trahitur.

Ordo IV. Spaſmi clonici generales: ſunt ſpaſmi clonici totius corporis, vel plurium partium ſimul.

17. (239) *Phricaſmus*: eſt totius cutis (imo ſaepius totius corporis) ſpaſtica ſuccuſſio frigorifera.

18. (240) *Eclampſia*: eſt artuum ſeu muſculorum plurimorum ſpaſmus clonicus (quandoque remittens), acutus, cum ſenſuum obſcuratione maiore vel minore. (Pollices intro non premunt, ſpuma ex ore non eructat. Spaſmus ſunt tremuli artuum. Vulgo *apoplexia infantum*). Cullen G. 52.

19. (241) *Epilepſia*: eſt ſpaſmus artuum clonicus, periodicus, chronicus cum obſcuratione ſenſuum ſine aſphyxia; cum variorum membrorum inuita agitatione, dyſpnoea, ſpumae oris eruptione, pugnorum conſtrictione. — Symptomata ſunt ſubitaneus caſus, obliuio omnium, clamor, mugitus, ſtridor dentium, truculentia oculorum, ſpuma oris, pugnorum conſtrictio, totius corporis agitatio. Cullen G. 52.

20. (242) *Hyſteria*: eſt artuum organorumque

que etiam internorum ſpaſmus clonicus, tonicuſue, paroxyſmis fugacibus ac leuiter variantibus inſignitus, cum vrina hyalina, (ſenſibilitate animae ſumma), mortis formidine intenſiſſima et partium conuulſarum (remanente) teneritudine attactum fugiente. Illuſt. *Aſtruc* agitationem matricis, pnycem, conſtrictionem pectoris et glomum fluctuantem in abdomine ſtatuit, tanquam ſigna pathognomonica huius morbi. Cullen G. 62.

21. (243) *Scelotyrbe*: eſt motus ſemiuoluntarius vnius lateris, vel totius corporis inter gradiendum, aut comedendum geſticulationem, vel feſtinationem hiſtrionis referens. (*Chorea Sancti Viti. Sydenham.* Cullen G. 50.

22. (244) *Beriberia*: eſt motus gradientium genua in actuali flexione retrahens, cum tremore, formicationis ſenſu, vocis raucedine; hic morbus eſt Indis familiaris.

Classis VIII. Anhelationes.

Character classis; est agitatio inuita, defatigans musculorum pectoris cum respiratione difficili, laboriosa, sonora, frequente, sine febre notabili et sine phlegmasia.

Ordo I. Anhelationes spasmodicae: sunt insultus fugaces spasmodici pectoris saepius iterantes cum exspiratione sonora.

1. (245) *Ephialtes*: anhelatio difficilis, querula cum insomnio terrifico, oppressiuo (vnde respiratio querula, gemebuuda et anxia). Cullen S. 67.

2. (246) *Sternutatio*: concussio violenta pectoris, cum exspiratione veloci narium interiora euerrente, sonora (sub conuulsiua capitis et trunci corporis concussione, ad anteriora flexione).

3. (247) *Oscedo:* repetita, lenta, profunda inspiratio ore hiante, semivoluntaria, saepius cum pandiculatione (seu aeris copiosi, profunde inspirati diutina, lenta et inuita naturalis exspiratio cet.)

4. (248) *Singultus*: concussio diaphragmatis cum inspiratione subito interrupta, sonora.

5. (249) *Tussis*: concussio sonora violenta pectoris

ctoris cum exspiratione ad pulmonem quodam obice liberandum (in ventriculo dura subigenda. Cullen S. 39.

Ordo II. Anhelationes oppressiuae: constantes cum metu suffocationis.

6. (250) *Stertor*: respiratio inter in- vel exspirandum sonum grauem tremulum, vel sibilosum edens.

7. (251) *Dyspnoea*: est difficultas respirandi chronica sine omni intermissione notabili (sine signis empyematis, hydrothoracis etc.) Cullen S. 55.

8. (252) *Asthma*: est morbus chronicus, cuius praecipium symptoma est periodice recurrens respirandi difficultas. Cullen S. 54.

9. (253) *Orthopnoea*: est praeceps et vt plurimum acuta respirandi difficultas (fere suffocatoria anhelatione stipata). Cullen S. 55.

10. (254) *Pleurodyne*: anhelatio cum pectoris dolore sine (vel cum exigua) febre. Cullen S. 21.

11. (255) *Rheuma*: cognoscitur ex difficultate respirandi cum sensu grauitatis in pectore, quam comitatur, vel praecedunt coryza, sternutatio, raucedo, cephalalgia, tussis; vix adest notabilis febris, phlegmasia. (*Endemius* hic morbus). Cullen S. 39.

12. (256) *Hydrothorax:* differt a dyſpnoea faciei pallore; manuum, pedum et ſcroti oedemate tum ſymptomatibus ephialticis; adeſt decubitus horizontalis impoſſibilitas; pulſatio et fluctuatio aquarum aduertitur ad margines coſtarum; tuſſis ſicca vel humida, grauitatio et preſſio ad diaphragma; pulſus contractus, intermittens, inaequalis, cardiogmus et palpitatio obſeruantur. Cullen G. 77.

13. (257) *Empyema*: differt ab hydrothorace per febrem amphimerinam phthiſicam euidentem, maciem, pragreſſam aliquam phlegmaſiam pectoralem non reſolutam ſed ſuppuratam, ſudores profuſos nocturnos, ruborem genarum, poſt paſtum dyſpnoeam maiorem (accedit grauitas ſupra diaphragma, ſtrepitus ad concuſſionem humeri etc. vide *Hydrothoracem*. Cullen nach G. 11.

Classis IX. Debilitates.

Character classis; est impotentia clare et distincte sentiendi, appetendi, consueta vi artus organaue mouendi, nec non imaginandi, vigilandi, sensibus internis et externis vtendi.

Ordo I. Dysaesthesiae: impotentia clare et distincte sentiendi. Cullen Cl. IV. O. 1.

1. (258) *Amblyopia:* visus debilitas respectiua ad situm, gradum lucis, distantiam obiecti, vel absoluta, sine admodum sensibili vitio oculi: (seu est visus debilitas sine admodum visibili oculi vitio, siue dein diu noctuue perseueret visus hebetudo, seu sit absoluta, siue sit tantum diurna, aut crepuscularis; vel solummodo dissita bene videant, vel nimium quantum admota oculo, vel tandem tantum dimidiata videant obiecta. Cullen G. 93.*)

2. (260) *Cataracta:* est visus debilitas vel abolitio ob maculam opacam seu opacitatem lentis crystallinae vel eius capsulae. Cullen G. 91.

3. (261) *Amaurosis:* est caecitas cum pupilla vt plurimum nigra, dilatata et immobili (sine omni sensibili vitio in lente crystalli-

*) *Caligo* (259 der vorigen Ausgabe) Imminutio partialis vel totalis deletio visus, propter repagulum opacum, citra seu ante pupillam oculo inhaerens aut palpebris.

na; vel ſimul cum lente opaca. Quandoque pupilla eſt coarctata mobilis). Vocatur alias *gutta ſerena*. Cullen S. 92.

4. (262) *Anoſmia*: odoratus debilitas aut olfaciendi impotentia. Cullen S. 97.

5. (263) *Agheuſtia:* eſt guſtus debilitas ſeu guſtandi impotentia (cum vel ſine anorexia). Cullen S. 98.

6. (264) *Dyſecoia*: eſt arditus debilitas obicibus extra labyrinthum poſitis: (ſeu grauis auditus et obſcura perceptio ſonorum). Cullen S. 95.

7. (265) *Paracuſis*: voces articulatas, diſtincte audiendi difficultas, impotentia: (ſeu eſt debilitas vel confuſio auditus, qua affecti clare percipiunt voces, ſed non diſtincte diuerſos ſonos et articulatas voces audiunt, vel alios ſonos clare et diſtincte audiunt, alios tantum clare ſine diſtinctione). Cullen S. 96.

8. (266) *Cophoſis*: ſonos etiam ſimplices percipiendi, audiendi difficultas ſeu impotentia (totalis vel partialis), ex obice intra, aut extra labyrinthum latente. Cullen S. 95.

9. (267) *Anaeſthaeſia*: eſt tactus in toto corpore, debilitas ſeu obſcuritas, ſine ſtupore, ſopore (vel motu muſculari et appetitu rerum neceſſariarum aliquantum minutis). Cullen S. 99.

Ordo

Ordo II. Anepithymiae: appetituum ſenſitiuorum debilitas notabilis ſeu ſuppreſſio inſolita. Cullen Cl. IV. O. 2. Abſchn. 2.

10. (268) *Anorexia*: eſt appetitus eſculentotorum ſuppreſſio ſeu famis feriatio (in ieiunis animantibus). Cullen G. 44. und 106.

11. (269) *Adipſia*: appetitus potulentorum ſuppreſſio ſeu ſitis feriatio. Cullen G. 107.

12. (270) *Anaphrodiſia*: appetitus venereorum motuumque ei famulantium debilitas, impotentia, ſuppreſſio. (Vide *Sterilitatem*). Cullen G. 108.

Ordo III. Dyſcineſiae: eſt motus impotentia in organis libertati ſubditis: vel eſt debilitas muſculorum motum localem efficientium ſenſusque organis ſeruientium. Cullen Cl. IV. O. 3.

13. (271). *Mutitas*: eſt voces articulatas edendi impotentia. Cullen G. 110.

14. (273) *Aphonia*: eſt plenaria vocis ſuppreſſio citra ſtuporem et ſyncopen (et comata. *Muti* inarticulatam vocem habent, *aphoni* contra nullam). Cullen G. 109.

15. (273) *Pſelliſmus*: quaſdam ſyllabas, vel litteras pronuntiandi difficultas, impotentia. Cullen G. 112.

16. (274) *Cacophonia*: eſt vocis vitium, inſuauitas, aſperitas. Cullen G. 111.

17. (275) *Paralysis:* est motus aut tactus, vel vtriusque debilitas in artubus, lingua etc. cum laxitate (absque dolore cum vel siue anaesthesia. *Paresis* est sensim inuadens debilitas mouendi artus, seu est imperfecta paralysis. Mouent enim artus sed difficulter. Colicam pictonum aliasque species rachialgiae comitatur vel sequitur paresis, lente accedit, et non est tanta quanta in paralysi. Cullen G. 42.

18. (276) *Hemiplegia*: est debilitas paralytiea in vno tantum latere corporis, dextro nempe, vel sinistro; tota dimidia pars corporis est plerumque paralytica magis, vel minus, cum laxitate, frigiditate, indolentia artuum, et mentis integritate sine vel cum anaesthesia. Cullen G. 42.

19. (277) *Paraplegia*: est debilitas paralytica omnium membrorum infra caput, cum enuresi, anaphrodisia, quandoque et anaesthesia ac marasmo. Cullen G. 42.

Ordo IV. Leipopsychiae, motum viriumque vitalium debilitas. Cullen Cl. II. O. 2.

20. (278) *Asthenia*: est totius corporis gradaria seu successiua debilitas, sensibus integris: (superstite actionum vitalium minutarum tenore,

tenore, superstitibusque licet debilitatis sensibus, sine dolore.

21. (279) *Lipothymia*: virium muscularium totius corporis subitanea imminutio pulsu, adhuc superstite (et cognoscendi aliqua facultate adstantes, cum aurium tinnitu, calore vertiginosaque capitis turba).

22. (281) *Asphyxia*: omnium motuum sensuumque cessatio subitanea, cum pulsus etiam in collo inobseruantia: vera mortis imago, vitae eclipsis. Cullen G. 43.

23. (280) *Syncope*: motuum vitalium (et animalium) subitanea debilitas cum frigore, pallore, sensuum obscuratione et pulsus exilitate, (cum lenta lenique respiratione, pulsu obscuro, sudore frigido et aliquo internarum partium calore). Cullen G. 43.

Ordo V. Comata: sunt feriationes omnium sensuum et motuum cum superstitibus pulsus et respirationis actionibus, seu sunt Morbi soporosi. Cullen Cl. II. O. 1.

24. (282) *Catalepsis*: est status soporosus (seu sensuum omnium motuumque muscularium suppressio, pulsu et respiratione pacatis, placidis, lentis, minutis vel obscuris), cum artuum flexitate et ad quosuis nouos situs datos

tos retinendos aptitudine. (Retinent figuram in qua ipſos prehendit morbus et omnem recipiunt ſeruantque quam illis dederis. Morbus eſt recurrens et fors tantum muliebris.) Cullen S. 41.

25. (283) *Ecſtaſis*: eſt ſtatus ſoporoſus a graui pathemate ſubito ortus, in eodem ſitu aegrum, in quo eundem prehendit, retinens, ſine aptitudine cataleptica retinendi ſitus datos. Cullen S. 41.

26. (284) *Typhomania*: eſt propenſio in ſoporem cum agrypnia: ſeu eſt ſtatus ſoporoſus facile excitabilis cum frequente muſſitatione ſeu ſomnio, et viuiditate imaginationis ac memoriae; vulgo dicitur *Coma vigil.* Cullen S. 41.

27. (285) *Lethargus*: eſt ſtatus ſoporoſus facile excitabilis, cum magno imaginationis et memoriae torpore, obliuione et febre. Cullen S. 41.

28. (286) *Cataphora*: eſt ſtatus ſoporoſus facile excitabilis ſine delirio (ſtertore) et obliuione notabili. Cullen S. 41.

29. (287) *Carus*; eſt ſopor profundus vix excitabilis cum, vel ſine febre, absque ſtertore (cum reſpiratione tacita pacatiſſima. Morbus eſt ſaepius *acutus*. Semiapertis

oculis

oculis plerumque dormiunt, omnino immobiles). Cullen G. 339.

30. (288) *Apoplexia*: eſt ſopor profundiſſimus, haud excitabilis cum ſtertore, inſenſibilitate, et actionum vitalium, pulſus et reſpirationis augmento: (cum faciei tumore, omnium artuum laxitate et pulſu plerumque duro, forti). Cullen G. 41.

Claſſis

Classis X. Exanthemata. Cullen Cl. I. O. 3.

Character classis: febris cum asthenia, efflorescentia cutis maculata varia, pustulosa, papulosa, phlyctaenoidea etc. vel caui oris, saepius maligna.

Ordo I. Exanthemata contagiosa.

1. (289) *Pestis*: eruptio purpurae, bubonum, anthracum, pemphigi, cum pyrexia plerumque typhode, maligna, dat characterem huius generis. Cullen G. 26.

2. (290) *Variola*: eruptio pustularum phlegmonoidearum, suppurantium, deciduarum et cicatrisantium, cum febre continua; praeludit cephalalgia, lumbago, nausea, eclampsia, vomitus variolae eruptionem. Variola saepissime epidemicus, contagiosus morbus illis, qui has nondum sustinuerunt. Cullen G. 27.

3. (291) *Pemphigus*: eruptio phlyctaenarum vel potius hydatidum auellanis similium in artubus vel toto corpore, sero (flauo) plenarum cum pyrexia. (Alias *febris* dicitur *bullata*. Cullen G. 31.

4. (292) *Purpura*: eruptio maculosa, indolens, similis pulicum morsuris seu puncturis, sine puncto

puncto infixi aculei pulicis, (coloris purpurei, lateritii, nigri, liuidi ſine tumore, aſpredine cutis), cum febre typho, vel remittente, aſthenia, lingua plerumque rubra, lateritia et molli. Cullen nach S. 34.

5. (293) *Rubeola*: papulae rubrae vniformes, euaneſcenti - furfuraceae; febris continua acuta cum ſymptomatibus catarrhoſis. (Poſt praeludium catarrhoſum, coryzam, epiphoram, tuſſim, cephalalgiam, ſomnolentiam et palpebrarum tumorem erumpunt papulae corymboſae rubrae, pulicum morſus aemulantes, aſperae, vniformes, euaneſcenti - furfuraceae, *die quarto*, cum exiguo leuamine ſymptomatum contagii in facie, collo, thorace, trunco reliquo et artubus quandoque. *Sexto* die in facie iam aſperantur, ſiccantur, et in tenuiſſimum furfurem fatiſcit epidermis. Hoc eſt initium *tertii* ſtadii, quod ordinario *octauo* vel *nono* die vna cum morbo finitur. — Vel: Eſt febris contagioſa cum tuſſi ſicca et madore oculorum, in qua maculae rubellae, lateſcentes, paullum eleuatae, aſperae erumpunt, quae deinceps in tenuiſſimas ſquamulas ſoluuntur.) Cullen S. 29.

6. (294) *Scarlatina*: eruptio maculoſa ruberrima diffuſa, pruriens, papuloſa, irregularis,

 deſqua-

desquamabilis sine praeludio catarrhali, cum febre plerumque iudicatoria et aliquo dolore colli. Cullen G. 31.

Ordo II. Exanthemata sporadica, non contagiosa.

7. (295) *Miliaris*: eruptio phlyctaenarum milii semine raro maiorum, cum sudore vapido, vrina minus tincta, lingua plerumque alba; febris est continua vel remittens; praeludit oppressio praecordiorum et pulsus contractus, Cullen G. 30.

8. (296) *Erysipelas*: eruptio erythematis tumidula superficialis, dilatabilis, desquamabilis, cum febre continua et vstione loci affecti. Cullen G. VII. 2. und G. 25.

9. (297) *Essera*: eruptio plerumque apyreta macularum sub cuticula guttacearum, rubrarum, sine omni tumore et eleuatione earundem vltra libellam cutis, subin continua, subin subito accedens, per vices et recedens.

10. *Vrticaria*: febris continua (iudicatoria vel humoraria) mitior amphemerina, pustulae puncturis vrticarum similes rubrae, eminentes, fastigiatae, fugaces, desquamabiles; (febris omni vespere exacerbatur, exanthemata latius sese efferunt.) Cullen G. 32. *)

11. (298)

*) Nouum genus.

11. (298) *Aphtha:* eruptio pustulosa, phlyctaenoidea, vlcerosa, dolens et vrens in ore, faucibus, quandoque et pudendis cum febre obscura, somnolentia. — Cognoscitur *aphtha* papulis seu phlyctaenis linguae, faucium, oris superficiem occupantibus, subrotundis, plerumque semilinearibus, colore albis in disco cum radio saepius rubro; vel rubris, bruneis, flauis, liuidis, nigris et febre tritaeophya, vel obscura hectica aut penitus nulla. Adest simul somnolentia, dolor vrens oris, et difficultas in masticatione, suctione ac deglutitione. Aphtha habet quatuor stadia distincte, si non in omnibus speciebus, in febrili semper obseruabilia Stadium *primum* sese prodit lassitudine spontanea, leui dyspnoea, gastrodynia, anxietate exigua, somnis turbatis et calore oris. In stadio secundo propullulatio papularum. In studio *tertio* eleuantur papulae seu maculae in phlyctaenas miliares, quae probabiliter sunt idem cum miliaribus cutis. Stadium *quartum* absoluit desquamatio epithelii cum dolore sensibilissimo linguae et faucium superficiali. Cullen S. 34.

Classis XI. Phlegmasiae. Cullen Cl. I. O. 2.

Character classis: febris quasi semper continua cum pulsu duro, dolore topico, alicuius partis inflammatione, sanguine crusta inflammatoria tecto, vrina plus colorata, siti, lingua subsicca, sicca, alba, calente etc. *Hippocrates*, a, p. 810. 811. reliquit: lingua concolor attingentibus ipsam humoribus; quapropter per hanc humores cognoscimus.

Ordo I. Phlegmasiae musculosae.

1. (299) *Phlegmone*: inflammatio partis externae, febris inflammatoria continua, dolor partis inflammatae inflammatorius, tumor, rubor, calor et tensio, sanguis crusta inflammatoria tectus. (Pars externa phlegmone affecta calet, rubet, dolet, tumet, est simul tensa resplendens, sphaeroidea. Cutis ipsa et partes sub ipsa contentae inflammatae sunt. Phlegmone in suppurationem tendit, neutiquam vero erysipelas.) Cullen G. 7.

2. (300) *Cynanche*: dolor et inflammatio in faucibus cum dyspnoea, dysphagia et pyrexia inflammatoria. Cullen G. 10.

3. (301) *Myositis*: febris acuta, dolores in diuersis musculis artuum musculorumque involu-

volucris, (diu noctuue discruciantes, motum vetantes ferme omnem, ad noctem exacerbantes.) Sanguis missus est tectus crusta inflammatoria tendinosa, gelatinosa. Cullen G. 21.

4. (302) *Carditis*: dolor sub sterno in regione cordis, (vrens, flammam vitae exstinguens), pulsus inaequalis, frequens; pyrexia inflammatoria, palpitatio, cardialgia, animi deliquia, cordis anxietas. (Febris acuta typhodes. Cor manu tenentes aegri fugitiuis oculis et mille iactationibus agitati, sibi comburi, illudque mori queruntur, clamant.) Cullen G. 12.

Ordo II. Phlegmasiae membranaceae.

5. (303) *Phrenitis*: dolor capitis internus inflammatorius, delirium assiduum, saepius audax; vis artuum subito aucta, pyrexia inflammatoria, acuta, vrinae clarae, citrinae (cum nubecula sublimi). Cullen G. 9.

6. (304) *Diaphragmitis*: pyrexia acuta inflammatoria, dolor obscurus ad costas spurias, sputa sanguine tincta, oppressio grauis pectoris, pulsus varians, saepius intermittens; cingulum praecordia stringens queruntur aegri orthopnoeici; calor est in pectore vrens, retractiones anguli oris frequentes

semiliberae, lethargus, carphologia, cataphora, delirium. (Pulsus est inaequalis, inordinatus, intermittens, durus. Hypochondria intro tracta, respiratio sine motu diaphragmatis. Facies iam pallet, iam rubet. Cullen G. XI. 2.

7. (305) *Pleuritis*: dolor pectoris inflammatorius, pyrexia acuta, inspiratio frequens laboriosa, tussis, pulsus durus. Cullen G. XI. 2.

8. (306) *Gastritis*: est phlegmasia stipata epigastrii dolore, ardore, tensione, siti, nausea, vomitione, singultu et pyrexia acutissima. Cullen G. 14.

9. (307) *Enteritis*: est phlegmasia acuta, cuius symptomata sunt tensio tumidula et summe dolens, tactum non tolerans earum partium abdominis, quibus intestina inflammata respondent, cum pyrexia, meterorismo, quandoque et ileo, vel dysenteria. Cullen G. 15.

10. (308) *Epiploitis*: dolor circa epigastrium et vmbilicum iuxta epiploi extensionem ac situm, pyrexia mitior inflammatoria; canalis intestinalis sat liber, tumor epiploi sub propugnaculis viscerum abdominalium palpo obseruabilis. (Febris mitis amphimerina, virium non magna prostratio; lingua alba

ba tumidula, sanguis missus coriaceus, respiratio suspiriosa. Pulsus durus naturali celeritate et frequentia non multum maior, sitis mediocris, vrinae flauae, appetitus aliquis, aliqualis et somnus.) Cullen S. 13.

11. (309) *Cystitis*: phlegmasia cum ouali intumescentia in pelui, tensione, dolore tactum fugiente, pyrexia mitiore continua, vel remittente, tenesmo, vel obstipatione, dysuria, vel ischuria; pulsus vix est febrilis; sanguis semper obseruatur inflammatorius, pleuriticus. (Adsunt insuper vigiliae, sitis, subin delirium, extremorum frigus. — Difficilis iniectio clysmatum. Vrina minus tincta. Pulsus tensus subdurus, naturali frequentia et celeritate non multo maior, imo rarior: subinde in sanguine misso crusta, tenuis, alba, subgelatinosa. Cullen S. 9.

Ordo III. Phlegmasiae parenchymatosae.

12. (310) *Cephalitis*: febris acuta cum delirio somnolento, carphologia, asthenia, typho. Pulsus successiue mollescit cum frequentia sine celeritate; aegri sunt admodum debiles. Lingua plerumque mollis, sudor quasi perpetuus; caput saepe manibus impetunt, fricant etiam deliri. Respirant aegri cum sonitu siue stertore. Hunc morbum consistere in inflammatione cerebri confirmatur sectione cadauerum. Cull. S. 9.

13. (311) *Peripneumonia*: pyrexia acuta, dyſpnoea ſeu orthopnoea grauis, ſenſus oppreſſionis grauatiuae ſub ſterno in pectore; tuſſis cruenta; facies rubra, (lingua rubra tumidula) pulſus (in incremento durus, magnus, ſub inſpiratione remittens vel penitus intermittens), ad finem morbi mollis. **Cullen G. XI. 1.**

14. (312) *Hepatitis*: eſt phlegmaſia cum dolore, tenſione, calore in regione hepatis et pondere, cum ſubaurigine, tuſſi ſicca, reſpiratione difficili, pyrexia acuta amphemerina, vel tritaeophya, (ſiti, anorexia, ſaepius et ſingultu, vomitione et tumore hepatis. Pulſus ſubdurus, tenſus. Serum ſanguinis et cruſta plus flaua). Vrina icteritia (bilioſa.) **Cullen G. 16.**

15. (313) *Splenitis*: dolor, tumor in regione lienis vix tactum ſufferens (pulſatilis), cum febre inflammatoria remittente, (ſaepius tetartophya, calore), dyspnoea, tuſſi ſicca dolorem augente lienis. Pulſus in inſpiratione intermittens, in carpo ſiniſtro magis. Abſentia ſymptomatum nephriticorum. Frigent aegri artubus. Calor internus non eſt adeo magnus. Sanguis miſſus eſt cruſta inflammatoria tectus. Cibi adeſt faſtidium. Decubitus in latere ſiniſtro difficilis: ſitis et anxietas.) **Cullen G. 17.**

16. (314)

16. (314) *Nephritis*: dolor acutus in regione renum ſecundum vreteres in veſicam protenſus cum phlegmaſia, iſchuria aut dyſuria, cruris ſtupore, (teſtis retrahitur et rotatur,) vomitione; aeger poteſt in hoc morbo ſine dolore corpus ad anteriora flectere (flexumque erigere.) Cullen G. 1.

17. (315) *Metritis*: eſt phlegmaſia cum dolore, tumore, ardore, grauitate in regione vteri, cum pyrexia plerumque remittente; immiſſi in vaginam digiti os vteri attactum non tolerat; os vteri calet, ſinciput dolet et oculi; adſunt conuulſiones artuum, delirium, iactatio, extremorum frigus, (horror perpetuus), animi deliquia, (iactatio, ſpaſmi,) obſtipatio, dyſuria, (vel iſchuria), pulſus varians (ſopor, tetanus, catalepſis, cum febre, plerumque intermittente.) (Adeſt dolor ad inguina, femora, diaphragma, qui ad clauiculas extenditur, cum dyſpnoea, nauſea vomitione, ſingultu). Cullen G. 20.

Classis XII. Febres. Cullen Cl. I. Ord. 1.

Character classis: pulsus frequens, celer, fortis; respiratio celeritate, magnitudine, frequentia aucta, viribus artuum minutis; vel virium vitalium augmentum, aut saltem in statu sanitatis perseueratio, viribus artuum notabiliter minutis.

Ordo I. Febres continuae; pyrexia semel crescit, et semel decrescit in cursu aegritudinis. Cullen Cl. I. O. 1. Abschn. 2.

1. (316) *Iudicatoria*: decursus morbi intra dimidiam septimanam (vel quatuor dies) absoluitur; morbus subito ingruit cum aliquali frigore sine rigore, exiguo decremento virium vitalium. Aggreditur haec febris cum pulsu aliquo critico, sudore aut vrina criticis; vnde *iudicatoriam* vocaui potius hanc febrem, vt nomen hoc saltem in aliqualem notitiam morbi nos ducat; ingruit quippe cum crisi, vbi contra ineptum nomen *ephemera* contrarium durationi huius febris lumen nullum nobis dabat. Vigesies saltem passus sum hunc morbum, et semper ad minus 4 diebus durauit; merito igitur istud contrarium durationi nomen throno detrusi, cui per tot saecula ineptum insederat.

2. (317) *Humoraria*: decursus est huius febris, 7. 9. 11. vel 14. dierum, incipit cum pulsu irratationis, frigore et calore sese excipientibus; crescit vsque ad 4. 5. vel 9. aut plane, 11. diem (duratio vsque ad 7. 9. 11. 14 vel 17 diem.) In hac febre est maior artuum debilitas; in acmine omnia sunt vehementiora, puto cephalalgiam, calorem, ruborem, faciei, pulsus celeritatem et frequentiam, pulsationem temporum; principium huius est in humoribus auctis vel inspissatis, perspirabili retento onustis; vnde *humorariam* potius quam *synocham* hanc dixi, baptisaui nomine causam morbi indicante.

3. (318) *Frigeraria*: est febris continuae genus, quae ordinario ad XXI. vel. XXX. decurrit diem; incrementum habet longius praecedentibus; ingruit cum pulsu irritationis, pulsu et respiratione auctis et viribus artuum multum minutis; lingua est sicca, sordida et odor excrementorum omnium foetidus, inuadit cum notabili frigore saepe et rigore et fractione crurum, vt aegri sese exprimunt; vnde *frigeraria* mihi nominata esto ab hocce symptomate potius quam synoches; haec est proprie *febris putrida*.

4. (319) *Typhus*: decursus saepius vltra 31. diem,

diem, virium vitalium exiguum augmentum vel nullum, virium artuum summa prostratio, vrina plerumque sanae similis, facies saepius plumbea, sopor aut stupor, (calor iam magnus, iam nullus. Color cutis pallidus, squalidus: exanthemata varia huic morbo superueniunt epigenomena) carphologia, sunt signa typhi, pulsus et vrina bona, et aeger moritur. Cullen G. 5.

5. (320) *Hectica*: decursus vltra mensem, (sine notabili prostratione virium) pyrexia exigua, lingua potissimum sordida, debilitas artuum exigua, vrina turbida crassa, (pelliculam pinguem innatantem gerens) calor corporis ad tactum mordens, pulsus subdurus et post pastum frequentior, sudores symptomatici. Febris haec nullam habet notabilem exacerbationem, differt ab omni amphimerina, phthisi et tabe, quia suppurationem pro causa non habet. Aegri sunt plerumque orthostadi. Cullen nach G. 6.

Ordo II. Febres remittentes: sunt febres continuae cum exacerbationibus notabilibus quotidianis, tertianis, quartanis etc. Cullen Cl. I. O. 1. Abschn. 1.

6. (321) *Amphimerina*: est febris continua cum exacerbatione quotidiana: (exacerbationes similes sunt.) Cullen G. 3.

7. (322) *Tritaeophya*: est febris continua cum exacerbationibus tertianis. Cullen G. I. 2.

8. (323) *Tetartophya*: est febris continua cum exacerbationibus quartanis (seu quartanae typum seruantibus.) Cullen G. II. 2.

Ordo III. Febres intermittentes: pyrexia pluries in decursu aegritudinis deserit aegrum penitus, et iterum recurrit cum interuallis intermediis lucidis et penitus apyretis. Cullen Cl. I. O. 1. Abschn. 1.

9. (324) *Quotidiana*: febris paroxysmi similes nycthemeris singulis. Cullen G. 3.

10. (325) *Tertiana*: febris paroxysmi similes nycthemeris alternis. (Vrinae lateritiae sunt optimum signum febrium intermittentium.) Cullen G. I. 1.

11. (326) *Quartana*: febris paroxysmi similes quarta quaque die redeunt, intercurrentibus duabus apyretis. Cullen G. II. 1.

12. (327) *Erratica*: recessus et accessus febris sibi similes distantes pluribus diebus ab inuicem quam in quartana; vel sunt omnes paroxysmi dissimiles et variantes. Cullen nach G. 2.

Classis

Classis XIII. Vesaniae. Cullen Cl. II. O. 4.

Character classis: est morbus mentis seu error in imaginatione, appetitu, iudicio, vel memoria.

Ordo I. Hallucinationes: imaginationes deceptiuae ex errore organi, aut mentis natae.

1. (328) *Vertigo*: est apparens obiectorum vacillatio, nutatio aut gyratio. (Ipse aeger quandoque sibi nutare videtur. Dicta phaenomena etiam clausis oculis plerique patiuntur.)

2. (329) *Suffusio*: obiectorum, quae extra nos non sunt, visio: (seu est genus morbi imaginarii seu hallucinatio visus circa obiecta, quae sibi suffusione affectus videre videtur, licet horum prototypus extra oculos non exstet. Suffusio repraesentat corpora, quae non sunt, vel talia, qualia a parte rei non existunt; et vertigo motum corporum refert, quae actu non aguntur.) Cullen G. 94.

3. (330) *Diplopia*: hallucinatio, qua idem et vnicum obiectum duplicatum, vel multiplicatum apparet. Cullen G. 94.

4. (331) *Syrigmus*: auditio seu perceptio imaginaria soni, cuius nullum est extra aures principium: (seu est error imaginationis

nis ſonos, qui extra aurem non ſunt, ſibi repraeſentantis, a commotione vibratoria organorum acuſticorum per principia in aure latentia natos.) Cullen G. 66.

5. (332) *Hypochondriaſis*: cognoſcimus hypochondriacos ex imaginatione vitiata; quapropter ad minutias morbum ſuum explicant, nec ceſſare norunt, incurabilem declarant, vel breui lethalem ob leuia ſymptomata, puta borboryſmos, ructus, palpitationes, tremorem praecordiorum, ſubſultus, (fugaces vertigines,) ephialtem, ſtuporem artuum; hypochondriaci hallucinantur circa propriam valetudinem ex nimio ſui amore, ſaluo ratiocinio de reliquis. Cullen G. 45.

6. (333) *Somnambuliſmus*: eſt hallucinatio, qua preſſi, (ob imaginationem viuidiſſimam, ſepitis ſomno ſenſibus, motus muſculares exercent,) ſomniantes ſurgunt, ambulant, ſeque variis exponunt periculis. Cullen G. 67.

Ordo II. Moroſitates: cupiditates ſeu appetitus, vel auerſationes, deprauatae. Cullen Cl. IV. Ord. 2. Abſchn. 1.

7. (334) *Pica*: alimentorum inſolitorum, vel corporum indigeſtibilium appetitus cum aſſuetorum auerſatione. Cullen G. 102.

8. (335) *Bulimia*: appetitus eſculentorum copiae

piae maioris, quam (quae a viribus ventriculi) digeri potest. Cullen G. 100.

9. (336) *Polydipsia:* appetitus maioris solitae copiae potulentorum, seu potulentorum appetitus immodicus. Cullen G. 101.

10. (337) *Antipathia*: quorundam obiectorum tanta auersatio, vt ex eorum visu, vel olfactu homo alteretur, symptomata varia patiatur, eaque subinde sat grauia.

11. (338) *Nostalgia*: patriae, parentum, cognatorumue tanta cupiditas, vt hac non expleta homo in grauia incidat mala, taedio omnium afficiatur, hectica febricula consumatur; anima quasi in corpus non agat, obtuse ab eius plagis afficiatur, conseruationem corporis negligat; carent hi omni appetitu, imo vix conspectus formosae virginis hos mouet, excitat. Cullen G. 105.

12. (339) *Panophobia*: summus pauor inter dormiendum sine causa euidente. Clamant aegri, gemunt, tremunt, sudant. Hoc genus non multum differt ab ephialte, epilepsia nocturna. Cullen G. 65.

13. (340) *Satyriasis*: est effraenis impudensque veneris cupiditas cum libidinosa penis erectione. (*Priapismus* caret cupiditate libidinosa.) Cullen G. 104.

14. (341

14. (341) *Nymphomania*: eſt effraena in foeminis veneris cupiditas. Cullen G. 104.

15. (342) *Tarantiſmus*: eſt effraenis choreas agendi ſaltandique cupiditas. (Morbus in Apulia ſcribitur eſſe endemius. A tarantulae morſu excitari hunc morbum iudicat *Baglivius*, quod Il. *Serao* et experimenta romana inficiantur.)

16. (343) *Hydrophobia*: eſt effraenis potulentorum auerſatio, (impoſſibilis deglutitio,) ſaepius a morſu animalis rabidi orta: (vitant inſuper lucem et aeris motum.) Cullen G. 63.

17. (344) *Rabies*: eſt effraenis cupiditas mordendi omnes obuios homines et animalia, ſine hydrophobia, (cuius tamen etiam ſaepius ſymptoma eſt;) morbus obſeruatus apud galloprouinciales in lupis et canibus.

Ordo III. Deliria: errores mentis in iudicio, a cerebri vitio plerumque oriundi.

18. *Paraphroſyne*: delirium fugax a veneno, aut alio morbo dependens. Cullen G. 66 *).

19. (346) *Amentia*: delirium vniuerſale ſeu de

*) Nouum genus.

de omnibus mite, ſine furore et audacia cum morbo diuturno: (ſeu inſania chronica vniverſalis mitis, aut ineptitudo ad recte ratiocinandum et iudicandum, cum perceptione obiectorum, aſt ſine attentione.) Cullen G. 64.

19. (347) *Melancholia*: delirium particulare ſeu de vno obiecto, mite, cum moerore, ſolitudinis amore ac morbo diuturno: delirant melancolici ſine furore et ſine febre de vno potiſſimum obiecto conſtanter: delirant circa ſemetipſos, aut ſuum ſtatum: de reliquis obiectis adhuc ſat bene ratiocinantur. Cauſa morbi latere in abdomine videtur, ganglia ſemilunaria et plexus neruorum abdominales afficiens.) Cullen G. 65.

21. (348) *Daemonomania*: delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiae tribuitur. Cullen G. 65.

22. (349) *Mania*: delirium vniuerſale (apyretum), cum furore, audacia et morbo diuturno apyreto. Maniaci plerique habent lucida interualla; ſubin eſt mania periodica; vnde *lunatici*. Sanguis maniacorum viſcidus ſeroque carens, fibrae muſculares rigidae.) Cullen G. 66.

Ordo IV.

Ordo IV. Vesaniae anomalae: prioribus morbis affines vesaniae.

23. (350) *Amnesia*: est omnis memoriae feriatio seu carentia. Cullen G. 64.

24. (351) *Agrypnia*: est peruigilium immodicum, continuum, ex quo vires imminuuntur; anxietas, inquietudo, anorexia, cephalalgia, aliaque molesta symptomata oriuntur.

Verzeichniß der Gattungen von Sauvages, die Cullen nicht in sein System eingerückt hat.

Die mit † bezeichneten sind solche, von denen er selbst gestehet, daß sie vielleicht einen Platz darinnen verdienet hätten.

G. 1. Leucoma. Flecken der Hornhaut.
G. 2. Vitiligo. Weiße Flecke.
G. 3. Ephelis. Leberflecke.
G. 5. Naeuus. Muttermahl.
G. 8. Epinyctis. Ausfahren an Beinen. Wässerichter scorbutischer Friesel.
G. 10. Hidroa. Hitzblattern.
G. 12. Oedema. Wäßrichte Geschwulst.
G. 24. Condyloma. Feigwarzen.
G. 26. Pterygium. Fell auf der Hornhaut.
G. 28. Bronchocele. Kropf.
G. 30. Gibbositas. Buckel.
G. 31. Lordosis. Krumme Glieder.
G. 36. Staphyloma. Hervorragung der Hornhaut.
G. 40. Exomphalus. Wasser-Nabelbruch.
G. 62. Loxarthrus. Anhaltende Verdrehung der Glieder.
G. 65. Excoriatio. Wundwerden.
G. 66. Contusio. Quetschung.
G. 76. Eschara. Borke.
† G. 99. Essera. Nesselsucht.
G. 120. Crampus. Krampf eines Muskels.
G. 121. Priapismus. Schmerzhafte Steiffigkeit des männlichen Gliedes.
G. 134. Nystagmus. Convulsivische Bewegung des Auges oder der Augenlieder.

G. 125.

G. 125. Carphologia. Flockenzupfen.
G. 126. Pandiculatio. Dehnen der Glieder.
G. 127. Apomyttosis. Schaudern.
G. 131. Claudicatio. Hinken.
G. 132. Rigor. Frost der Haut.
† G. 137. Beriberia. Eine convulsische Krankheit in Indien.
G. 139. Sternutatio. Niesen.
G. 140. Oscedo. Gähnen.
G. 141. Singultus. Schlucken.
G. 143. Stertor. Schnarchen.
† G 144. Angina. Halsübel ohne Enzündung.
G. 172. Asthenia. Sprache.
G. 184. Ostocopus. Knochenschmerzen.
G. 187. Anxietas. Aengstlichkeit.
G. 188. Lassitudo. Müdigkeit.
G. 189. Stupor. Stupor.
G. 190. Pruritus. Jucken.
G. 191. Algor. Frost.
G. 192. Ardor. Hitze.
† G. 193. Cephalalgia. Drückender Kopfschmerz.
† G. 194. Cephalaea. Periodischer langwieriger, spannender Kopfschmerz.
† G. 195. Hemicrania. Migräne.
† G. 199. Dysphagia. Beschwerliches Schlingen.
† G. 201. Cardiogmus. Herzdrücken.
G. 205. Hepatalgia. Leberschmerz.
G. 206. Splenalgia. Milzschmerz.
G. 207. Nephralgia. Nierenschmerz.
† G. 208. Dystocia. Geburtswehen.
G. 209. Hysteralgia. Schmerz in der Gebärmutter.
G. 214. Proctalgia. Schmerz im Hintern.
G. 215. Pudendagra. Schmerz der Zeugungstheile.

G. 216. Vertigo. Schwindel.

† G. 225. Antipathia. Antipathie.

G. 227. Panophobia. Heftiges Auffahren und Erschrecken im Schlafe.

† G. 230. Tarantismus. Tarantelltanz.

G. 238. Agrypnia. Mangel des Schlafs.

† G. 244. Melaena. Schwarze Krankheit.

G. 257. Tenesmus. Stuhlzwang.

† G. 266. Pyuria. Abgang einer eitrigten Materie durch den Urin.

† G. 267. Leucorrhoea ex vitio locali. Weißer fluß aus einem Localfehler.

G. 270. Galactirrhoea. Ausfluß der Milch.

G. 271. Otorrhoea. Ausfluß aus dem Ohr.

G. 272. Flatulentia. Abgang von Blähungen.

G. 273. Aedopsophia. Abgang von Winden aus der Harnröhre und Mutterscheide.

G. 274. Dysodia. Stinkender Athem.

G. 278. Aridura. Schwinden eines Theils.

G. 284. Grauiditas. Schwangerschaft.

† G. 286. Physocephalus. Windgeschwulst des Kopfes.

G. 297. Leontiasis. Borsten oder hornartige Warzen auf der Haut.

† G. 398. Malis. Geschwüre von Insecten.

† G. 307. Melasicterus. Schwarzgelbe Sucht.

G. 308. Phoenigmus. Röthe der Haut ohne Flecken.

G. 310. Phthiriasis. Läusesucht.

G. 311. Alopecia. Ausfallen der Haare.

† G. 313. Elcosis. Chronische Geschwüre mit Beinfäule und schleichendem Fieber.

† G. 315. Necrosis. Trockner kalter Brand.

Ver-

Verzeichniß der Arten des Systems von Sauvages, die in dem Cullenschen System nicht unter den generischen oder Gattungsnahmen von Sauvages, sondern an einem andern Orte vorkommen.

Die Seitenzahl ist ausgelassen, weil solche in dem Register dieser Ausgabe angegeben ist.

A.

Amaurosis a myosi.
Amaurosis a synchysi.
Amblyopia hydrophthalmica.
Amphimerina anginosa.
Amphimerina biliosa.
Amphimerina cardiaca.
Amphimerina catarrhalis.
Amphimerina epiala.
Amphimerina hemitritaeus.
Amphimerina humorosa.
Amphimerina hungarica.
Amphimerina paludosa.
Amphimerina peripneumonica.
Amphimerina phricodes.
Amphimerina pseudohemitritaeus.
Amphimerina semiquartana.
Amphimerina semiquintana.
Amphimerina spasmodica.
Amphimerina syncopalis.
Amphimerina tussiculosa.
Angina spasmodica.

Aphonia paralytica.
Arthritis rheumatica.
Ascites flatulento-peritonaeus.
Ascites sanguineo-vterinus.
Ascites vterinus.
Asphyxia a carbone.
Asphyxia congelatorum.
Asphyxia flatulenta.
Asphyxia foricariorum.
Asphyxia a fumis.
Asphyxia hysterica.
Asphyxia immersorum,
Asphyxia a mephitide.
Asphyxia a musto.
Asphyxia a pathemate.
Asphyxia sideratorum.
Asphyxia spinalis.
Asphyxia suspensorum.
Asthenia ab hydrocephalo.
Asthma catarrhale.
Asthma febricosum.
Asthma a gibbo.
Asthma metallicum.
Asthma pneumodes.
Asthma a polypo cordis.
Asthma puluerulentorum.
Atrophia febrisequa.
Atrophia infantilis.
Atrophia rachitica.

C.

Cardialgia inflammatoria.
Cardialgia sputatoria.
Catarrhus Bellinsulanus.
Cephalaea febricosa.
Cephalalgia catarrhalis.

Cephalalgia inflammatoria.
Cephalalgia intermittens.
Cholera ſicca auriginoſa.
Conuulſio indica.
Conuulſio a nerui punctura.
Conuulſio raphania.
Conuulſio ab vſtilagine.

D.

Diarrhoea carnoſa.
Dyſenteria a catharticis.
Dyſenteria a meſenterii vomica.
Dyſenteria pariſiaca.
Dyſenteria ſcorbutica.

E.

Eclampſia febricoſa.
Eclampſia typhodes.
Enteritis meſenterica.
Ephemera britannica.
Ephemera dichomene.
Ephemera ſudatoria.
Epilepſia febricoſa.
Eryſipelas ambuſtio.
Eryſipelas ſymptomaticum.
Eryſipelas a veſpis.

H.

Hepatalgia apoſtematoſa.
Herpes zoſter.
Hydrometra ouarii.
Hyſteralgia febricoſa.
Hyſteria febricoſa.

I.

Iſchias ex abſceſſu.
Iſchias intermittens.

L.

Lumbago apoſtematoſa.

Lumbago ab arthrocace.
Lumbago psoadica.

M.

Menorrhagia difficilis.
Miliaris nautica.
Miliaris purpurata.
Miliaris sudatoria.
Mutitas a glossolysi.

N.

Nephralgia arenosa.
Nephralgia arthritica.
Nephralgia calculosa.
Nephralgia febricosa.
Nephralgia purulenta.
Nephralgia rheumatica.

O.

Ophthalmia febricosa.
Orthopnoea hysterica.
Orthopnoea spasmodica.

P.

Phrenitis apyreta.
Phrenitis inanitorum.
Pleuritis hepatica.
Pleuritis periodica.
Pleuritis splenica.
Pleurodyne parapleuritis.
Pleurodyne verminosa.
Pleurodyne vomica.
Psydracia a vespis.
Pyuria arthritica.
Pyuria mucosa.
Pyuria viscida.

Q.

Quotidiana deceptiua.
Quotidiana epileptica.
Quotidiana soporosa.

S.

Scarlatina anginoſa.
Scelotyrbe feſtinans.
Scelotyrbe verminoſa.
Scrophula meſenterica.
Splenalgia ſuppuratoria.
Synocha catarrhalis.
Synocha dyſenteriodes.
Synocha miliaris.
Synochus hiemalis.
Synochus pleuritica.
Synochus rheumatizans.
Synochus ſcorbutica.

T.

Tabes dorſalis.
Tabes a hydrope.
Tabes nutricum.
Tabes a ſanguifluxu.
Tabes ſudatoria.
Tabes ſyphilitica.
Tetanus febricoſus.

V.

Variola lymphatica.

Krankheitsgattungen aus dem Linneischen System, die nicht in dem Cullenschen System befindlich sind.

Die mit † bezeichneten sind solche, von denen Cullen gestehet, daß er sie vielleicht mit hätte einrücken sollen.

† G. 40. Cephalalgia. Ein schwehrer drückender Kopfschmerz.
† G. 41. Hemicrania. Migraine.
† G. 46. Angina. Halsschmerz mit Erstickung.
G. 49. Gastrica. Magenschmerz.
G. 51. Hepatica. Leberschmerz.
G. 52. Splenica. Milzschmerz.
G. 53. Pleuritica. Seitenstechen.
G. 54. Pneumonia. Lungensucht mit Engbrüstigkeit, Husten, Blutspeyen.
G. 55. Hysteralgia. Schmerz in der Gebärmutter.
G. 56. Nephralgia. Nierenschmerz.
G. 57. Pudendagra. Schmerz der Zeugungstheile.
G. 59. Proctica. Schmerz im Hintern.
G. 61. Ostocopus. Knochenschmerz oder Schmerz der Gelenke von der leidenden innern Beinhaut.
G. 63. Volatica. Herumziehende Schmerzen in den Gefäßen.
G. 64. Pruritus. Jucken.
G. 65. Delirium. Phantasiren im Fieber.
G. 74. Vertigo. Schwindel.
† G. 84. Tarantismus. Heftiges Verlangen zum Tanzen, oft von dem Stich eines Insectes.

G. 85.

G. 85. Rabies. Wuth Personen zu beissen und zu zerreissen die unschuldig sind. Oft vom Biß eines vierfüßigen Thieres.

G. 87. Cacositia. Abscheu gegen die Speise.

† G. 88. Antipathia. Antipathie. Abscheu gegen einen gewissen Gegenstand.

G. 89. Anxietas. Widerwillen gegen alle irrdische Dinge.

G. 90. Lassitudo. Müdigkeit.

G. 91. Languor. Mattigkeit.

G. 92. Asthenia. Schwäche.

G. 96. Somnolentia. Allzustarke Neigung zum Schlaf.

G. 105. Stupor. Einschlafen eines Gliedes.

G. 121. Spasmus. Plötzliche Verdrehung eines Gliedes.

G. 122. Priapismus. Spastische Steiffigkeit des männlichen Gliedes.

G. 123. Borborygmus. Murren der Gedärme.

G. 135. Sardiasis. Sardonisches Lachen: spastische Verdrehung des Mundes.

G. 130. Agrypnia. Mangel des Schlafs.

G. 133. Orgasmus. Zucken der Schlagadern.

G. 134. Subsultus. Zucken der Flechsen.

G. 135. Carpologia. Unwillkührliches Zusammenziehen der Finger.

G. 136. Stridor. Knirschen mit den Zähnen.

G. 137. Hippos. Blinkern mit den Augenliedern.

† G. 140. Beriberi. Zittern der Theile, Steiffigkeit der Kniee, Betäubung derselben und Heischerkeit.

G. 141. Rigor. Periodisches Schaudern der Glieder mit Frost.

G. 147. Vociferatio. Heftiges Schreyen.

G. 148. Risus. Lachen.
G. 148. Fletus. Weinen.
G. 150. Suspirium. Seufzen.
G. 151. Oscitatio. Gähnen.
G. 152. Pandiculatio. Dehnen.
G. 153. Singultus. Schlucken.
G. 154. Sternutatio. Niesen.
G. 156. Stertor. Schnarchen.
G. 157. Anhelatio. Keichen. Aengstliches Athemhohlen.
G. 158. Suffocatio. Ersticƙung.
† G. 164. Aglutitio. Verhinderung des Schlingens.
G. 169. Dyslochia. Unterdrückung der Kindbettreinigung.
† G. 170. Aglactatio. Mangel der Milch.
G. 172. Otorrhoea. Eitriger Ausfluß aus dem Ohr.
G. 177. Ptyalismus. Speichelfluß.
G. 178. Screatus. Räuspern.
G. 182. Ructus. Aufstoßen von Blähungen.
G. 194. Tenesmus. Stuhlzwang.
G. 185. Crepitus. Abgang von Blähungen.
G. 196. Stranguria. Harnzwang.
† G. 204. Parturitio. Entbindung.
G. 206. Mola. Abgang eines sogenannten Mondkalbes.
G. 207. Galactia. Ausfluß der Milch.
G. 221. Grauiditas. Schwangerschaft.
G. 222. Cachexia. Oedematöse Geschwulst des Körpers mit Schwachheit und Niedergeschlagenheit.
G. 226. Plethora. Rothe Farbe des Körpers von Ausdehnung der Blutgefäße, mit beschwerlichem Athemhohlen.
G. 227. Aridura. Verrenkung eines Gliedes.

G. 230.

G. 230. Oedema. Wäßriche Geschwulst.
G. 238. Ruptura. Zerreissung einer Flechse.
G. 239. Contusura. Quetschung.
G. 245. Morsura. Giftiger Biß eines Thieres.
G. 247. Excoriatura. Wundwerden. Abstoßen der Haut.
G. 249. Rhagas. Trocknes Aufspringen der Haut.
† G. 258. Cocyta. Giftiges Thier das in einen Theil eingedrungen ist.
G. 291. Pressura. Entzündung eines Fingers, wobey der Nagel abgehet.
G. 262. Arctura. Einwachsung des Nagels.
G. 267. Lippitudo. Schwären des Randes der Augenlieder.
G. 268. Serpigo. Trockne Schwinde.
G. 280. Myrmecium. Feuchte rohe Warze.
G. 281. Eschara. Borke.
† G. 287. Anchylosis. Weisse Geschwulst des Kniees.
G. 289. Natta. Sackgeschwulst in den Muskeln.
G. 294. Condyloma. Erschlaffung und Hervorragung der innern Haut eines Theils.
G. 296. Pterygium. Fell über das Auge.
G. 297. Ectropium. Einkehrung des untern Augenliedes.
G. 296. Clitorismus. Hervorragung und Geschwulst des weiblichen Kitzlers.
G. 301. Gibber. Buckel.
G. 302. Lordosis. Krümmung der Knochen.
† G. 303. Distortio. Biegung der Knochen auf die Seite.
G. 304. Tortura. Verzerrung des Mundes.
G. 306. Lagophtalmia. Offenstehendes Auge von Verkürzung des Augenliedes.

G. 307. Nyctalopia. Nächtliches Sehen.
G. 310. Labarium. Wackeln der Zähne.
G. 311. Lagostoma. Hasenscharte.
G. 312. Apella. Verkürzung der Vorhaut.
G. 313. Atreta. Verschliesung einer natürlichen Oefnung des Körpers.
G. 315. Hirsuties. Rauchheit des Körpers von Haaren.
† G. 316. Alopecia. Ausfallen der Haare.
G. 317. Trichiasis. Verdrehung und Einwärtskehren der Augenwinpern.
G. 318. Cicatrix. Narbe.
G. 319. Naeuus. Muttermahl.
G. 320. Morphaea. Breite weisse eingedrückte Flecke.
G. 321. Vibex. Blutstriemen.
G. 322. Sudamen. Rothe glatte den Flöhstichen ähnliche Flecke, die bald wieder vergehen.
G. 323. Melasma. Blaue Flecke auf einem durch die Kleider bedeckten Theil.
G. 324. Hepatizon. Graue, rauhe, juckende Flecke.
G. 325. Lentigo. Leberflecke.
G. 326. Ephelis. Sommersprossen.

Ver-

Verzeichniß der Krankheitsgattungen des Vogelschen Systems, die in dem Cullenschen nicht vorkommen.

Die mit † bezeichneten sind solche, von denen Cullen selbst gestehet, daß er sie vielleicht hätte einrücken sollen.

G. 11. Menstrua. Fieber, das alle Monate zur Zeit des Auflusses der Hämorrhoiden, oder um die Zeit der Reinigung wiederkömmt.

G. 17. Amatoria. Ein Fieber das nur einige Stunden dauert, mit große Hitze anfängt und aus einem heftigen Verlangen nach dem Beyschlaf entstehet.

G. 19. Epiala. Fieber mit vielem Frost.

G. 20. Causos. Brennendes Fieber mit großem Durste, trockner und schwarzer Zunge.

G. 21. Elodes. Schwitzfieber.

G. 24. Leipyria. Fieber wobey die äuserlichen Theile kalt sind, die innern aber viel Wärme haben und der Puls klein und schwach ist.

G. 25. Phricodes. Fieber wobey oft Frost und Schaudern darzwischen kömmt.

G. 26. Lyngodes. Fieber mit Schlucken.

G. 27. Assodes. Fieber mit vieler Unruhe und Eckel.

G. 29. Syncopalis. Fieber mit öftern Ohmachten.

G. 31. Oscitans. Fieber mit beständigem Gähnen.

G. 32. Ictericodes. Gelbes Fieber. (Vielleicht Cull. 5, 2.)

G. 43. Pemphingodes. Fieber wobey Pusteln im Munde entstehen.

G. 48. Otites. Entzündung des innern Ohres.

† G. 63. Myocoilites. Entzündung der Bauchmuskeln.

G. 64. Pancreatica. Entzündung der großen Magendrüse.

G. 70. Panaritia. Anhaltendes Fieber bey dem Nagelgeschwür. (Vielleicht Cullen 7. 1.)

G. 71. Cyssotis. Entzündung des Hintern mit Schmerz und Stuhlzwang. (Vielleicht Cull. 7. 1.)

G. 72. Apoplectica. Fieber bey dem Schlagfluß.

G. 73. Catarrhalis. Desgleichen bey den Catarrhen.

G. 74. Rheumatica. Anhaltendes tägliches Fieber bey dem Rhevmatismus.

G. 75. Haemorrhoidalis. Fieber bey der Ausleerung der Hämorrhoiden.

G. 76. Lactea. Milchfieber.

G. 77. Vulneraria. Wundfieber.

G. 78. Suppuratoria. Eiterungsfieber.

G. 83. Haemoptoe. Blutspeyen aus dem Hals und Munde.

G. 86. Odontirrhoea. Bluten aus der Zahnhöhle nach einem ausgerissenen Zahn.

G. 87. Otorrhoea. Bluten aus dem Ohr.

G. 88. Ophthalmorrhagia. Bluten aus den Augen, Augenwinkeln oder Augenliedern.

G. 91. Catarrhexis. Abgang von reinem Blute aus dem Hintern.

† G. 94. Stymatosis. Blutfluß aus dem männlichen Gliede, auser dem Abgang des Urins.

G. 95. Haematopedesis. Blutiger Schweiß.

G. 102. Otoplatos. Ausfluß einer übelriechenden Feuchtigkeit hinter den Ohren.

G. 106. Puorrhoea. Abgang von einem reinen Eiter aus dem Hintern.

G. 116. Puoturia. Eitriger Abgang durch den Urin.

† G. 119. Leucorrhoea. Weißer Fluß aus einem Localfehler.

G. 120. Exoneirosis. Nächtliche Befleckung. (Cullen 120. 4.)

G. 122. Galactia. Abgang von Milch aus der Brust.
G. 123. Hypercatharsis. Heftiges Purgieren von einem Purgiermittel.
G. 124. Ecphyse. Abgang von Blähungen aus der Harnröhre oder Gebährmutter.
G. 125. Dysodia. Stinkender Schweiß oder übler Geruch des ganzen Körpers
G. 131. Dyslochia. Verminderung oder Verstopfung der Kindbettreinigung.
G. 132. Deuteria. Zurückhaltung der Nachgeburt.
G. 133. Agalaxis. Mangel der Milch.
G. 134. Anxietas. Aengstlichkeit.
G. 135. Blestrismus. Starkes und anhaltendes Herumwerfen des Körpers.
G. 136. Pruritus. Jucken.
G. 137. Catapsyxis. Schmerzhafte Empfindung einer Kälte in einem muskulösen Theil oder der Haut.
† G. 140. Cephalalgia. Kurzer Kopfschmerz.
† G. 141. Cephalaea. Chronischer Kopfschmerz.
G. 142. Clauus. Kopfschmerz auf dem Scheitel mit der Empfindung einer Kälte.
† G. 143. Hemicrania. Migraine.
G. 144. Carebaria. Beschwerliche Empfindung einer Schwehre im Kopfe.
G. 146. Haemodia. Stumpfheit der Zähne mit Schmerz.
† G. 147. Odaxismus. Schmerz im Zahnfleisch bey dem Zahnen.
† G. 149. Acataposis. Schwehres Hinterschlingen.
G. 150. Cionis. Schmerzhafte Geschwulst des Zapfens.
G. 151. Himantosis. Verlängerung des Zapfens. (Siehe Cullen G. 141.)
† G. 152. Cardiogmus. Herzensangst mit Empfindung einer Schwäche und Herzklopfen.

G. 155. Periadynia. Magenschmerz.

G. 161. Eilema. Ein festsitzender Schmerz in Gedärmen.

G. 163. Stranguria. Harnzwang.

† G. 165. Lithiasis. Steinbeschwehrden.

G. 166. Tenesmus. Stuhlzwang.

G. 168. Cedma. Schmerz in Zeugungstheilen.

G. 169. Hysteralgia. Schmerz im Unterleibe, der den Geburtswehen ähnlich ist.

† G. 171. Dystocia. Beschwerliche Entbindung.

G. 172. Atocia. Sehr schwehre Entbindung, die ohne Hülfe des Geburtshelfers nicht vollendet werden kann.

G. 173. Priapismus. Schmerzhafte Steifigkeit des männlichen Gliedes ohne Neigung zum Beyschlaf.

G. 174. Psoriasis. Verhärtung der Haut des Hodensackes mit starkem Jucken, womit zuweilen eine Erulceration verknüpft ist.

G. 176. Osteocopus. Festsitzender Knochenschmerz.

G. 177. Psophus. Knacken der Glieder.

G. 179. Epiphlogisma. Brennender Schmerz eines Theils, als wenn eine glühende Kohle da wäre. Pyrosis heißt er, wenn er im Ohr befindlich ist.

G. 185. Frigus. Kälte der äusern Glieder.

G. 186. Horror. Frost des Körpers mit Zittern, Schaudern.

G. 187. Rigor. Ein noch stärkerer Frost und Schaudern mit einem Zähnklappen, und der Empfindung einer Kälte in den innern Theilen.

† G. 193. Tarantismus. Taranteltanz.

G. 194. Crampus. Krampf in Händen und Beinen.

G. 196. Angone. Plötzliche Zusamziehung der Kehle ohne vorhandene Entzündung. Die convulsivische Bräune und hysterische Erstickung sind Arten davon.

G. 197. Glossocele. Plötzlich entstandenes Herausstrecken der Zunge.
G. 198. Glossocoma. Plötzlich entstandenes Zurückziehen derselben.
G. 199. Hippos. Beständiges und angebohrnes Herumdrehen der Augen.
G. 200. Illosis. Plötzlich entstandenes Herumdrehen der Augen.
G. 201. Cinclesis. Beständiges Blinkern der Augen.
G. 202. Cataclasis. Plötzlich entstandene spastische Verschliessung des einen Auges.
G. 203. Cillosis. Beständiges Zittern der obern Augenwimpern.
G. 204. Sternutatio. Niesen.
G. 206. Clamor. Schreyen.
G. 207. Trismus. Zähnklappen.
G. 209. Sardiasis oder Spasmus cynicus. Krampfigte Verdrehung der Gesichtsmuskeln und des Mundes.
G. 210. Gelasmus oder Risus sardonius. Sardonisches oder convulsivisches Lachen.
G. 212. Singultus. Schlucken.
G. 215. Ructus. Aufstoßen.
G. 216. Ruminatio. Wiederkäuen.
† G. 217. Oesophagismus oder Spasmus oesophagi. Krampf in der Speiseröhre.
G. 220. Phlogosis oder Aestus volaticus. Fliegende Hitze.
G. 222. Lassitudo. Müdigkeit.
G. 223. Asthenia. Mattigkeit und Schwäche.
G. 224. Torpor. Verminderung der Empfindung und Bewegung in einem fleischichten Theile.
G. 225. Adynamia. Gänzliches Unvermögen eines Patienten sich im Bette zu bewegen oder aufzurichten.

G. 233. Somnolentia. Schläfrigkeit.

G. 234. Hypophasis. Das halbe Aufstehen der Augen im Schlaf.

G. 235. Ptosis. Unvermögen das oberste Augenlied aufzuheben.

G. 243. Nyctalopia. Nächtliches Sehen.

G. 244. Hemeralopia. Mangel des Sehens in der Nacht.

G. 245. Hemalopia. Wenn man die Gegenstände nur halb siehet.

G. 262. Suspirium. Seufzen.

G. 263. Oscitatio. Gähnen.

G. 264. Pandiculatio. Gähnen mit einem Dehnen der Glieder.

G. 265. Apnoea. Ein so schwehres Athemhohlen, daß es scheint, als wenn solches ganz fehlte.

G. 266. Macropnoea. Athemhohlen, welches nur selten und in großen Zwischenräumen geschiehet.

† G. 270. Pnigma oder Catarrhus suffocatiuus. Steckfluß.

G. 271. Renchus oder Stertor. Schnarchen durch die Nase.

G. 272. Rhochmos oder Rhonchus. Schnarchen im Halse.

G. 280. Anatrope. Mangel des Appetits mit Eckel.

† G. 282. Acyisis. Unfruchtbarkeit bey Weibern.

G. 284. Anodynia. Mangel des Schmerzes.

† G. 285. Antipathia. Antipathie.

G. 286. Agrypnia. Mangel des Schlafs.

G. 289. Haemalopia. Wo alle Gegenstände roth erscheinen.

G. 293. Vertigo. Schwindel.

G. 294. Apogeusia. Widernatürlicher Geschmack im Munde.

G. 302. Bombus. Murren der Gedärme.
G. 303. Celsa. Empfindung eines Dunstes unter der Haut, oder als wenn Ameisen darunter liefen.
G. 304. Cachexia. Cacherie.
†G. 307. Melanchlorus. Schwarzgelbe Sucht.
G. 315. Hydrocystis. Sack-Wassersucht.
G. 324. Phthiriasis. Läusesucht.
G. 326. Paracyisis. Eine wegen ihrer Dauer oder der widernatürlichen Lage der Frucht auserhalb der Gebärmutter, widernatürliche Schwangerschaft.
G. 329. Athymia. Heftige Niedergeschlagenheit und Verzweiflung.
G. 334. Ecplexis. Wenn man wegen einer plötzlichen äuserlichen Ursache ganz auser sich wird.
G. 335. Enthusiasmus. Enthusiastische Gemüthsbewegung bey gottesdienstlichen Handlungen u. s. w.
G. 342. Blepharotis. Entzündung der Augenlieder. (Cullen 7. 1.)
G. 346. Onychia. Entzündung am Finger von eingewachsenem Nagel.
G. 355. Onyx. Eitersammlung zwischen den Lagen der Hornhaut.
G. 356. Hypopyon. Eitersammlung im Auge.
G. 359. Phygetlon. Eine kleine nicht sehr entzündete Geschwulst der Drüsen.
G. 360. Ecthymata. Hervorragungen, die geschwind auf der Haut entstehen, roth sind und plötzlich vergehen.
G. 363. Epulis. Geschwulst des Zahnfleisches, die nicht entzündet ist.
†G. 364. Anchylops. Entzündete und vereiternde Geschwulst im innern Augenwinkel.
G. 365. Paraglossa. Geschwollne Zunge.
G. 366. Chilon. Geschwollne und entzündete Lippen.

G. 369. Bronchocele. Geschwulst der Schilddrüse.
G. 371. Gongrona. Geschwulst des Halses.
G. 372. Sparganosis. Geschwulst der Brüste bey Säugenden von der Menge der Milch.
G. 373. Coilima. Plötzliche Geschwulst des Unterleibes von Blähungen.
G. 377. Polypus. Fleisch-Geschwulst in der Nase.
G. 380. Ranula oder Batrachus. Bälgleins-Geschwulst unter der Zunge.
G. 382. Oedema. Wässrige Geschwulst.
G. 383. Encephalocele. Gehirnbruch. (Cull. 140. 8.)
G. 385. Hydrophthalmia. Geschwulst des ganzen Auges. (Cull. 141. 1.)
G. 387. Hydromphalus. Wassergeschwulst am Nabel.
G. 405. Cyrtoma. Geschwulst eines einzelnen Theiles am Unterleibe von Blähungen.
G. 409. Cirsocele. Geschwulst der Schlag- und zurückführenden Adern des Saamenstranges.
G. 414. Hygrocirsocele. Varicöse und wässrigte Geschwulst der Gefäße des Hodens (und Saamenstranges).
G. 415. Sarcocele. Fleischbruch.
G. 416. Physocele. Geschwulst von Winden die einen Bruch vorstellt.
G. 421. Staphyloma. Hervorragung der verdunkelten Hornhaut
G. 424. Tophus. Gichtknoten.
G. 425. Flemen. Geschwulst um die Knöchel.
G. 430. Encanthis. Geschwulst der Thränencarunkel.
G. 431. Pladarosis. Weiche fungöse Geschwulst inwendig an Augenliede.
G. 432. Pinnula. Kleine Excrescenz an der Hornhaut.
G. 433. Pterygium. Häutige Excrescenz auf dem Weißen am Auge.

G. 453.

G. 435. Grando. Harte Geschwulst am obern Augenliede.

G. 438. Ephelis. Rauhigkeit und Härte von schlimmer Farbe im Gesichte.

G. 438. Esoche. Kleine Geschwulst inwendig im Hintern.

G. 440. Exoche. Desgleichen auswendig am Hintern.

G. 441. Epinyctis. Kleine Pustel mit heftiger Entzündung und Schmerz.

G. 445. Aquula. Pustel oder kleine Speckgeschwulst am Augenliede.

G. 446. Hydroa. Boa. Sudamina. Schwitzblätterchen.

G. 450. Encauma. Phlyzacion. Pustel vom Verbrennen.

G. 454. Scarlatae. Rothe Flecke, die grösser als die Masern sind, mit gelben Knötgen, bey einem hitzigen Fieber.

G. 455. Lentigo. Leberflecke.

G. 457. Stigma. Rother Fleck.

G. 458. Vibex. Striemen.

G. 459. Vitiligo. Rauher, garstiger um sich fressender Hautfleck, der weiß (Alphos) oder schwarz (Melas) ist.

G. 460. Leuce. Weisser Fleck der vorhergehenden Gattung, wobey die Haare weiß und wolligt sind.

G. 461. Cyasma. Braune Flecke bey Schwangern im Gesicht oder an Händen.

G. 462. Lichen. Impetigo. Röthlicher, rauher, trockner Hautfleck, der sehr juckt.

G. 463. Seline. Weisse Flecke auf den Nägeln.

G. 464. Nebula. Weisser Fleck auf der Hornhaut.

G. 466. Ruptura. Zerreissung eines innerlichen Theiles mit Blutstürzung.

G. 467. Rhagas. Trocknes Aufspringen der Haut.
G. 471. Thlasis. Eindruck der Hirnschaale ohne Bruch.
G. 473. Subluxatio. Wenn ein Knochen von dem andern in etwas getrennt wird.
G. 474. Diachalasis. Trennung einer Knochennath.
G. 475. Attritio. Ecthlimma. Zerreissung der Oberhaut und Haut von einem äuserlichen Druck.
G. 476. Porrigo. Pityriasis. Auflösung der Haut in kleinen abfallenden Schuppen.
G. 477. Aposyrma. Abschaben und Zerreissung der Haut.
G. 478. Anapleusis. Abblätterung der Knochen.
G. 479. Spasma. Zertrennung oder Auflösung des Zusammenhangs der Flechsen oder Ligamente, ohne Zerreissung, wodurch das Glied eine schmerzhafte Beweglichkeit erhält.
G. 480. Contusio. Quetschung.
G. 481. Diabrosis. Zerfressung der Haut von einer Schärfe.
G. 482. Agomphiasis. Wackeln der Zähne.
G. 483. Eschara. Borke.
G. 484. Piptonychia. Abfallen des Nagels.
G. 496. Fauus. Cerion. Geschwür mit vielen kleinen Löchern, woraus eine honigartige Materie dringt.
G. 498. Argemon. Exulceration der Hornhaut.
G. 499. Aegilops. Ein Anchilops (s. oben N. 364) der sich in ein Geschwür verwandelt hat.
G. 503. Rhacosis. Exulceration des erschlafften Hodensacks.
G. 504. Anchyloblepharon. Verwachsung der Augenlieder.
G. 506. Dacryoma. Verwachsung der Thränenpunkte.

G. 507. Ancyloglossum. Verwachsung der Zunge.
† G. 508. Ancylosis. Steifigkeit der Gelenke.
G. 509. Cicatrix. Narbe. Leucoma. Narbe auf der Hornhaut.
G. 510. Dactylion. Verwachsung der Finger.
G. 511. Phoxos. Spitziger Kopf.
G. 512. Gibber. Buckel.
G. 513. Caput obstipum. Schiefer Hals.
G. 516. Lagophthalmus. Offenstehendes Auge, weil das obere Augenlied nicht genug herabsteigt.
G. 517. Trichiasis. Einwärts gewachsene Augenhaare.
G. 518. Ectropium. Auswärtsgekehrtes unteres Augenlied.
G. 519. Entropium. Einwärtsgekehrtes unteres Augenlied.
G. 520. Rhoeas. Mangel der Thränencarunkel, wodurch ein Thränen des Auges entstehet.
G. 521. Rhyssemata. Runzeln bey alten Leuten.
G. 522. Lagocheilos. Labium leporinum. Haasenscharte.
G. 523. Malacosteon. Weichwerden der Knochen.
G. 524. Hirsuties. Widernatürliche Entstehung der Haare an einem gewissen Theil.
G. 525. Canities. Frühzeitiges Grauwerden.
G. 526. Distrix. Zu große Dünne der Haare.
G. 527. Xirasia. Wenn die Haare gleichsam wie mit Staub auf ihrer Oberfläche bedecket sind.
G. 528. Phalacrotis. Ausfallen der Haare vor der Zeit, bey der Schwindsucht oder nach einer starken Krankheit.
† G. 529. Alopecia. Ausfallen der Haare, wornach eine Glatze zurückbleibt.
G. 530. Madarosis. Ausfallen der Augenwimpern.

G. 531. Ptilosis. Eben dergleichen mit einer callösen Verhärtung der Augenlieder.

G. 532. Rodatio. Abkürzung der Augenwimpern.

G. 533. Phalangosis. Doppelte oder dreyfache Reihe der Augenwimpern.

G. 534. Coloboma. Mangel eines kleinen Stücks an einem Theile des Körpers.

G. 535. Cercosis. Allzulanger Kitzler an der weiblichen Schaam.

G. 536. Cholosis. Hinken, wenn das Bein zu lang oder zu kurz wird.

G. 537. Gryposis. Krümmung der Nägel.

G. 538. Naeuus. Muttermahl.

G. 539. Monstrositas. Widernatürliche Bildung. Monstrosität.

G. 541. Ischnotis. Auserordentliche Dünnheit und Magerkeit des Körpers.

G. 542. Rhichnosis. Zusammenschrumpeln der Haut mit Abnahme des Körpers.

G. 543. Varus. Krumme einwärts gebogne Beine.

G. 544. Valgus. Krumme nach außen zu gebogne Beine.

G. 545. Leiopodes. Plancus. Plantus. Plattfüßig.

G. 546. Apella. Allzukurze Vorhaut.

G. 547. Hypospadiaeos. Wo die Eichel unterwärts durchbohrt ist.

G. 548. Vrorhoeas. Wo der Urin durch eine in dem Mittelfleisch entstandene Oefnung der Harnröhre herausfließt.

G. 549. Atreta. Verschließung der Zeugungstheile oder des Hintern.

G. 550. Saniodes. Wo die Brusthöhle platt zusammengedruckt ist.

G. 551. Cripsorchis. Wo einer oder beyde Hoden in der Bauchhöhle liegen.

G. 552. Hermaphroditus. Sogenannte Zwitter.

G. 553. Dionysiscus. Wo zwey knochigte Hervorragung, wie Hörner an den Schläfen sind.

G. 554. Artetiscus. Mangel eines Gliedes.

G. 555. Nefrendis. Einer, dem die Zähne mangeln.

G. 556. Spanopogon. Einer, bey dem der Bart sehr dünn ist.

G. 558. Galiancon. Einer der einen kurzen Arm hat.

G. 559. Galbulus. Einer der eine angebohrne gelbe Farbe hat.

G. 560. Mola. Eine fleischichte Masse, die aus der Gebährmutter ausgeführt wird. Mondkalb.

Krank-

Krankheitsgattungen aus dem Sagarschen System, die in dem Cullenschen fehlen.

Die mit † bezeichneten sind solche, von denen Cullen selbst erinnert, daß er sie vielleicht mit hätte anführen sollen.

G. 1. Leucoma. Flecke der Hornhaut.
G. 2. Vitiligo. Eingedruckte Flecke auf der Haut.
G. 3. Ephelis. Sommersprossen.
G. 4. Naeuus. Muttermahl.
G. 14. Psydracia. Rothe Flecke der Haut ohne Fieber.
G. 15. Hydroa. Schwitzblätterchen.
G. 17. Oedema. Wässrichte Geschulst.
G. 29. Condyloma. Fleischichte Excrescenz auf der Haut, die fester als Fleisch und weicher als Knochen und nicht elastisch ist.
G. 31. Pterygium. Haut im Augenwinkel.
G. 33. Trachelophyma. Excrescenz vorne am Hals, die kein Eiter enthält und nicht inflammatorisch ist.
G. 39. Staphyloma. Verdunklung und Verdickung der Hornhaut, wegen einer zwischen ihre Lagen ergossenen Feuchtigkeit.
G. 69. Atretismus. Verwachsung der natürlichen Oefnungen.
G. 70. Anchylomerisma. Zusammenwachsung von Theilen, die sonst von einander getrennt sind.
G. 71. Dialysis. Trennung von Theilen, die im gesunden Zustand ganz vereinigt sind.
G. 72. Polymerisma. Ueberflüssige Anzahl der Theile.
G. 72. ed. prior. Lagostoma. Hasenscharte.

G. 73. ed. prior. Apella. Zu kurze Vorhaut oder Kürze eines andern weichen Theiles.
G. 74. Defectus. Mangel von gewissen Theilen des Körpers.
G. 76. Asymetria. Mangel des Verhältnisses der Theile.
G. 77. Lordosis. Krümmung der langen Knochen. oder der äußern Theile des Körpers.
G. 75. ed. prior. Epidosis. Allzustarkes Wachsthum weicher an dem Körper anhängender Theile.
G. 79. Gibbositas. Buckel.
G. 80. Error loci. Wenn gewisse Theile an ungewöhnlichen Orten sind.
G. 81. ed. prior. Hirsuties. Allzulange Haare, oder wenn die Haare an ungewöhnlichen Theilen des Körpers zum Vorschein kommen.
G. 83. Contusio. Quetschung.
G. 84. Ruptura. Zerreissung von Ligamenten, Flechsen. u. s. w.
G. 85. Operatio. Chirurgische Operation.
G. 87. Sutura. Blutige Naht.
G. 88. Paracentesis. Bauchstich.
G. 93. Eschara. Borke.
G. 96. Rhagas. Trocknes Aufspringen der Haut.
G. 97. Ambustio. Verbrennen.
G. 99. Fissura. Knochenspalte.
G. 103. Haematoporia. Abzehrung aus Mangel des Blutes.
G. 104. Aridura. Schwinden eines Gliedes.
G. 105. Plethora. Geschwulst des ganzen Körpers aus Ueberfluß von gutem Blute.
G. 111. Grauiditas. Schwangerschaft.
† G. 113. Physocephalus. Windgeschwulst des Kopfes.
G. 119. Meteorismus. Auftreten des Unterleibes von Blähungen.

G. 123. Leontiasis. Wenn Borsten oder hornartige Papillen die Haut verumstalten.

† G. 124. Malis. Geschwüre, die Würmer und Insecten enthalten.

† G. 133. Melasicteros. Schwarzgelbe Sucht.

G. 134. Phoenigmus. Rothe Farbe der Haut ohne Fieber.

G. 136. Pthiriasis. Läusesucht.

† G. 138. Alopecia. Ausfallen der Haare.

† G. 139. Elcosis. Häufige Geschwüre mit Beinfäule.

† G. 141. Necrosis. Trockner Brand.

G. 143. Osteocopus. Knochenschmerz.

G. 146. Anxietas. Aengstigkeit.

G. 147. Lassitudo. Müdigkeit.

G. 148. Stupor. Stumpfwerden, Verlust der Empfindung und Schwäche eines Gliedes.

G. 149. Pruritus. Jucken.

G. 150. Algor. Starker Frost.

G. 151. Ardor. Starke Hitze.

† G. 152. Cephalalgia. Bald vorübergehender Kopfschmerz.

† G. 153. Cephalaea. Lang dauernder Kopfschmerz.

† G. 154. Hemicrania. Migraine.

† G. 159. Cardiogmos. Schmerz des Herzens mit Herzklopfen.

G. 163. Hepatalgia. Leberschmerz.

G. 164. Splenalgia. Milzschmerz.

G. 165. Nephralgia. Nierenschmerz.

G. 166. Hysteralgia. Schmerz der Gebärmutter.

G. 172. Pudendagra. Schmerz der Zeugungstheile.

† G. 184. Melaena. Schwarze Krankheit.

G. 192. Tenesmus. Stuhlzwang.

G. 193. Proctorrhoea. Schleimhämorrhoiden.

G. 198. Ptyalismus. Speichelfluß.

S. 201. Pyuria. Abgang des Eiters durch den Urin.
S. 203. Lochiorrhoea. Allzustarker Abgang der Kindbetterreinigung.
S. 205. Galactirrhoea. Ausfluß der Milch.
S. 206. Otorrhoea. Ausfluß aus dem Ohr.
S. 208. Aedopſophia. Abgang von Blähungen aus der Harnröhre und Mutterscheide.
S. 209. Dyſodia. Stinkender Schweiß, Athem u. ſ. w.
S. 210. Adiapneuſtia. Unterdrückung der Ausdünſtung.
S. 211. Sterilitas. Unfruchtbarkeit.
S. 214. Aglactatio. Mangel der Milch.
S. 215. Dyſlochia. Mangel der Kindbettreinigung.
S. 216. Dyſphagia. Verhindertes Schlingen.
S. 217. Angina. Verhindertes Athemhohlen ohne Entzündung.
S. 218. Dysmenorrhoea. Unterdrückte monatliche Reinigung.
S. 219. Dyſtocia. Schwehre Geburt.
S. 220. Dyſhaemorrhois. Unterdrückung der Hämorrhoiden.
S. 226. Crampus. Krampf eines Muſkels.
S. 227. Priapiſmus. Schmerzhafte Steiſigkeit des männlichen Gliedes.
S. 230. Nyſtagmus. Convulſiviſche Bewegung der Augen, Augenlieder. u. ſ. w.
S. 231. Carphologia. Convulſiviſche Bewegung der Hände. Flockenleſen.
S. 232. Subſultus. Zucken der Flechſen.
S. 233. Pandiculatio. Dehnen mit Gähnen.
S. 234. ed. prior. Apomyttoſis. Schaudern und Schütteln der Haut, mit einer dergleichen Bewegung des Körpers.
S. 238. Claudicatio. Hinken.

G. 239. Phricasmus. Spastischer Frost und Erschütterung der Haut.

G. 244. Beriberia. Siehe oben Sauvages 43.

G. 246. Sternutatio. Niesen.

G. 247. Oscedo. Gähnen.

G. 248. Singultus. Schlucken.

G. 249. Stertor. Schnarchen.

G. 259. Caligo. Verminderung oder Verlust des Gesichts wegen eines dunklen Hindernisses vor oder hinter der Pupille.

G. 278. Asthenia. Allmählig entstehende Schwäche des ganzen Körpers.

G. 297. Essera. Rothe Farbe auf der Haut, ohne Erhebung, und Geschwulst und Fieber, die plötzlich kömmt und verschwindet. Porcellaine.

G. 326. Iudicatoria. Hitziges Fieber, das bis zum vierten oder oder siebenten Tag dauert, und wobey sich bald eine Crisis findet. Ephemera.

G. 317. Humoraria. Stärkeres hitziges Fieber bis zum vierzehnten Tag. Synocha der anderen Schriftsteller.

G. 318. Frigeraria. Starkes hitziges Fieber, das bis zum ein und zwanzigsten Tag dauert. Febris putrida anderer Schriftsteller.

G. 328. Vertigo. Schwindel.

G. 337. Antipathia. Antipathie. Grosser Abscheu gegen verschiedene Gegenstände.

G. 339. Panophobia. Heftiges Auffahren im Schlaf.

† G. 342. Tarantismus. Taranteltanz.

G. 344. Rabies. Eine Begierde der Hunde und Wölfe zu beißen, ohne Wasserscheu.

G. 345. Paraphrosyne. Vorübergehendes Phantasiren.

G. 348. Daemonomania. Phantasiren ohne Fieber.

G. 350. Amnesia. Unvergeßlichkeit.

G. 351. Agrypnia. Gänzlicher Mangel des Schlafs.

Register

Register.

Abortio *Vogel* I. 224. II. 139.
Abortus *Linn.* II. 111. *Sagar* II. 217.
Abortus *Sauvages* I. 224. II. 71. effluxio I. 225. ſubtrimeſtris, ſubſemeſtris, octimeſtris ebend. ab vteri laxitate I. 226.
Abſceſſus *Auctorum* I. 113. *Linn.* II. 114. *Vog.* II. 163.
Abzehrung II. 78. mit Fieber I. 353. ohne Fieber ebend.
Acatapoſis *Vog.* II. 144.
Achlys *Vog.* II. 152.
Achor *Linn.* II. 117.
Achores *Vog.* II. 176.
Acrochordon *Vog.* II. 170.
Acrothymium *Vog.* II. 170.
Acyiſis *Vog.* II. 155.
Addephagia *Vog.* I. 420. II. 157.
Adiapneuſtia *Sag.* II. 222.
Adipſia *Linn.* II. 103. *Sag.* II. 235. *Sauv.* II. 51. *Vog.* II. 155.
Adynamia *Vog.* II. 151.
Adynamiae *Vog.* I. 250. 425. II. 151.
Adynamiae *Cullen* I. 268.
Aedopſophia *Sag.* II. 221. *Sauv.* II. 77.
Aegilops *Vog.* II. 177.
Aengſtlichkeit II. 58.
Aerifluxus *Sag.* II. 221. *Sauv.* II. 77.
Aeſtus volaticus *Vog.* II. 150.
Affectio hyſterica *Auct.* I. 330. tympanitica *Auct.* I. 360.
Affectus ſpaſtico-arthritici *Auct.* I. 170. ſoporoſi *Auct.* I. 250.
After, Vorfall deſſelben I. 499.
Agalaxis *Vog.* II. 143.
Ageneſia *Vog.* I. 427. 470. II. 156.
Ageuſtia *Linn.* I. 417. II. 102.

Agheustia *Cull.* I. 417. atonica et organica ebend. — *Sag.* II. 234. *Sauv.* II. 50
Agitatorii *Linn.* II. 104.
Aglactatio *Linn.* II. 108. *Sag.* II. 222.
Aglutitio *Linn.* II. 107.
Agomphiasis *Vog.* II. 175.
Agrypnia *Linn.* II. 104. *Sag.* II. 259. *Sauv.* II. 69. *Vog.* II. 156.
Algor *Sag.* II. 212. *Sauv.* II. 58.
Allotriophagia *Vog.* II. 157.
Alopecia *Linn.* II. 122. *Sag.* II. 209. *Sauv.* II. 88. *Vog.* II. 180.
Alpdrücken I. 349. II. 44.
Alphos *Vog.* II. 173.
Aluifluxus, sanguinolenti et non sanguinolenti *Sag.* II. 217. f. *Sauv.* II. 71. f.
Amatoria *Vog.* II. 130.
Amaurosis *Cull.* I. 404. f. atonica, compressionis, spasmodica et venenata ebend.
Amaurosis *Linn.* II. 102. *Sag.* II. 233. *Vog.* II. 152.
Amaurosis *Sauv.* II. 50. a synchysi, a myosi I. 402.
Amblyopia *Linn.* I. 404. II. 102. *Sag.* II. 233. *Vog.* I. 404. II. 152.
Amblyopia *Sauv.* I. 407. II. 49. absoluta I. 406. crepuscularis et dissitorum I. 407. hydrophthalmica I. 403. luscorum I. 408. meridiana I. 407. proximorum I. 408.
Ambustio *Sag.* II. 201.
Amenorrhoea *Cull.* I. 471. f. difficilis, emansionis, suppressionis ebend.
Amenorrhoea *Vog.* II. 142.
Amentia *Cull.* I. 336. acquisita, congenita et senilis. ebend.
Amentia *Linn.* I. 345. II. 98. *Sag.* II. 257. *Sauv.* II. 68. *Vog.* II. 161.
Amnesia *Sag.* II. 259. *Sauv.* I. 336. II. 69. cephalalgica, a pathemate, plethorica I. 338. senilis I. 337. a temulentia, traumatica, a venere I. 338.
Amphemerina *Linn.* II. 93.
Amphimerina *Sag.* II. 252.
Amphimerina *Sauv.* I. 83. II. 28. anginosa I. 84. 128. arthritica I. 84. biliosa I. 72. cardiaca I. 67. catarrhalis I. 84. 235. epiala I. 69. hemitritaeus I. 60.

humo-

humorosa I. 69. hungarica I. 71. latica I. 83. miliaris I. 84. mimosa I. 85. paludosa I. 72. peripneumonica I. 84. 135. phrenetica I. 85. phricodes I. 69. pseudohemitritaeus I. 60. semiquartana I. 66. 77. singultuosa I. 84. spasmodica I. 79. syncopalis I. 69. tussiculosa I. 84. 235. 310. variolosa I. 84.
Amputatio *Sag.* II. 199.
Amputatura *Sauv.* I. 505. II. 23. *Linn.* I. 505. II. 115.
Anacatharsis *Sag.* II. 220. *Sauv.* I. 234. II. 75.
Anaesthesia *Cull.* I. 418. *Linn.* II. 103. *Sag.* II. 234. *Sauv.* II. 51.
Anaphrodisia *Cull.* I. 427. *Sag.* II. 235. *Sauv.* II. 51.
Anapleusis *Vog.* II. 175.
Anasarca *Cull.* I. 365. anaemia, debilium, exanthematica, oppilata, serosa ebend,
Anasarca *Linn.* II. 112. *Sag.* II. 203. *Vog.* II. 158. *Sauv.* II. 79.
Anatrope *Vog.* II. 155.
Anchylomerisma *Sag.* II. 196.
Anchylops *Vog.* II. 164.
Anchylosis *Linn.* II. 119.
Ancyloblepharon *Vog.* II. 177.
Ancyloglossum *Vog.* II. 178.
Ancylosis *Vog.* II. 178.
Anepithymiae *Sag.* I. 425. II. 235. *Sauv.* I. 425. II. 51.
Aneurysma *Cull.* I. 473. *Linn.* II. 119. *Sag.* II. 189. *Sauv.* II. 15. *Vog.* II. 168.
Anodynia *Vog.* I. 418. II. 156.
Anoia *Vog.* II. 161.
Angina *Auct.* I. 121. f. aquosa I. 363. arthritica I. 128. externa I. 127. membranacea vel polyposa I. 126. oedematosa I. 365. pectoris I. 300.
Angina *Linn.* II. 97. *Sag.* II. 223. *Vog.* II. 134.
Angina *Sauv.* II. 46. Loweriana I. 364. spasmodica I. 289.
Angone *Vog.* II. 148.
Anhelatio *Linn.* II. 106.
Anhelationes *Sauv.* II. 44. *Sag.* II. 230.
Animi deliquium *Auct.* I. 269.
Anorexia *Cull.* I. 425. atonica et humoralis ebend.
Anorexia *Linn.* II. 103. *Sag.* II. 235. *Vog.* II. 155.

Anorexia *Sauv.* I. 272. II. 51. arthritica I. 279. biliosa I. 275. cachectarum I. 279. exhaustorum I. 273. febrilis I. 279. melancholica I. 278. mirabilis I. 278. neophytorum I. 280. paralytica I. 273. pituitosa I. 273. plethorica I. 279. a saburra I. 273. Stewartiana I. 279.
Anosmia *Cull.* I. 416. atonica et organica ebend.
Anosmia *Linn.* II. 102. *Sag.* II. 234. *Sauv.* II. 50. *Vog.* II. 153.
Ansprung I. 507. 508.
Anthrax *Auct.* I. 111. *Linn.* II. 118. *Sag.* II. 188. *Sauv.* II. 12. *Vog.* II. 163.
Antipathia *Linn.* II. 100. *Sag.* II. 256. *Sauv.* II. 66. *Vog.* II. 156.
Anxietas *Linn.* II. 100. *Sag.* II. 212. *Sauv.* II. 58. *Vog.* II. 143.
Apella *Linn.* II. 121. *Sag.* II. 197. *Vog.* II. 181.
Apepsia *Vog.* I. 272. II. 155.
Aphonia *Cull.* I. 429. atonica et gutturalis ebend.
Aphonia *Linn.* II. 103. *Sag.* II. 235. *Vog.* II. 153. *Sauv.* II. 52. paralytica *Sauv.* I. 263.
Aphtha *Cull.* I. 207. f. *Linn.* II. 92. *Sag.* II. 243. *Sauv.* II. 32.
Aphthae *Vog.* II. 177.
Aphthosa *Vog.* II. 133.
Apnoea *Vog.* II. 154.
Apocenoses *Cull.* I. 441. *Vog.* I. 441. II. 140.
Apogeusia *Vog.* II. 156.
Apogeusis *Vog.* I. 417. II. 153.
Apomyttosis *Sag.* II. 227. *Sauv.* II. 40.
Apoplectica *Vog.* II. 137.
Apoplexia *Cull.* I. 250. atrabilaria, cataleptica, hydrocephalica, mentalis, sanguinea, serosa, traumatica, venenata I. 252. f.
Apoplexia *Linn.* II. 101. *Sag.* II. 239. *Sauv.* II. 56. *Vog.* II. 151.
Apospasmata *Vog.* II. 174.
Apostema *Cull.* I. 113. *Sag.* II. 190. *Sauv.* I. 113. II. 16.
Aposyrma *Vog.* II. 175.
Appetitus deficientes *Cull.* I. 425. erronei *Cull.* I. 419.
Aquula *Vog.* II. 172.

Archo-

Archoptoma *Vog.* I. 499. II. 167.
Arctura *Linn.* II. 116.
Ardens febris *Auct.* I. 70.
Ardor *Sag.* II. 212. *Sauv.* II. 58.
Argemon *Vog.* II. 177.
Aridura *Linn.* II. 113. *Sag.* II. 203. *Sauv.* II. 78.
Artetiscus *Vog.* II. 181.
Arthritis *Linn.* II. 98. *Sag.* II. 211. *Vog.* II. 143.
Arthritis *Sauv.* I. 170. II. 57. aestiua I. 171. alba I 172. americana I. 173 asthmatica I. 172. bahamensis I. 173. chlorotica I. 172. febricosa I. 76. febrisequa I. 76. hiemalis I. 172. melancholica I. 172. Podagra I. 171. rachialgica I. 171. rachitica, rheumatica, scorbutica, syphilitica I. 173.
Arthrocace *Auct.* I. 110. *Linn.* II. 116. *Sag.* II. 200. *Sauv.* I. 110. II. 25.
Arthrodynia *Cull.* I. 165.
Arthropyosis *Cull.* I. 174.
Asaphia *Vog.* I. 432. II. 153.
Ascites *Cull.* I. 369. abdominalis et saccatus I. 370. f.
Ascites *Linn.* II. 112. *Sag.* II. 204. *Vog.* II. 158.
Ascites *Sauv.* II. 81. flatulento-peritonaeus I. 362. sanguineo-vterinus I. 374. vterinus I. 374.
Asphyxia *Linn.* II. 101. *Sag.* II. 237. *Vog.* II. 155.
Asphyxia *Sauv.* I. 269. II. 54. a carbone, congelatorum I. 258. flatulenta I. 260. foricariorum, a fumis I. 258. hysterica I. 261. immersorum I. 260. a mephitide, a musto I. 257. neophytorum I. 271. a pathemate I. 258. 270. sideratorum I. 253. suspensorum I. 260. traumatica I. 271. Valsaluiana I. 270.
Assodes *Vog.* II. 131.
Asthenia *Linn.* II. 101. *Sag.* II. 236. *Vog.* II. 151. *Sauv.* II. 53. ab hydrocephalo *Sauv.* I. 256.
Asthma *Cull.* I. 301. f. exanthematicum, plethoricum, spontaneum ebend.
Asthma *Linn.* II. 107. *Sag.* II. 231. *Vog.* II. 154.
Asthma *Sauv.* I. 305. II. 46. catarrhale I. 305. febricosum I. 309. a gibbo I. 307. metallicum I. 307. pituitosum, pneumodes, pneumonicum I. 305. a polypo cordis I. 308. pulueruléntorum I. 307. — infantum *Auct.* I. 125.
Asymetria *Sag.* II. 196.

Atecnia *Linn.* I. 427. II. 103.
Atheroma *Linn.* I. 480. II. 119. *Vog.* II. 169.
Athymia *Vog.* I. 340. II. 160.
Atocia *Vog.* II. 146.
Atonia *Linn.* I. 263. II. 103.
Atreta *Linn.* II. 121. *Vog.* II. 181.
Atretismus *Sag.* II. 196.
Atrophia *Cull.* I. 355. f. cacochymica, debilium, famelicorum, inanitorum ebend.
Atrophia *Linn.* II. 111. *Sag.* II. 202. *Vog.* II. 158.
Atrophia *Sauv.* II. 78. febrisequa, infantilis, rachitica I. 355.
Attritio *Vog.* II. 175.
Aufschwellen des Unterleibes I. 375.
Aufschwellungen II. 78.
Aufstoßen II. 72.
Augenentzündung I. 114.
Augenschmerz II. 59.
Aurigo *Sag.* II. 208. *Sauv.* I. 391. II. 86. accidentalis I. 393. calculosa I. 391. febricosa, febrilis I. 393, hepatica I. 392. hysterica I. 391. indica I. 393. neophytorum, ab obstructione, plethorica, purulenta I. 392. rachialgica, typhodes I. 393. a venenis I. 392.
Ausleerungen, widernatürliche II. 70.
Ausfallen der Haare II. 88.
Ausschlagsfieber II. 30.
Aussatz I. 387. II. 85. der Araber I. 387. der Griechen I. 389. II. 85.

B.

Bacchia *Linn.* I. 110. II. 117. *Sag.* II. 186.
Balbuties *Vog.* II. 153.
Batrachus *Vog.* II. 165.
Battarismus *Vog.* I. 435. II. 154.
Bauchdarmbruch I. 485.
Bauchfell, Entzündung I. 145.
Bauchnetzbruch I. 489.
Bauchwassersucht I. 369. II. 81.
Bauerwetzel I. 127.
Begayement I. 435.
Beriberi *Linn.* II. 105.
Beriberia *Sag.* II. 229. *Sauv.* II. 43.

Blähungen

Blähungen II. 77.
Blaesitas *Vog.* I. 435. II. 153.
Blasenbruch I. 491. II. 20.
Blasenentzündung II. 34.
Blasenfieber I. 204. II. 31.
Blattern I. 184. II. 30.
Bleichsucht I. 281. II. 87.
Blennorrhagia *Swediar* I. 449.
Blennorrhoea *Swed.* I. 448.
Blepharoptosis *Sag.* II. 191. *Sauv.* I. 496. II. 17. ectropium, entropium, genuina, lagophthalmus I. 497.
Blepharotis *Vog.* II. 162.
Blessure I. 225.
Blestrismus *Vog.* II. 143.
Bleykolik I. 312. 315.
Blödsinnigkeit I. 336. II. 68.
Blüthgen II. 9.
Blutbrechen I. 229. II. 71.
Blutharnen I. 230. II. 71.
Bluthusten I. 213. II. 70.
Blutschlagfluß I. 252.
Blutschwär I. 109. II. 11.
Blutspeyen I. 213. II. 70.
Blutspucken aus dem Munde I. 228.
Blutstürzung mit Fieber I. 210. ohne Fieber I. 441. aus der Gebärmutter I. 223.
Blutweinen I. 445.
Boa *Vog.* II. 172.
Böser Kopf I. 508.
Bombus *Vog.* II. 157.
Borborygmus *Linn.* II. 103.
Borke II. 24.
Bourgeons I. 110. II. 9.
Boutons I. 110. II. 9.
Bräune, bösartige I. 200. häutige I. 123. Brust- I. 300.
Brand, heißer I. 114. kalter I. 114. II. 88. trockner II. 88.
Branks I. 127.
Brausen im Ohr I. 415.
Brautraube I. 509.
Bronchocele *Sauv.* II. 14. *Vog.* II. 164.
Brüche I. 484. II. 16.

Brüste, Schmerzen in solchen II. 62.
Brustbräune I. 300.
Brustcatarrh I. 234. epidemischer I. 235.
Brustentzündung I. 129.
Brustfellentzündung I. 135,
Brustgeschwür I. 141.
Brustschmerz II. 47.
Brustwassersucht I. 367. 369. II. 48.
Bubo *Cull.* I. 477. *Linn.* II. 118. *Sag.* II. 188. *Sauv.* II. 11.
Bubon *Vog.* II. 164.
Bubonocele *Auct.* I. 484. *Sag.* II. 193. *Vog.* II. 167.
Buckel II. 14.
Bulimia *Cull.* I. 419. f. emetica, helluonum, symptomatica, syncopalis ebend.
Bulimia *Linn.* II. 99. *Sag.* II. 255. *Sauv.* II. 66.
Bulimus *Vog.* I. 420. II. 157.
Bullosa *Vog.* II. 133.
Buphthalmia *Auct.* I. 495.
Buphthalmus *Auct.* ebend.

C.

Cachexia *Linn.* II. 112. *Vog.* II. 157. — icterica I. 391 vterina I. 224.
Cachexiae *Cull.* I. 353. *Sag.* II. 202. *Sauv.* II. 78. *Vog* II. 157.
— anomalae et icteritiae *Sag.* II. 202. 209. *Sauv.* II. 86. f.
Cacoethes *Linn.* I. 506. II. 115. *Vog.* I. 506. II. 176.
Cacophonia *Sag.* I. 432. II. 235.
Cacositia *Linn.* II. 100.
Caligo *Cull.* I. 399. f. corneae, humorum, lentis, palpebrarum, pupillae ebend.
Caligo *Sag.* II. 233. *Sauv.* II. 49. *Vog.* II. 156.
Callus *Vog.* I. 480. II. 170.
Cambuca Paracelsi I. 477.
Camp-fever I. 72.
Cancer *Cull.* I. 476. *Sag.* II. 188. *Sauv.* II. 12. *Vog.* II. 165.
Canities *Vog.* II. 179.
Capistrum *Vog.* I. 288. II. 149.
Caput obstipum *Vog.* I. 439. II. 178.

Carbo

Carbo *Auct.* I. 111.
Carbunculus *Auct.* I. 111. II. 12.
Carcinoma *Linn.* I. 507. II. 115. *Sag.* II. 206. *Sauv.* II. 83. *Vog.* I. 507. II. 176.
Cardialgia *Linn.* II. 97. *Sag.* II. 213. *Vog.* II. 145.
Cardialgia *Sauv.* I. 273. II. 60. arthritica I. 279. bradypepta I. 274. a cardiogmo, febricosa I. 279. flatulenta I. 274. hypochondriaca I. 278. inflammatoria I. 148. 277. lactantium, paralytica, a saburra I. 274. scirrhosa I. 275. sputatoria I. 277. 311. a veneno I. 275. verminosa I. 276.
Cardiogmus *Sag.* II. 213. *Sauv.* II. 60. *Vog.* II. 144.
Carditis *Cull.* I. 143. *Sag.* II. 245. *Sauv.* II. 35. *Vog.* II. 135.
Carebaria *Vog.* II. 144.
Caries *Cull.* I. 510. *Linn.* II. 116. *Sag.* II. 200. *Sauv.* II. 24. *Vog.* II. 176.
Carphologia *Sag.* II. 226. *Sauv.* II. 40.
Carpologia *Linn.* II. 104.
Carus *Linn.* II. 101. *Sag.* II. 238. *Vog.* II. 152.
Carus *Sauv.* I. 251. II. 56. arthriticus I. 262. exanthematicus I. 261. febricosus I. 260. febrilis I. 260. a frigore I. 258. ab hydrocephalo I. 255. hypochondriacus I. 261. hystericus I. 261. ab insolatione I. 258. ischuriosus I. 262. a narcoticis I. 257. nystagmus I. 261. a pathemate I. 258. a plumbagine I. 257. spontaneus I. 252. traumaticus I. 257. variolosus I. 261. verminosus I. 262.
Casus palpebrae I. 496.
Cataclasis *Vog.* II. 149.
Catalepsis *Linn.* II. 104. *Sag.* II. 237. *Vog.* II. 151.
Catalepsis *Sauv.* I. 251. 259. II. 54. delirans, a fumo, hysterica, melancholica, a menostasia I. 259. quartanaria I. 260. verminosa I. 259.
Cataphora *Linn.* II. 101. *Sag.* II. 238. *Vog.* II. 152.
Cataphora *Sauv.* I. 251. II. 55. arthritica I. 262. coma I. 253. exanthematica I. 261. hydrocephalica I. 255. scorbutica I. 262. somnolentia I. 255. timor I. 260.
Catapsyxis *Vog.* II. 143.
Cataracta *Linn.* I. 400. II. 102. *Sag.* II. 233. *Vog.* II. 152.
Cataracta *Sauv.* I. 400. II. 49. antiglaucoma, glaucoma, membranacea, secundaria, vera I. 400. f.

Catar-

Catarrhalis *Vog.* II. 137.
Catarrhexis *Vog.* II. 139.
Catarrhus *Cull.* I. 233. a contagio, a frigore I. 234. f.
Catarrhus *Sag.* II. 211. *Vog.* II. 140. suffocatiuus *Vog.* II. 154.
Catarrhus *Sauv.* II. 58. Bellinsulanus I. 127. — vesicae *Auct.* I 469.
Catoche *Vog.* II. 151.
Catochus *Linn.* II. 104. *Sag.* II. 226.
Catochus *Sauv.* I. 285. II. 39. ceruinus I. 286. diurnus, I. 287. holotonicus I. 286.
Causos, Hippocratis I. 70. *Vog.* II. 130.
Cedma *Vog.* II. 146.
Celsa *Vog.* II. 157.
Cephalaea *Sag.* II. 212. *Vog.* II. 144. *Sauv.* II. 59. febricosa *Sauv.* I. 82.
Cephalalgia *Linn.* II. 96. *Sag.* II. 212. *Vog.* II. 143.
Cephalalgia *Sauv.* II. 59. catarrhalis I. 235. inflammatoria I. 119. intermittens I. 81.
Cephalitis *Auct.* I. 118. *Sag.* II. 247.
Cephalitis *Sauv.* I. 118. II. 35. aegyptiaca, cerebelli, epidemica I. 120. Littriana, Siriasis, spontanea I. 119. traumatica I. 121. verminosa I. 120.
Cercosis *Vog.* II. 180.
Cerion *Vog.* II. 177.
Charbon pestilentiel I. 183.
Chemosis *Vog.* I. 114. II. 134.
Chiken pox I. 187.
Chilon *Vog.* II. 164.
Chlorosis *Cull.* I. 281. *Linn.* II. 112. *Sag.* II. 208. *Sauv.* II. 87. *Vog.* II. 157.
Cholera *Cull.* I. 320. accidentalis et spontanea ebend. — *Linn.* II. 109. *Sag.* II. 218. *Sauv.* II. 73. *Vog.* II. 141. — sicca auriginosa I. 317.
Cholerica *Linn.* I. 321. II. 109. *Vog.* II. 131.
Cholosis *Vog.* II. 180.
Chorea *Cull.* I. 291. *Linn.* II. 104. *Vog.* II. 148.
Chorea S. Viti *Sag.* II. 229.
Chute de l'oeil I. 495. de la paupiere superieure I. 496.
Chylaria *Vog.* II. 141.
Cicatrix *Linn.* II. 122. *Vog.* II. 178.
Cillosis *Vog.* II. 149.

Cincle-

Cinclesis *Vog.* II. 149.
Cionis *Vog.* II. 144.
Cirsocele I. 474. *Vog.* II. 168.
Citta *Linn.* I. 422. II. 99.
Clamor *Vog.* II. 149.
Clangor *Vog.* I. 432. II. 153.
Claudicatio *Sag.* II. 227. *Sauv.* II. 41.
Clauus *Cull.* I. 479. *Linn.* II. 118. *Vog.* II. 144. 170.
Clitorismus *Linn.* II. 120.
Clonici generales *Sauv* II. 42. partiales *Sauv.* II. 39.
Clunesia *Vog.* I. 111. II. 146.
Cocyta *Linn.* II. 116.
Coeliaca *Linn.* II. 109. *Sag.* II. 219. *Vog.* II. 140.
Coeliaca *Sauv.* I. 321. II. 73. chylosa, lactea, mucosa, purulenta I. 322. 323.
Coilima *Vog.* II. 165.
Colica *Cull.* I. 311. f. accidentalis I. 316. calculosa, callosa, meconialis I. 317. pictonum I. 314. spasmodica I. 312. stercorea I. 316. symptomatica I. 318.
Colica *Linn.* II. 97. *Sag.* II. 214. *Sauv.* II. 61. *Vog.* II. 145.
Coloboma *Vog.* II. 180.
Colpocele *Sag.* I. 501. II. 194.
Colpoptosis *Sag.* II. 192.
Coma *Vog.* I. 251. II. 152.
Comata *Cull.* I. 250. *Sag.* II. 237. *Sauv.* II. 54.
Combustio *Auct.* I. 112.
Combustura *Linn.* I. 112. II. 115.
Comitatae febres I. 60. 66.
Compositae febres ex acuta periodo I. 57.
Concretiones *Vog.* II. 177.
Condyloma *Linn.* II. 120. *Sag.* II. 189. *Sauv.* II. 13. *Vog.* II. 165.
Constrictorii *Linn.* II. 107.
Continentes febres *Auct.* I. 57. 86.
Continuae *Cull.* I. 86. *Sauv* II. 26. simplices et compositae *Vog* I. 56. II. 129. f.
Contractura *Cull.* I. 439. f. articularis et primaria ebend.
Contractura *Linn.* II. 120. *Sag.* II. 225. *Sauv.* II. 39.
Contusio *Sag.* II. 198. *Sauv.* II. 22. *Vog.* II. 175.
Contusura *Linn.* II. 114.

Conuulſio *Cull.* I. 290. *Linn.* II. 105. *Sag.* II. 227. *Vog.* II. 148.
Conuulſio *Sauv.* II. 41. indica I. 286. a nerui punctura I. 289. raphania, ſolonienſis, ab vſtilagine I. 293. — vteri ſiue abortus I. 224.
Cophoſis *Linn.* II. 102. *Sag.* II. 234.
Cophoſis *Sauv.* I. 411. II. 50. a comate I. 413. congenita I. 412. critica I. 413. a meatu obſtructo I. 412. ſeroſa, a ſteatomate I. 413. ſyphilitica, a tuba, a tympano I. 412.
Coryza *Linn.* II. 108. *Sag.* II. 220. *Vog.* II. 140.
Coryza *Sauv.* I. 234. II. 75. catarrhalis I. 235. febricoſa I. 235. phlegmatorrhagia I. 235. purulenta, virulenta, varioloſa I. 242.
Crampus *Sag.* II. 225. *Sauv.* II. 39. *Vog.* II. 148.
Crepitus *Linn.* II. 110.
Cripſorchis *Vog.* II. 181.
Crithe *Vog.* II. 170.
Critici *Linn.* II. 93. continentes, exacerbantes, intermittentes ebend.
Croup I. 125.
Cruſta lactea *Vog.* I. 507. II. 177.
Cyasma *Vog.* II. 173.
Cynanche *Cull.* I. 121. maligna I. 122. parotidaea I. 127. pharyngaea I. 126. tonſillaris I. 121. trachealis I. 123.
Cynanche *Linn.* II. 92. *Sag.* II. 244. *Sauv.* II. 35. — ſtridula *Auct.* I. 125.
Cynorexia *Vog.* I. 420. II. 157.
Cyrtoma *Vog.* II. 168.
Cyſſotis *Vog.* II. 137.
Cyſtides *Sag.* II. 189. *Sauv.* II. 15.
Cyſtirrhagia *Cull.* I. 232. *Vog.* II. 139.
Cyſtitis *Cull.* I. 157. *Linn.* II. 95. *Sag.* II. 247. *Sauv.* II. 34. *Vog.* II. 136.
Cyſtocele *Sauv.* I. 491. II. 20. *Vog.* I. 486. II. 167.
Cyſto-enterocele I. 486.
Cyſto-epiplocele I. 489.
Cyſto-merocele I. 492.
Cyſtoptoſis *Vog.* I. 500. II. 167.

D.

Dacryoma *Vog.* II. 178.
Dactylion *Vog.* II. 178.
Daemonia *Linn.* I. 340. II. 98.
Daemonomania *Sag.* II. 258. — *Sauv.* I. 340. 343. II. 68. a cardiogmo, fanatica, hysterica, indica, polonica, sagarum, simulata, Vampyrismus, a vermibus *Sauv.* I. 344. f.
Darmbruch I. 484. 487. II. 18.
Darm- und Blasenbruch I. 486.
Darm- und Wasserbruch I. 486.
Darmentzündung I. 150. II. 34.
Darmgicht I. 312. f. II. 73.
Darmwindsucht I. 360.
Debilitates *Sag.* II. 233. *Sauv.* II. 49.
Decimana *Vog.* II. 128.
Decolores *Linn.* II. 112.
Defectivi *Linn.* I. 269. II. 100.
Defectus *Sag.* II. 196.
Deformationes *Linn.* II. 120.
Deformes *Linn* I. 353. II. 111.
Deformitates *Sag.* II. 196.
Deformitates *Vog.* II. 178.
Dehnen II. 40.
Deliria *Sag.* II. 257. *Sauv.* I. 336. II. 68.
Delirium *Linn.* II. 98. *Vog.* II. 160. — maniacum I. 345. melancholicum I. 340.
Deuteria *Vog.* II. 143.
Diabetes *Cull.* I. 325. f. insipidus, mellitus, symptomaticus ebend. — *Linn.* II. 110. *Sag.* II. 220. *Sauv.* II. 75. *Vog.* II. 141.
Diabrosis *Vog.* II. 175.
Diachalasis *Vog.* II. 175.
Dialyses *Cull.* I. 505.
Dialysis *Sag.* II. 196.
Dialytica *Linn.* II. 114.
Diaphragmitis *Sag.* I. 136. II. 245.
Diaphthora *Vog.* I. 272. II. 155.
Diaria *Linn.* I. 91. II. 93.

Diarrhoea *Cull.* I. 321. f. biliosa, coeliaca, crapulosa, lienterica, mucosa, symptomatica ebend. — *Linn.* II. 109. *Sag.* II. 218. *Vog.* II. 140. — *Sauv.* II. 73. carnosa *Sauv.* I. 245. cholerica I. 320.
Diastasis *Sag.* II. 195. — *Sauv.* I. 502. II. 21. epiphysica, harmonica, raphica, synchondroseos, synosteochondrica, violenta I. 504.
Dicke, allzugroße I. 358.
Digitium *Linn.* II. 113. *Sag.* II. 215. *Vog.* I. 439. II. 151.
Dionysiscus *Vog.* II. 181.
Diplopia *Sag.* II. 254. — *Sauv.* I. 410. II. 64. ab ancyloblepharo, a catarrho, a contusione, a debilitate, a paralysi, pyretica, remotorum, a spasmo, a temulentia, a terrore *Sauv.* I. 410. 411.
Dissolutiones *Vog.* I. 505. II. 174.
Distorsio *Auct.* I. 503.
Distortio *Linn.* II. 121.
Distrix *Vog.* II. 179.
Diuresis *Vog.* I. 326. II. 141.
Dolor, arthriticus I. 159. 170. iliacus I. 212. otalgicus I. 110. podagricus I. 170. rheumaticus I. 159.
Dolores *Sag.* II. 211. *Sauv.* II. 57. *Vog.* II. 143.
Dolores abdominales interni *Sag.* II. 213. *Sauv.* II. 60. capitis *Sag.* II. 212. *Sauv.* II. 59. externi et artuum *Sag.* II. 214. *Sauv.* II. 62. pectoris *Sag.* II. 213. *Sauv.* II. 59. vagi *Sag.* II. 211. *Sauv.* II. 57.
Dolorosi *Linn.* II. 96. f. intrinseci et extrinseci ebend.
Doppeltsehen I. 410. II. 64.
Duplicana *Linn.* I. 59. II. 93.
Durchfall I. 321. II. 73.
Durst, allzustarker I. 421. II. 66. Mangel desselben I. 425. II. 51.
Dynaesthesiae *Cull.* I. 399. *Sag.* II. 233. *Sauv.* II. 49.
Dyscinesiae *Cull.* I. 429. *Sag.* II. 235. *Sauv.* II. 51.
Dysecoia *Cull.* I. 411. f. atonica et organica ebend. — *Sag.* II. 234. *Sauv.* II. 50. *Vog.* II. 153.
Dysenteria *Cull.* I. 243. *Linn.* II. 109. *Sag.* II. 217. *Vog.* II. 140. — *Sauv.* II. 72. a catharcticis I. 322. a mesenterii vomica I. 324. parisiaca I. 322. scorbutica I. 325.
Dyshaemorrhois *Sag.* II. 223.

Dyslochia *Linn.* II. 108. *Sag.* II. 222. *Vog.* II. 143.
Dysmenorrhoea *Linn.* II. 108. *Sag.* I. 471. II. 223. *Vog.* II. 146.
Dysodia *Sag.* II. 221. *Sauv.* II. 77. *Vog.* II. 142.
Dysopia *Cull.* I. 406. f. diſſitorum, lateralis, luminis, proximorum, tenebrarum ebend. — *Vog.* I. 416. II. 156.
Dysorexiae *Cull.* I. 419.
Dyspepſia *Cull.* I. 272. *Vog.* II. 155.
Dyspermatiſmus *Cull.* I. 469. f. apractodes, epilepticus, hypertonicus, mucoſus, nodoſus, praeputialis, refluus, ſeroſus, vrethralis ebend. — *Sauv.* II. 76.
Dysphagia *Sag.* II. 223. *Sauv.* II. 60.
Dyspnoea *Cull.* I. 304. f. aerea, aquoſa, catarrhalis, extrinſeca, pinguedinoſa, ſicca, ſymptomatica, terrea, thoracica, ebend. — *Linn.* II. 107. *Sag.* II. 231. *Sauv.* II. 46. *Vog.* II. 154.
Dyſtocia *Sag.* II. 223. *Sauv.* II. 62. *Vog.* II. 146.
Dysuria *Cull.* I. 467. f. ardens, compreſſionis, irritata, mucoſa, phlogiſtica, ſpasmodica ebend. — *Linn.* II. 98. *Sag.* II. 222. *Sauv.* II. 76. *Vog.* II. 145.

E.

Ecchymoma *Cull.* I. 474. *Sag.* II. 185. *Sauv.* II. 8. *Vog.* II. 172.
Ecchymoſis *Auct.* I. 474.
Ekel I. 273. II. 72.
Eclampſia *Sag.* II. 228. *Vog.* II. 148. — *Sauv.* I. 294. II. 42. ab Atropa I. 297. cachectica I. 295. a Cicuta, a Coriaria, a doloribus I. 297. exanthematica I. 298. febricoſa I. 62. 298. ab inanitione I. 298. ab iſchuria I. 299. hydrocephalica I. 256. 298. neophytorum I. 298. ab Oenanthe, parturientium I. 297. plethorica I. 295. a ſaburra I. 298. traumatica I. 296. typhodes I. 293. verminoſa I. 297.
Ecphyſe *Vog.* II. 142.
Ecpiesmus *Auct.* I. 495.
Ecplexis *Vog.* II. 161.
Ecſtaſis *Sag.* II. 238. *Vog.* II. 161. — *Sauv.* I. 252. II. 55. catoche, reſoluta I. 258.
Ecthlimma *Vog.* II. 175.
Ectopiae *Cull.* I. 483. *Sag.* II. 191. *Sauv.* II. 16.

Ectropium *Auct.* I. 496. *Linn.* II. 120. *Vog.* II. 179.
Ectymata *Vog.* II. 163.
Efflorescentiae *Sag.* II. 185. *Sauv.* II. 8.
Eilema *Vog.* II. 145.
Eingeweide, Entzündung derselben II. 35.
Eiterbrust I. 142. II. 48.
Eitergeschwulst I. 113. II. 16.
Elcosis *Sag.* II. 209. *Sauv.* II. 88.
Elephantia Arabum I. 388. II. 159.
Elephantiasis *Cull.* I. 387. *Sag.* II. 207. *Sauv.* II. 85. *Vog.* II. 159.
Elodes *Vog.* II. 130.
Elythrocele *Vog.* I. 485. 488. II. 167.
Emaciantes *Linn.* II. 111.
Emphysema *Linn.* II. 113. *Sag.* II. 187. *Vog.* II. 166. — *Sauv.* I. 359. II. 10. spontaneum I. 359.
Empyema *Cull.* I. 142. *Linn.* II. 107. *Sag.* II. 232. *Sauv.* II. 48. *Vog.* II. 163.
Encanthis *Vog.* II. 170.
Encauma *Vog.* II. 172.
Encausis *Vog.* I. 112. II. 145. 162.
Encephalocele *Sag.* II. 194. *Sauv.* I. 493. II. 20. *Vog.* II. 166.
Encystis *Vog.* I. 480. II. 169.
Engbrüstigkeiten II. 44. anhaltende I. 304. II. 46. krampfigte II. 44. periodische I. 301. II. 46.
Englische Krankheit I. 380. II. 83.
Enteritis *Cull.* I. 150. f. erysipelatosa, phlegmonoidea ebend. — *Linn.* II. 95. *Sag.* II. 246. — *Sauv.* II. 34. mesenterica *Sauv.* I. 146. — *Vog.* II. 135.
Enterocele *Sauv.* I. 484. II. 18.
Enterocele oualaris *Vog.* II. 167.
Entero-cystocele I. 493.
Entero-merocele I. 485.
Enteromphalus I. 485.
Enthusiasmus *Vog.* II. 161.
Entkräftungen I. 268.
Entropium *Auct.* I. 496. *Vog.* II. 179.
Entzückung II. 54.
Entzündung I. 109. der Mandeln I. 121. der Hirnhäute II. 33. rosenartige I. 111.
Entzündungsgeschwulst I. 109. II. 11.

Entzündungskrankheiten I. 107. II. 30.
Entzündungskolik I. 314.
Enuresis *Cull.* I. 447. *Linn.* II. 110. *Sag.* II. 220. *Sauv.* II. 75. *Vog.* II. 141.
Ephelis *Linn.* II. 122. *Sag.* II. 185. *Sauv.* II. 7. *Vog.* II. 171.
Ephemera I. 80. *Sauv.* I. 91. II. 26. a calore, a frigore, lactea, menstrua, a phlogosi, plethorica I. 91. 92. sudatoria I. 99.
Ephialtes *Linn.* II. 107. *Sag.* II. 230. *Sauv.* I. 349. II. 44. ex hydrocephalo, hypochondriaca, plethorica, stomachica, tertianaria, verminosa *Sauv.* I. 349. 350.
Ephidrosis *Cull.* I. 442. *Sag.* II. 219. *Sauv.* II. 74.
Epiala *Vog.* II. 130.
Epidosis *Sag.* II. 197.
Epilepsia *Cull.* I. 294. f. cerebralis, occasionalis, sympathica ebend. — *Boerhaav.* I. 284. *Linn.* II. 105. *Sag.* II. 228. *Vog.* II. 147. *Sauv.* II. 42. febricosa *Sauv.* I. 62.
Epinyctis *Sag.* II. 186. *Sauv.* II. 9. *Vog.* II. 171.
Epiphlogisma *Vog.* II. 147.
Epiphora *Cull.* I. 444. *Linn.* II. 108. *Sag.* II. 219. *Sauv.* II. 74. *Vog.* II. 140.
Epiplocele *Sauv.* I. 488. II. 18. labiorum vuluae I. 488.
Epiplo-bubonocele I. 488.
Epiplo-cystocele I. 493.
Epiplo enterocele, completa et incompleta I. 486. inguinalis I. 486. ischiatica I. 487. vaginalis I. 487.
Epiplo-enteromphalos I. 487.
Epiplo-merocele I. 488.
Epiplo-oscheocele I. 488.
Epiploitis *Sag.* II. 246. *Sauv.* I. 146. II. 34.
Epiplomphalus I. 488.
Epischeses *Cull.* I. 452. *Vog.* II. 142.
Epistaxis *Cull.* I. 211. iuniorum et senum I. 212. *Vog.* II. 138.
Episthotonus *Vog.* I. 285. II. 147.
Epulis *Vog.* II. 164.
Erbrechen I. 273. II. 73.
Ergot I. 293.
Erotomania *Linn.* I. 341. II. 100.
Errana *Linn.* I. 79. II. 93.
Erratica *Sag.* II. 253. *Sauv.* II. 29.

Erraticae febres *Auct.* I. 79. f.
Error loci *Sag.* II. 197.
Eryſipelacea *Vog.* II. 137.
Eryſipelas *Auct.* I. 111. f. pulmonis I. 144.
Eryſipelas *Cull.* I. 178. f. phlyctaenodes et veſiculoſum I. 179. 181. — *Linn.* II. 92. *Sag.* II. 242. *Vog.* II. 162. — *Sauv.* II. 31. ambuſtio, chinenſe, ſymptomaticum, a veſpis I. 112. 113.
Erythema *Auct.* I. 111. f. *Sag.* II. 187. *Sauv.* I. 111. II. 10. gangraenoſum, intertrigo, paratrima, pernio *Sauv.* I. 112.
Eſchara *Linn.* II. 118. *Sag.* II. 200. *Sauv.* II. 24. *Vog.* II. 175.
Eſoche *Vog.* II. 171.
Eſſera *Sag.* II. 242. *Sauv.* I. 203. II. 32.
Eßluſt, Mangel derſelben I. 425. II. 51.
Euacuatorii *Linn.* I. 441. II. 108. abdominis II. 109. capitis II. 108. corporis externi II. 111. genitalium II. 110. thoracis II. 108.
Exacerbantes *Linn.* I. 56. II. 93.
Exania *Sag.* II. 192. — *Sauv.* I. 499. II. 18. ex alui fluxu, a calculo, a dyſtocia, paralytica, primaria, traumatica I. 500.
Exanthemata *Cull.* I. 176. *Sag.* II. 240. contagioſa et ſporadica II. 240. 242.
Exanthemata febrilia *Auct.* I. 176.
Exanthematicae febres *Sauv.* II. 30. *Vog.* II. 132.
Exanthematici *Linn.* II. 91. contagioſi, ſolitarii, ſporadici II. 91. 92.
Exarthrema *Sag.* II. 195. — *Sauv.* I. 502. II. 21. complicatum, a conuulſione, a desmochaunoſi, a desmophlogia, diſtorſio, exoſtoſicum, luxatio ſimplex, a paralyſi, paſtaceum, ſubluxatio ſimplex, tophaceum I. 503.
Exarthroſis *Auct.* I. 502.
Excoriatio *Sag.* II. 198. *Sauv.* II. 22.
Excoriatura *Linn.* II. 115.
Excreſcentiae *Sag.* II. 188. *Sauv.* II. 12.
Exiris *Sag.* II. 191.
Exoche *Vog.* II. 171.
Exocyſte *Sauv.* I. 500. II. 18. Noeliana, Solingeniana I. 501.

Exocystis *Sag.* I. 500. II. 192.
Exomphalus *Auct.* I. 485. *Sag.* II. 190. *Sauv.* II. 16.
Exoneirosis *Vog.* I. 451. II. 142.
Exophthalmia *Sag.* II. 191. *Sauv.* I. 494. II. 17. cancrosa *Sauv.* I. 495. a chemosi, a conatibus, critica I. 496. hydropica I. 495. paralytica, a protuberantia I. 496. purulenta I. 495. a staphylomate, a strangulatu, traumatica I. 496.
Exostosis *Cull.* I. 482. *Linn.* II. 120. *Sag.* II. 89. *Sauv.* II. 4. *Vog.* II. 169.
Expectoratio *Linn.* II. 109.
Expressio oculi *Auct.* I. 495.
Extuberantiae *Vog.* II. 170.
Exulceratio *Sag.* I. 506. II. 200. *Sauv.* I. 506. II. 24.
Exulcerationes *Linn.* I. 505. II. 115. *Vog.* II. 176.

F.

Fallende Sucht I. 294.
Fatuitas *Vog.* I. 336. II. 161.
Faulfieber I 93. 96. II. 27.
Fauus *Vog.* II. 177.
Faux germe I. 225.
Febres *Cull.* I. 54. f. *Sag.* II. 250. f. *Sauv.* II. 26. *Vog.* II. 128. f.
Febriles *Linn.* I. 54. II. 91.
Febris, anginosa I. 128. aphthosa *Vog.* I. 208. ardens I. 70. biliosa I. 72. bullosa *Vog.* I. 204. caput impetens I. 61. carcerum I. 96. castrensis I. 72. 96. catarrhalis maligna I. 97. cholerica I. 72. continua composita inflammatoria I. 108. continua lymphatica I. 84. continua putrida I. 101. depuratoria I. 101. erysipelacea *Vog.* I. 179. flaua indiae orientalis I. 99. hectica pestilens I. 95. hungarica I. 96. hydrocephalica I. 256. inflammatoria I. 91. 108. lenta infantum I. 106. lenta neruosa I. 95. lactea I. 73. maligna I. 95. miliaris *Vog.* I. 195. morbillosa *Vog.* I. 189. noscomiorum I. 96. paludum I. 72. pectoralis intermittens I. 83. pestilens I. 71 95. f. pestilentialis I. 182. petechialis I. 97. f. petechizans I. 98. peticularis I. 98. pneumonica I. 130. podagrica *Vog.* I. 170. purpurata I. 195. purpurea I. 195. putrida I. 72. II. 251. putrida

trida neruosa I. 95. stomachica inflammatoria I. 147. sudatoria I. 100. variolosa *Vog.* I. 184. vrticata I. 203.
Feigwarzen II. 13.
Fell auf der Hornhaut II. 13.
Fettigkeit, allzugroße I. 358. II. 79.
Fieber I. 49. 54. f. II. 26. f.
Fieberkuchen I. 76.
Fissura *Sag.* II. 201. *Sauv.* II. 23. *Vog.* II. 174.
Fistula *Linn.* II. 116. *Sag.* II. 200. *Sauv.* II. 24. *Vog.* II. 176.
Flatulentia *Linn.* II. 107. *Sag.* II. 221. *Vog.* II. 142. — *Sauv.* I. 273. II. 77. accidentalis I. 275. acida I. 274. conuulsiua I. 278. hypochondriaca I. 278. infantilis I. 274. lochialis I. 279. nidorosa I. 274.
Flechten I. 507. II. 9.
Fleckfieber I. 209.
Fleischgeschwulst I. 478. II. 13.
Flemen *Vog.* II. 169.
Fletus *Linn.* II. 105.
Fluor albus I. 224.
Fluxus *Sag.* II. 216. *Sauv.* I. 441. II. 70.
Follette I. 235.
Fractura *Cull.* I. 510. *Linn.* II. 114. *Sag.* II. 201. *Sauv.* II. 22. *Vog.* II. 174.
Frambaesia *Cull.* I. 389. *Sag.* II. 206. *Sauv.* II. 84.
Frieselfieber I. 191. II. 31.
Frigeraria *Sag.* II. 251.
Frost II. 58.
Frostbeule I. 112.
Fungus *Vog.* I. 482. II. 169.
Furor vterinus *Vog.* II. 160.
Furunculus *Auct.* I. 109. *Sag.* II. 187. *Sauv.* I. 109. II. 11. *Vog.* II. 163.

G.

Gähnen II. 45.
Galactia *Linn.* II. 111. *Vog.* II. 142.
Galactirrhoea *Sag.* II. 221. *Sauv.* II. 77.
Galbulus *Vog.* II. 182.
Galiancon *Vog.* II. 182.
Gallenkolik I. 312.
Gallenkrankheit I. 320. II. 73.

Ganglion *Cull.* I. 480. *Linn.* II. 119. *Vog.* II. 165.
Gangraena *Cull.* I. 114. *Linn.* II. 114. *Sag.* II. 209. *Sauv.* I. 114. II. 88. *Vog.* II. 160.
Gaol-fever I. 96.
Garrotillo I. 123.
Gastrica *Linn.* II. 97.
Gastritis *Cull.* I. 147. f. *Linn.* II. 94. *Sag.* II. 246. *Sauv.* II. 33. *Vog.* II. 135.
Gastrocele *Auct.* I. 489. *Sag.* II. 192. *Sauv.* II. 18. *Vog.* II. 168.
Gastrodynia *Sag.* II. 214. — *Sauv.* I. 273. II. 61. adstringens I. 274. americana I. 276. atterens I. 275. biliosa, calculosa I. 276. chlorotica I. 278. febricosa I. 279. flatulenta I. 274. a frigore I. 275. gastrocelica I. 277. hysterica I. 278. metastatica I. 280. a perelica I. 275. periodynia I. 274. pulsatilis I. 278. saburralis I. 274. a veneno, vlcerosa I. 275. a xiphoide I. 276.
Gebärmutter, schiefe Lage derselben I. 502.
— — Vorfall I. 501.
Gebärmutterbruch I. 491. II. 19.
Gebärmutterentzündung II. 34.
Geburtswehen II. 62.
Gedächtniß, Verlust desselben I. 336.
Gefühl, Schwäche desselben I. 418. II. 51.
Gehirnbruch I. 493. II. 20.
Gehirnentzündung I. 117. II. 35.
Gehör, Schwäche desselben I. 411. 413. II. 50.
Geilheit I. 424.
Gelasmus *Vog.* II. 149.
Gelbsucht I. 390. II. 86.
Gelenkeiterung I. 174.
Gelenkwassersucht I. 481. II. 16.
Gemüthskrankheiten I. 334. f.
Gerstenkorn II. 14.
Geschmack, Schwäche II. 50.
Geschwülste I. 473. II. 10. 82.
— — kalte I. 473. II. 12.
— — wässerigte I. 263. II. 10.
— — weisse I. 481.
Geschwür I. 506. II. 23.
Geruch, Schwäche I. 416. II. 50.

 Gibber

Gibber *Linn.* II. 120. *Vog.* II. 178.
Gibbositas *Sag.* II. 197. *Sauv.* II. 14.
Gicht I. 169. II. 57.
Glaucoma *Auct.* I. 401. *Vog.* I. 403. II. 152.
Gleet I. 450.
Gliederschmerz I. 165.
Glossocele I. 498. *Vog.* II. 148.
Glossocoma *Vog.* II. 148.
Glus *Linn.* I. 469. II. 110.
Gongrona *Vog.* II. 164.
Gonorrhoea *Cull.* I. 449. f. dormientium, impura, laxorum, mucosa, pura ebend. — benigna et maligna *Auct.* ebend. — *Linn.* II. 110. *Sag.* II. 221. *Sauv.* II. 76. *Vog.* II. 141.
Grando *Vog.* II. 171.
Grauedo *Linn.* I. 234. II. 97. *Vog.* II. 142.
Grauer Staar I. 400.
Grauiditas *Linn.* II. 112. *Sag.* II. 204. *Sauv.* II. 80.
Grind I. 508. II. 86.
Grippe I. 235.
Gryposis *Vog.* II. 180.
Güldne Ader I. 219.
— — blinde II. 15.
Gürtelkrankheit I. 181,
Gutta rosea *Sauv.* I. 110. II. 8.
Gutta rosacea *Vog.* I. 110. II. 171.

H.

Haemalopia *Vog.* I. 409. II. 156.
Haematemesis *Cull.* I. 229. *Linn.* II. 109. *Sag.* II. 216. *Vog.* II. 139. — *Sauv.* II. 70. ab hirudine I. 442. traumatica I. 441.
Haematopedesis *Vog.* II. 139.
Haematoporia *Sag.* II. 202.
Haematuria *Cull.* I. 230. *Linn.* II. 110. *Sag.* II. 216. *Vog.* II. 139. — *Sauv.* II. 71. traumatica I. 441. violenta I. 442.
Haemodia *Vog.* II. 144.
Haemoptoe *Vog* I. 214. II. 138.
Haemoptysis *Cull.* I. 213. f. calculosa, phthisica, plethorica, vicaria, violenta ebend. — *Linn.* II. 109. *Sag.* II. 216.

II. 216. *Vog.* II. 138. — *Sauv.* II. 79. ab hirudine I. 442. traumatica I. 441.
Haemorrhagia *Linn.* II. 108. *Sag.* II. 216. *Vog.* I. 441. II. 138. — *Sauv.* I. 211. II. 70. in chronicis, critica, febrilis, ab hirudine, insalubris, passiua, plethorica I. 212. 213.
Haemorrhagia cerebri *Auct.* I. 251. narium I. 211. oris I. 228. vteri I. 224.
Haemorrhagiae *Cull.* I. 210. *Vog.* II. 138.
Haemorrhoidalis *Vog.* II. 137.
Hämorrhoidalkolik I. 319.
Haemorrhoides oris I. 228. vesicae I. 232.
Haemorrhois *Cull.* I. 219. f. coeca, cruenta, fluens, mucosa, procidens, tumens ebend. — *Linn.* II. 110. *Sag.* II. 217. *Sauv.* II. 72.
Hallucinationes *Sag.* II. 254. *Sauv.* I. 399. II. 64.
Halsentzündung I. 121. f. II. 35.
Harnblase, Entzündung derselben I. 157.
Harnfluß I. 325. II. 75.
Harnruhr I. 325.
Harnstrenge I. 467.
Harnzwang I. 467.
Hautfehler II. 7. 84.
Hebdomadaria I. 79.
Hectica *Cull.* I. 103. *Linn.* II. 94. *Sag.* II. 252. *Sauv.* II. 28. *Vog.* II. 138.
Heimweh I. 424. II. 66.
Heiserkeit I. 234.
Hematopia *Vog.* II. 153.
Hemeralopia *Vog.* II. 153.
Hemeropathos *Sag.* II. 186.
Hemicrania *Linn.* II. 97. *Sag.* II. 213. *Vog.* II. 144. *Sauv.* II. 59. lunatica *Sauv.* I. 80.
Hemiplegia *Linn.* II. 102. *Sag.* II. 236. *Vog.* II. 151. — *Sauv.* I. 263. II. 53. ex apoplexia, apostematodes I. 264. arthritica, exanthematica, intermittens, saturnina I. 265. scrophulosa I. 266. serosa, spasmodica I. 264. syphilitica I. 266. transuersa I. 265. traumatica I. 266.
Hemitritaea *Linn.* I. 66. II. 94.
Hemitritaeus *Auct.* I. 60. 71.
Hepatalgia *Sag.* II. 214. *Sauv.* II. 61.

Hepatica *Linn.* II. 97.
Hepatirrhoea *Sag.* II. 217. *Vog.* II. 139. *Sauv.* I. 321. II. 71. intermittens, inteſtinalis I. 323. meſenterii, ſcorbutica, vera, a vulnere I. 324.
Hepatitis *Cull.* I. 151. *Linn.* II. 95. *Sag.* II. 248. *Sauv.* II. 36. *Vog.* II. 135.
Hepatizon *Linn.* II. 122.
Hepatocele *Sauv.* I. 490. II. 19. *Vog.* II. 168.
Hermaphroditus *Vog.* II. 181.
Hernia *Cull.* I. 484. *Linn.* II. 120.
— — cerebri *Auct.* I. 493. congenita I. 487. hepatis I. 489. lienis I. 490. omenti I. 488. ouarii I. 491. veſicae vrinariae I. 492. vteri I. 491.
Herpes *Cull.* I. 507. *Linn.* II. 117. *Sag.* II. 186. *Vog.* II. 171. — *Sauv.* II. 9. collaris, eſthiomenus, exedens, miliaris, periſelis, puſtuloſus, ſerpigo, ſimplex, ſyphiliticus I. 507. zoſter I. 181. 507.
Herz, Entzündung deſſelben I. 143. II. 35.
Herzbeutel, Entzündung deſſelben I. 139. 143.
Herzdrücken II. 60.
Herzgeſpann I. 274.
Herzklopfen I. 299. II. 41.
Hidroa *Sauv.* II. 10.
Hieranoſos *Linn.* I. 290. II. 105. *Vog.* II. 148.
Hieropyr *Vog.* I. 111. II. 162.
Himantoſis *Vog.* II. 144.
Hinken II. 41.
Hinterſchlingen, beſchwerliches II. 60.
Hippos *Linn.* II. 104. *Vog.* II. 148.
Hirnwuth I. 117. II. 33.
Hirſuties *Linn.* II. 121. *Sag.* II. 197. *Vog.* II. 179.
Hitzblattern II. 10.
Hitze II. 58.
Hoden, ſpätes Herabſteigen und Zurückziehen derſelben I. 502.
Hohlgeſchwür I. 506. II. 24.
Honiggeſchwulſt I. 480. II. 16.
Hordeolum *Auct.* I. 110. *Linn.* II. 118. *Sag.* II. 189. *Sauv.* I. 110. II. 13. *Vog.* II. 170.
Hornhaut, Flecken derſelben II. 7.
Horror *Vog.* II. 147.
Hüftweh I. 160. II. 63.

Hühnerauge I. 479.
Humoraria *Sag.* II. 251.
Hunger, allzustarker I. 419. II. 66.
Husten I. 234. II. 45.
Hydarthrus *Cull.* I. 481. *Sag.* II. 190. *Sauv.* II. 16.
Hydatis *Cull.* I. 481. *Sag.* II. 190. *Sauv.* II. 15.
Hydroa *Sag.* II. 187. *Vog.* II. 172.
Hydrocele *Cull.* I. 374. *Vog.* II. 166.
Hydrocephalum *Vog.* I. 366. II. 166.
Hydrocephalus *Cull.* I. 366. *Linn.* II. 112. *Sag.* II. 204. *Sauv.* II. 80. interior I. 256. acutus I. 256.
Hydrocystis *Vog.* II. 159.
Hydro-enterocele I. 486. *Vog.* II. 168.
Hydro epiplocele I. 489.
Hydrometra *Cull.* I. 373. *Sag.* II. 205. *Sauv.* II. 81. ouarii I. 372.
Hydronosos I. 100.
Hydromphalus *Vog.* II. 166.
Hydropedesis *Vog.* I. 442. II. 142.
Hydropes partiales *Sag.* II. 204. *Sauv.* II. 80.
Hydrophobia *Cull.* I. 332. f. *Linn.* II. 100. *Sag.* II. 257. *Sauv.* II. 67. *Vog.* II. 131.
Hydrophthalmia I. 115. *Auct.* I. 495. *Vog.* II. 166.
Hydrops cerebri I. 256. scroti *Vog.* I. 375. II. 166. testium *Vog.* I. 375.
Hydrorachitis *Cull.* I. 367. *Sag.* II. 204. *Sauv.* II. 81.
Hydrothorax *Cull.* I. 367. *Sag.* II. 232. *Sauv.* II. 47. *Vog.* II. 158.
Hygrocirsocele *Vog.* II. 168.
Hyperaestheses *Vog.* I. 419. II. 156.
Hyperartetiscus *Vog.* II. 182.
Hypercatharsis *Vog.* II. 142.
Hyperostosis *Vog.* I. 482. II. 169.
Hypnobatasis *Vog.* I. 348. II. 161.
Hypochondriasis *Cull.* I. 280. *Linn.* II. 99. *Sag.* II. 255. *Sauv.* II. 65. *Vog.* II. 150.
Hypogastrocele *Vog.* I. 485. 489. II. 167. epiploico-enterica I. 487.
Hypophasis *Vog.* II. 152.
Hypopyon *Vog.* II. 163.
Hyposarca *Linn.* I. 376. II. 112.
Hypospadiaeos *Vog.* II. 181.

Hypoſtaphyle *Sag.* II. 191. *Sauv.* I. 497. II. 17. ab inflammatione I. 497. a laxitate I. 498.
Hyſteralgia *Linn.* II. 97. *Sag.* II. 214. *Vog.* II. 146. *Sauv.* II. 62. febricoſa I. 82.
Hyſteria *Cull.* I. 329. *Linn.* II. 103. *Sag.* II. 228. *Vog.* II. 150. *Sauv.* II. 42. febricoſa I. 62.
Hyſteritis *Cull.* I. 158. *Linn.* II. 96. *Vog.* II. 137.
Hyſterocele *Sauv.* I. 491. II. 19. *Vog.* II. 168.
Hyſterocyſtocele I. 493.
Hyſteroloxia *Sag.* II. 195. *Sauv.* I. 502. II. 20.
Hyſterophyſe *Vog.* I. 362. II. 159.
Hyſteroptoſis *Sag.* I. 501. II. 192. *Vog.* II. 166. *Sauv.* I. 501. II. 18. compoſita, vaginae prolapſus, vteri inuerſio, vteri prolapſus I. 501.

I.

Ictericodes *Vog.* II. 131.
Icteritiae cachexiae *Sag.* II. 208.
Icterus *Cull.* I. 390. f. calculoſus, grauidarum, hepaticus, infantum, ſpasmodicus ebend. *Linn.* II. 112. *Vog.* II. 157.
Ideales *Linn.* I. 336. II. 98.
Iliaca *Linn.* I. 312. II. 109.
Ileus *Sag.* II. 218. *Vog.* II. 145. *Sauv.* I. 312. II. 73. calculoſus I. 318. a calloſa coli ſtrictura I. 317. a colo pituita infarcto I. 313. a faecibus induratis I. 316. hernioſus I. 319. imperforatorum I. 319. indicus I. 313. inflammatorius I. 314. ab inteſtino compreſſo I. 319. phyſodes I. 312. ſpasmodicus I. 313. a veneno I. 317. verminoſus I. 318. voluulus I. 313.
Illoſis *Vog.* II. 149.
Imaginarii *Linn.* II. 99.
Impetigines *Cull.* I. 382. *Sag.* II. 207. *Sauv.* II. 84.
Impetigo *Vog.* II. 173.
Impotenz I. 427.
Incubus *Vog.* I. 349. II. 150.
Inflammatio *Auct.* I. 109. *Sag.* II. 187. *Linn.* II. 113. venoſa I. 151.
Inflammationes *Vog.* II. 161.
Inflammatoriae febres *Vog.* II. 133.
Influenza I. 235.

Insania I. 340.
Intermittentes *Auct.* I. 55. 62. *Cull.* I. 54. *Sauv.* II. 29. *Vog.* II. 128. f.
Intertrigo *Auct.* I. 112. *Linn.* II. 115. *Vog.* II. 177.
Introuersio palpebrarum I. 496.
Intumescentiae *Cull.* I. 358. adiposae I. 358. aquosae I. 363. flatuosae I. 358. solidae I. 375. — *Sag.* II. 203. *Sauv.* II. 78.
Inuersio vteri vel vaginae I. 501.
Ionthos *Vog.* II. 171.
Ischias *Sag.* II. 215. *Sauv.* I. 160. II. 62. ex abscessu I. 175. grauidarum I. 164. hystericum I. 161. intermittens I. 82. rheumaticum I. 160. sanguineum I. 160. a sparganosi I. 163. a subluxatione I. 164. syphiliticum I. 161. verminosum I. 162.
Ischiatocele *Vog.* I. 485. II. 167.
Ischiocele *Sag.* I. 485. II 194.
Ischnophonia *Vog.* I. 435. II. 154.
Ischnotis *Vog.* II. 180.
Ischuria *Cull.* I. 453. renalis I. 454. vesicalis I. 458. vreterica I. 457. vrethralis I. 463. — *Linn.* II. 108. *Sag.* II. 222. *Sauv.* II. 82. *Vog.* II. 142.
Jucken II. 58.
Iudicatoria *Sag.* II. 250.

K.

Keichhusten I. 310.
Kinnbackenkrampf I. 288. II. 38.
Knochenbrnch I. 510. II. 22.
Knochenfäule I. 510. II. 25.
Knochengeschwür I. 510. II. 25.
Knochengeschwulst I. 482. II. 14.
Knochenspaltung I. 510. II. 23.
Knochenspeckgeschwulst I. 483.
Kolik I. 311. f.
Kopfschmerz II. 59.
Krämpfe I. 284.
Krätze I. 508. II. 86.
Krampf I. 284. II. 39.
Krampfader I. 474. II. 15.
Krampfkolik I. 312.
Krebs I. 476. II. 12. 83.

Kriebelkrankheit I. 292.
Kropf II. 14.
Kupfer im Gesicht II. 8.

L.

Labarium *Linn.* II. 121.
Laceratura *Linn.* I. 505. II. 115.
Lactea febris *Vog.* II. 137.
Lähmung I. 262. f. II. 52.
Läusesucht II. 87.
Lagocheilos *Vog.* II. 179.
Lagophthalmia *Linn.* II. 121.
Lagophthalmus *Auct.* I. 496. *Vog.* II. 178.
Lagostoma *Linn.* II. 121. *Sag.* II. 197.
Lallen I. 435.
Languor *Linn.* II. 101.
Laparocele *Sag.* I. 485. II. 193.
Lassitudo *Linn.* II. 100. *Sag.* II. 212. *Sauv.* II. 58. *Vog.* II. 151.
Leberbruch I. 490. II. 18.
Leberentzündung I. 151. II. 36.
Leberflecke II. 7.
Leberfluß I. 321. II. 71.
Leberschmerz II. 61.
Leiopodes *Vog.* II. 181.
Leipopsychiae *Sag.* II. 236. *Sauv.* I. 269. II. 53.
Leipothymia *Linn.* II. 101. *Sag.* II. 237. *Vog.* II. 155. *Sauv.* I. 269. II. 53. a pathemate I. 270. stomachica I. 271.
Leipyria *Vog.* II. 130.
Leistenbeule II. 11.
Leistendarmbruch I. 484.
Lendenweh I. 159. II. 62.
Lenta *Linn.* I. 101. II. 93. *Vog.* II. 138.
Lentigo *Linn.* II. 122. *Vog.* II. 173.
Leontiasis *Sag.* II. 206. *Sauv.* II. 83.
Lepra *Cull.* I. 389. *Linn.* II. 117. *Sag.* II. 207. *Sauv.* II. 85. arabum et graecorum *Vog.* I. 320. II. 159.
Leptophonia *Vog.* I. 432. II. 153.
Lethargus *Linn.* II. 101. *Sag.* II. 238. *Vog.* II. 130. *Sauv.* I. 252. II. 55. arthriticus I. 262. cephaliticus I. 261. a febre I. 260. a frigore I. 258. literatorum I. 255. a narcoticis I. 257. pulmonicus I. 261.

Leuce

Leuce *Vog.* II. 173.
Leucoma *Sag.* II. 185. *Sauv.* II. 7.
Leucophlegmatia *Linn.* II. 112. *Vog.* I. 359.
Leucorrhoea *Linn.* II. 110. *Sag.* II. 220. *Vog.* II. 141. *Sauv.* I. 224. II. 76. americana I. 226. grauidarum I. 227. indica I. 226. Nabothi I. 227.
Leucorrhois *Vog.* I. 321. II. 141.
Lichen *Vog.* II. 173.
Lienis inflammatio I. 155.
Lienteria *Linn.* II. 109. *Sag.* II. 219. *Vog.* II. 140. *Sauv.* I. 321. II. 74. aphthoſa, ſcorbutica, ſecundaria I. 325. ſpontanea I. 323. ex vlcere ventriculi I. 325.
Lipothymia ſ. *Leipothymia.*
Lippitudo *Linn.* II. 117.
Liſpeln I. 436.
Lithiaſis *Vog.* II. 145.
Locales *Cull.* I. 398.
Lochiorrhoea *Sag.* II. 221.
Lordoſis *Linn.* II. 121. *Sag.* II. 196. *Sauv.* II. 14.
Loxarthrus *Sag.* I. 504. II. 196. *Sauv.* I. 504. II. 21.
Lues venerea *Auct.* I. 385.
Luftröhrenentzündung I. 123.
Lumbago *Sag.* II. 215. *Sauv.* I. 159. II. 62. ex aneuryſmate I. 163. apoſtematoſa, ab arthrocace I. 175. febrilis I. 164. ab hydrothorace I. 163. miliaris I. 165. a niſu I. 164. partus I. 164. plethorica I. 160. pſeudo-iſchuria I. 163. pſoadica I. 175. rheumatica I. 160. a ſaburra I. 162. a ſatyriaſi I. 164. ſcorbutica I. 161. ſympathica I. 162.
Lungenentzündung I. 131. II. 132. falſche I. 133.
Lungengeſchwür, verſchloſſenes I. 141.
Lungenſucht I. 217. II. 78. ſchleimichte I. 217. 354.
Lupia *Cull.* I. 480. *Sag.* II. 190. *Sauv.* II. 16.
Luxatio *Cull.* I. 502. *Vog.* I. 502. II. 174.
Luxatura *Linn.* I. 502. II. 114.
Lyngodes *Vog.* II. 131.

M.

Macies *Sag.* II. 202. *Sauv.* II. 78.
Macropnoea *Vog.* II. 154.
Maculae *Linn.* II. 122. *Sag.* II. 185. *Sauv.* II. 7. *Vog.* II. 172.

Madarosis *Vog.* II. 180.
Magenbruch I. 489. II. 19.
Magenentzündung I. 147. II. 33.
Magenkrampf I. 273. II. 60.
Magenschmerz II. 61.
Magerkeit II. 78.
Malacia *Vog.* II. 157.
Malacosteum *Vog.* II. 179.
Malerkolik I. 314.
Malis *Sag.* II. 206. *Sauv.* II. 83.
Mal de cerf I. 286.
Malum hypochondriacum I. 280. hystericum I. 330. ischiaticum I. 160.
Mania *Cull.* I. 345. f. corporea, mentalis, obscura, symptomatica ebend. — *Linn.* II. 98. *Sag.* II. 258. *Sauv.* II. 68. *Vog.* II. 160.
Marasmus *Linn.* I. 356. f. II. 111. senilis I. 357.
Marcores *Cull.* I. 353.
Marisca *Auct.* I. 474. *Sag.* II. 190. *Sauv.* II. 15.
Marmaryge *Vog.* I. 409. II. 156.
Marsh fever I. 72.
Masern I. 188. II. 31.
Mastdarm, Vorfall desselben I. 499.
Mastodynia *Sag.* II. 215. *Sauv.* I. 110. II. 62. *Vog.* I. 110. II. 144.
Mediastina *Vog.* I. 138. II. 134.
Melaena *Sag.* II. 217. *Sauv.* II. 72.
Melanchlorus *Vog.* II. 157.
Melancholia *Cull.* I. 340. *Linn.* II. 99. *Sag.* II. 258. *Sauv.* II. 68. *Vog.* II. 160.
Melas *Vog.* II. 173.
Melasicterus *Sag.* II. 208. *Sauv.* II. 86.
Melasma *Linn.* II. 122.
Meliceris *Vog.* II. 169.
Membranaceae *Sauv.* II. 33.
Memoriae debilitas I. 336.
Menorrhagia *Cull.* I. 223. f. abortus, alba, lochialis, Nabothi, rubra, vitiorum ebend. — *Linn.* II. 110. *Sauv.* II. 71. difficilis I. 472. — *Vog.* II. 139.
Mentales *Linn.* II. 98.
Menstrua *Vog.* II. 129.

Merocele *Sag.* II. 193. *Vog.* I. 485. 488. *Vog.* II. 167.
Mesenteritis *Vog.* I. 146. II. 136.
Meteorismus *Sag.* II. 205. *Sauv.* I. 360. II. 82. abdominis, hystericus, a manzanilla, ventriculi I. 361.
Metritis *Sag.* II. 249. *Sauv.* I. 158. II. 34. lactea, puerperarum, typhodes I. 158. 159.
Metrorrhagia *Sag.* I. 224. II. 217.
Mictus cruentus *Auct.* I. 230. 232.
Milchfluß I. 321. II. 73.
Milchruhr I. 321. II. 73.
Miliaria *Cull.* I. 191. *Linn.* II. 92.
Miliaris *Sag.* II. 242. *Vog.* II. 132. *Sauv.* I. 195. II. 31. nautica, purpurata I. 96. sudatoria I. 100.
Milzbruch I. 490. II. 19.
Milzentzündung I. 155. II. 36.
Mittelfellentzündung I. 138.
Mola *Linn.* II. 111. *Vog.* II. 182.
Monatliche Reinigung, Verstopfung und Mangel derselben I. 471.
Mondsucht I. 348.
Monstrositas *Vog.* II. 180.
Morbi, febriles critici *Linn.* I. 154. II. 93. febriles phlogistici *Linn.* I. 108. II. 94. exanthematici *Linn.* I. 176. II. 91. organici *Auct.* I. 398.
Morbilli *Auct.* I. 188. f *Vog.* II. 173.
Morbillosa *Vog.* II. 132.
Morbus coxarius *Sauv.* I. 175. damnoniensis I. 315. hungaricus I. 70. hypochondriacus I. 280. Naronianus I. 73. poenalis Gerhamensium I. 499. strangulatorius I. 125.
Mordexia I. 313.
Morosis *Linn.* I. 336. II. 102.
Morositas *Vog.* II. 161.
Morositates *Sag.* I. 419. II. 255. *Sauv.* I. 419. II. 65.
Morphaea *Linn.* II. 122.
Morsura *Linn.* II. 115.
Morsus *Sag.* II. 198.
Morta *Linn.* I. 204 II. 91.
Motorii *Linn.* I. 284. II. 103.
Müdigkeit II. 58.

Mumps I. 127.
Mutitas *Cull.* I. 431. atonica, organica, surdorum ebend. *Sag.* II. 235. *Vog.* II. 153. *Sauv.* II. 52. a glossolysi I. 263. traumatica I. 430.
Mutterfluß I. 223.
Muttermähler II. 8.
Mutterscheide, Vorfall derselben I. 501.
Mutterwuth I. 424. II. 67.
Mydriasis *Vog.* I. 404. II. 152.
Myocolitis *Vog.* II. 136.
Myopia *Linn.* I. 407. II. 121.
Myopiasis *Vog.* I. 408. II. 178.
Myositis *Sag.* I. 159. II. 244.
Myrmecium *Linn.* II. 118. *Vog.* II. 170.

N.

Nabeldarmbruch I. 485.
Nabelnetzbruch I. 489.
Nachtripper I. 450.
Nachtwandern I. 348. II. 65.
Naeuus *Linn.* II. 122. *Sag.* II. 185. *Sauv.* II. 8. *Vog.* II. 180.
Nagelgeschwür I. 110. II. 12.
Nasenbluten I. 211. II. 70.
Nasengeschwür I. 507.
Natta *Linn.* II. 119.
Nausea *Linn.* II. 109. *Sag.* II. 218. *Vog.* II. 145. — *Sauv.* I. 273. II. 72. ab apostemate I. 275. biliosa I. 276. ex cacochylia I. 273. ex compresso ventriculo I. 276. ex gastritide I. 277. ex gastrocele I. 277. grauidarum I. 279. marina I. 280. nephritica I. 279. ex scirrho pancreatico I. 277. a semine corrupto I. 278.
Nebula *Vog.* II. 174.
Necrosis *Sag.* II. 210. *Sauv.* II. 88. vstilaginea I. 164.
Nefrendis *Vog.* II. 182.
Nephralgia *Sag.* II. 214. *Sauv.* II. 61. arenosa, arthritica, calculosa I. 157. febricosa I. 82. purulenta I. 157. rheumatica I. 160.
Nephritica *Linn.* II. 97.
Nephritis *Cull.* I. 156. *Linn.* II. 96. *Sag.* II. 249. *Sauv.* II. 36. *Vog.* II. 136.
Nervenfieber I. 93. II. 27.

Nervenkrankheiten I. 249.
Neruorum resolutiones I. 250.
Nesselfieber I. 202. II. 32.
Nesselsucht I. 203. II. 10.
Nestelknüpfen I. 428.
Nettle-rash I. 203.
Netzbruch I. 488. II. 18.
Netzdarmbruch I. 486.
Netzentzündung II. 34.
Netzleistenbruch I. 488.
Netzschenkelbruch I. 488.
Neuroses *Cull.* I. 249.
Nierenentzündung I. 156. II. 37.
Nierenschmerz II. 61.
Niesen II. 44.
Nirles I. 190.
Noctambulatio I. 349.
Noma *Linn.* II. 115. *Vog.* II. 176.
Nonana *Vog.* II. 128.
Nostalgia *Cull.* I. 424. complicata, simplex I. 425. *Linn.* II. 100. *Sag.* II. 256. *Sauv.* I. 341. II. 66. *Vog.* II. 160.
Nyctalopia *Hippocr.* I. 407. *Linn.* II. 121. *Vog.* II. 152.
Nymphomania *Cull.* I. 424. *Sag.* II. 257. *Sauv.* I. 424. II. 67. furibunda, furor vteri, pruriginosa, salacitas I. 424.
Nystagmus *Sag.* II. 226. *Sauv.* II. 40.

O.

Oberbein I. 480.
Obliuio *Linn.* I. 336. II. 102. *Vog.* II. 161.
Obstipatio *Cull.* I. 452. debilium, obstructorum, rigidorum ebend. *Sag.* II. 224. *Linn.* II. 107. *Vog.* II. 142.
Obstipitas *Sag.* II. 225. *Sauv.* I. 439. II. 38. annuens I. 440. catarrhalis I. 439. gibbosa, lateralis, renuens, spasmodica I. 440.
Octana *Vog.* II. 128.
Odaxismus *Vog.* II. 144.
Odontalgia *Cull.* I. 167. *Linn.* II. 97. *Sag.* II. 213. *Sauv.* II. 59. *Vog.* II. 144.
Odontirrhoea *Vog.* II. 138.
Oedema *Linn.* II. 113. *Sag.* II. 187. *Sauv.* II. 10. *Vog.* II. 165.
Oesophagismus *Vog.* II. 150.

Ohnmacht I. 269. II. 53.
Ohrendrüsengeschwulst II. 11.
Ohrenklingen I. 413. II. 65.
Ohrenschmerz I. 110. II. 59.
Ohrenzwang I. 110.
Omenti inflammatio I. 146.
Omentitis *Vog.* I. 146. II. 136.
Omphalocele *Sag.* II. 193. *Vog.* I. 485. 489. II. 167.
Oneirodynia *Cull.* I. 348. actiua, grauans I. 349.
Onychia *Vog.* II. 162.
Onyx *Vog.* II. 163.
Operatio *Sag.* II. 199.
Ophthalmia *Cull.* I. 114. membranarum I. 115. tarsi I. 116. — *Linn.* II. 97. *Sag.* II. 213. *Vog.* II. 161. *Sauv.* II. 59. febricosa I. 82.
Ophthalmites *Vog.* I. 115. II. 134.
Ophthalmoptosis *Auct.* I. 495.
Ophthalmorrhagia *Vog.* II. 138.
Opisthotonos *Vog.* I. 285. II. 147.
Opodeocele *Sag.* I. 485. II. 193.
Oreillons I. 127.
Orgasmus *Linn.* II. 104.
Orthopnoea *Linn.* II. 107. *Sag.* II. 231. *Vog.* II. 154. *Sauv.* I. 304. II. 46. ab aneurysmate I. 308. ab antipathia I. 307. a bronchocele, cardiaca I. 308. ab empyemate, febricosa I. 309. a fungis I. 307. ab hydrocephalo I. 309. ab hydropneumonia I. 306. ab hydrothorace I. 309. a lipomate I. 305. peripneumonica I. 309. a pinguedine I. 306. polyposa I. 308. pseudoperipneumonica I. 309. traumatica I. 307. scorbutica I. 309. a vaporibus I. 307. variolosa, a vermibus, vomica I. 309.
Oscedo *Sag.* II. 230. *Sauv.* II. 45.
Oscheocele *Vog.* I. 485. 488. II. 167. *Sauv.* I. 374. II. 16. aquosa, hydatidosa, malabarica I. 375.
Oscheophyma *Sag.* I. 375. II. 191.
Oscitans *Vog.* II. 131.
Oscitatio *Linn.* II. 106. *Vog.* II. 154.
Ossium recessus *Auct.* I. 504.
Osteocopus *Sag.* II. 211. *Vog.* II. 146.
Ostocopus *Linn.* II. 98. *Sauv.* II. 57.

Otalgia *Auct.* I. 110. *Linn.* II. 97. *Sag.* II. 213. *Sauv.* I. 110. II. 59. *Vog.* II. 144.
Otites *Vog.* II. 134.
Otoplatos *Vog.* II. 140.
Otopuosis *Vog.* II. 140.
Otorrhoea *Linn.* II. 108. *Sag.* II. 221. *Sauv.* II. 77. *Vog.* II. 138.
Ourles I. 127.
Oxyphonia *Vog.* I. 432. II. 153
Ozaena I. 242. *Linn.* I. 507. II. 116. *Vog.* I. 507. II. 177.

P.

Paedarthrocace *Vog.* I. 110. II. 169.
Palpitatio *Cull.* I. 299. cardiaca ebend. *Linn.* II. 104. *Sag.* II. 227. *Sauv.* II. 41. *Vog.* II. 150.
Panaritia *Vog.* II. 137.
Pancreatica *Vog.* II. 136.
Pandiculatio *Linn.* II. 106. *Sag.* II. 227. *Sauv.* II. 40. *Vog.* II. 154.
Panophobia *Linn.* II. 99. *Sag.* II. 256. *Sauv.* I. 340. II. 67. phrontis I. 341.
Papula *Auct.* I. 110. *Linn.* II. 118. *Sag.* II. 186. *Sauv.* I. 110. II. 9.
Papulae *Vog.* II. 171.
Paracenthesis *Sag.* II. 199.
Paracusis *Cull.* I. 413. imaginaria, imperfecta ebend. *Sag.* II. 234. *Sauv.* II. 50.
Paracyisis *Vog.* II. 160.
Paraglossa *Sag.* I. 498. II. 191. *Vog.* II. 164. *Sauv.* I. 498. II. 17. deglutitoria I. 498. exertoria, glossomegistus, retractoria I. 499.
Paralysis *Cull.* I. 262. f. hemiplegica, paraplegica, partialis, venenata ebend. *Linn.* II. 102. *Sag.* II. 236. *Sauv.* II. 52. *Vog.* II. 151.
Paranoiae *Vog.* I. 336. II. 160.
Paraphimosis *Vog.* I. 111. II. 162.
Paraphonia *Cull.* I. 432. f. clangens, comatosa, palatina, puberum, rauca, resonans ebend. *Sauv.* II. 52.
Paraphrenesis *Linn.* II. 94. *Sauv.* I. 136. II. 33. diaphragmatica, hepatica, pleuritica I. 139.
Paraphrenitis *Auct.* I. 119. 136. 138. *Vog.* II. 135.

Paraphrosyne *Linn.* I. 345. II. 98. *Sag.* II. 257. *Vog.* II. 160. *Sauv.* I. 347. II. 68. calentura I. 348. a Conio I. 347. critica, febricosa, hysterica I. 348. magica, ab opio I. 347. puerperarum I. 348. temulenta, a venenis I. 347.
Paraplegia *Linn.* II. 102. *Sag.* II. 236. *Vog.* I. 263. II. 151.
Paraplexia *Sauv.* I. 263. II. 53. intermittens, rachialgica I. 265. rheumatica, sanguinea, a spina bifida I. 264. syphilitica, traumatica I. 266.
Pararthrema *Auct.* I. 502.
Parasynanche *Auct.* I. 127.
Parenchymatosae *Sauv.* II. 35.
Paresis *Sag.* II. 236.
Paronychia *Linn.* II. 116. *Sag.* II. 188. *Sauv.* I. 110. II. 12. *Vog.* II. 162.
Parorchidium *Sag.* II. 195. *Sauv.* I. 502. II. 20.
Parorchido-enterocele I. 486.
Parotis *Sag.* I. 477. II. 188. *Vog.* I. 477. II. 164. *Sauv.* II. 11. benigna, febrilis I. 478.
Parulis *Vog.* I. 110. II. 164.
Parturitio *Linn.* II. 110.
Passio iliaca I. 312.
Pathetici *Linn.* I. 419. II. 99.
Pemphigodes *Vog.* II. 133.
Pemphigus *Cull.* I. 204. *Sag.* II. 240. *Sauv.* II. 30.
Periadynia *Vog.* II. 145.
Pericarditis *Vog.* I. 143. II. 135.
Perinaeocele *Sag.* I. 492. II. 194.
Peripneumonia *Auct.* I. 131. f. *Linn.* II. 95. *Sag.* II. 248. *Vog.* II. 134. *Sauv.* I. 131. II. 36. ardens, arthritica I. 135. catarrhalis I. 132. exanthematica I. 135. gastrica I. 131. hydrophobica, maligna, phthisicorum I. 135. putrida I. 134. rachialgica, typhodes I. 135.
Peripneumo-pleuritis I. 138.
Peritonaeorixis *Sag.* I. 487. II. 194.
Peritonitis *Cull.* I. 145. f. mesenterica, omentalis, propria ebend. *Vog.* II. 136.
Pernio I. 112. *Linn.* II. 116. *Vog.* II. 162.
Pertussis *Cull.* I. 310.
Pestilentialis *Vog.* II. 131.

Peſtis *Cull.* I. 182. *Linn.* II. 91. *Sag.* II. 240. *Sauv.* II. 30.
Petechia *Linn.* I. 209. II. 91.
Petechiae *Vog.* II. 173.
Petechialis *Vog.* II. 132.
Peteſchen I. 209. II. 31.
Peteſchenfieber I. 98.
Phagedaena *Vog.* I. 506. II. 176.
Phalacrotis *Vog.* II. 179.
Phalangoſis *Vog.* II. 180.
Phantaſiren II. 68.
Phantasma *Linn.* I. 408. II. 99. *Vog.* I. 408. II. 156.
Phimoſis *Linn.* II. 120. *Sag.* II. 188. *Sauv.* I. 111. II. 12. *Vog.* II. 162.
Phlegmaſiae *Cull.* I. 107.
Phlegmaſiae *Sag.* II. 244. f. *Sauv.* II. 30.
Phlegmatia *Sag.* II. 203. *Sauv.* I. 363. II. 79. cruralis I. 364. dalienſis I. 366. elephantina I. 365. grauidarum I. 364. hyſterica I. 366. lactea I. 364. malabarica I. 365. a menoſtaſia I. 364. vlceroſa I. 365. vulgaris I. 366.
Phlegmone *Cull.* I. 109. *Linn.* II. 96. *Sag.* II. 244. *Sauv.* I. 109. II. 11. *Vog.* II. 162.
Phlogiſtici *Linn.* II. 94. membranacei II. 94. muſculoſi II, 96. parenchymatici II. 95.
Phlogoſis *Cull.* I. 108. Erythema I. 111. Phlegmone I. 109. *Vog.* II. 150.
Phlyctaena *Linn.* I. 481. II. 118. *Sag.* II. 186. *Sauv.* II. 9. *Vog.* I. 481. II. 171.
Phlyzacion *Vog.* II. 172.
Phoenigmus *Sag.* II. 208. *Sauv.* II. 86. *Vog.* II. 178.
Phreneſis I. 119.
Phrenismus *Vog.* I. 118. II. 133.
Phrenitis *Cull.* I. 117. *Linn.* II. 94. *Sag.* II. 245. *Vog.* I. 101. II. 130. *Sauv.* II. 33. apyreta, inanitorum I. 347.
Phricasmus *Sag.* II. 228.
Phricodes *Vog.* II. 130.
Phthiriaſis *Sag.* II. 209. *Sauv.* II. 87. *Vog.* II. 160.
Phthiſis *Cull.* I. 217. f. incipiens, confirmata ebend. *Linn.* II. 111. *Sag.* II. 202. *Sauv.* II. 78. *Vog.* II. 158. — catarrhalis, mucoſa, pituitoſa I. 217. 354.
Phyma *Vog.* II. 163.

Phymata *Sag.* II. 187. *Sauv.* II. 10.
Physconia *Cull.* I. 375. *Sag.* II. 204. *Sauv.* II. 79. *Vog.* II. 160.
Physocele *Vog.* II. 169.
Physocephalus *Sag.* II. 204. *Sauv.* II. 80.
Physometra *Cull.* I. 362. *Sag.* II. 205. *Sauv.* II. 81.
Phygethlon *Vog.* II. 163.
Pica *Cull.* I. 422. *Sag.* II. 255. *Vog.* II. 157. *Sauv.* I. 422. II. 66. antiscorbuticorum, chlorosiantium, infantilis, malacia, voluntaria I. 422.
Pinnula *Vog.* II. 170.
Piptonychia *Vog.* II. 175.
Pituitaria *Vog.* I. 321. II. 141.
Pityriasis *Vog.* II. 175.
Pladarotis *Vog.* II. 170.
Plagae *Sag.* I. 398. 505, II. 198. *Sauv.* I. 398. 505. II. 21.
Plancus *Vog.* II. 181.
Plautus *Vog.* II. 181.
Plethora *Linn.* II. 113. *Sag.* II. 203.
Pleumonis I. 217.
Pleuripneumonia I. 138.
Pleuritica *Linn.* II. 97.
Pleuritis *Linn.* II. 94. *Sag.* II. 246 *Vog.* II. 134. *Sauv.* I. 136. II. 33. biliosa I. 139. catarrhalis I. 140. conuulsiua, dorsalis I. 138. erysipelatosa I. 140. hepatica I. 141. 154. hydrothoracica I. 138. lactea I. 140. mediastini I. 138. miliaris I. 140. periodica I. 63. pestilens I. 140. polonica I. 141. pulmonis I. 138. putrida I. 140. splenica I. 141. traumatica I. 140. vera I. 137. verminosa I. 140. — spuria *Auct.* I. 160.
Pleurocele *Sag.* II. 194.
Pleurodyne *Sag.* II. 231. *Sauv.* I. 160. II. 47. ex aneurysmate I. 163. a cacochylia I. 162. catarrhalis I. 163. febricosa I. 165. flatulenta I. 161. hysterica I. 161. miliaris I. 165. ab oesophago rupto I. 163. parapleuritis I. 139. phthisica I. 163. plethorica I. 161. rachitica I. 163. rheumatica I. 160. scorbutica, a spasmate I. 161. venerea I. 162. verminosa I. 140. 163. vomica I. 141.
Pleuro-peripneumonia I. 138.

Plica *Linn.* I. 390. II. 121. *Vog.* II. 159.
Plicatio *Vog.* II. 174.
Pneumatosis *Cull.* I. 358. f. hysterica, spontanea, thoracica, venenata ebend. *Sag.* II. 203. *Sauv.* II. 79. *Vog.* II. 145. 166.
Pneumonia *Cull.* I. 129. Peripneumonia I. 131. Pleuritis I. 135.
Pneumonica *Linn.* II. 97.
Pnigma *Vog.* II. 154.
Pocken I. 184. II. 30.
Podagra *Cull.* I. 169. f. aberrans, atonica, regularis, retrograda ebend. — *Vog.* II. 146.
Podagrica *Vog.* II. 137.
Polydipsia *Cull.* I. 421. *Linn.* II. 100. *Sag.* II. 256. *Sauv.* II. 66. *Vog.* II. 157.
Polymerisma *Sag.* II. 196.
Polypus *Vog.* I. 478. II. 165.
Polysarcia *Linn.* II. 111. *Sag.* II. 203. *Sauv.* II. 79. *Vog.* II. 180.
Porcelaine I. 203.
Porrigo *Vog.* II. 175.
Porrus *Vog.* I. 478. II. 170.
Presbytia *Linn.* I. 408. II. 121.
Pressura *Linn.* II. 116.
Priapismus *Linn.* II. 103. *Sag.* II. 226. *Sauv.* II. 39. *Vog.* II. 146.
Priuatiui *Linn.* I. 399. 425. II. 102.
Procidentia *Auct.* I. 494.
Procidentiae *Linn.* II. 120.
Proctalgia *Sag.* II. 215. *Sauv.* I. 111. II. 63.
Proctica *Linn.* II. 98.
Proctitis *Linn.* I. 111. II. 95.
Proctocele *Sauv.* I. 499.
Proctorrhoea *Sag.* II. 219.
Profluuia *Cull.* I. 233.
Profluuia *Vog.* II. 138.
Profusio *Cull.* I. 441. *Linn.* II. 114.
Prolapsus *Cull.* I. 494. *Linn.* II. 120. — ani *Auct.* I. 500. oculi I. 495. vesicae vrinariae I. 500. vteri I. 501.
Proportionatae tertianae I. 66.
Proptoma *Sag.* II. 191. *Sauv.* I. 499. II. 17. auricularum, labii inferioris, mammarum, praeputii, scroti I. 499.

Pruritus *Linn.* II. 98. *Sag.* II. 212. *Sauv.* II. 58. *Vog.* II. 143.
Psellismus *Cull.* I. 434. f. acheilos, balbutiens, emolliens, haesitans, lagastomatum, lallans, ringens ebend. *Linn.* II. 104. *Sag.* II. 235. *Sauv.* II. 52.
Psellotis *Vog.* I. 435. II. 153.
Pseudoblepsis *Cull.* I. 408. f. imaginaria, mutans ebend.
Psophos *Vog.* II. 146.
Psora *Cull.* I. 508. *Linn.* II. 117. *Vog.* II. 159.
Psoriasis *Vog.* II. 146.
Psydracia *Auct.* I. 112. *Sag.* II. 187. *Sauv.* II. 10. a vespis I. 112.
Psydracium *Vog.* II. 171.
Pterygium *Linn.* II. 120. *Sag.* II. 189. *Sauv.* II. 13. *Vog.* II. 170.
Ptilosis *Vog.* II. 180.
Ptosis *Vog.* II. 152.
Ptyalismus *Cull.* I. 446. *Linn.* II. 108. *Sag.* II. 220. *Sauv.* II. 75. *Vog.* II. 140.
Pudendagra *Linn.* II. 98. *Sag.* II. 215. *Sauv.* II. 63.
Pulsadergeschwulst I. 473. II. 15.
Punctura *Linn.* II. 115. *Sag.* II. 198. *Sauv.* I. 505. II. 22. a cuspide fracta, simplex, venenata I. 506.
Puorrhoea *Vog.* II. 140.
Puoturia *Vog.* II. 141.
Purpura *Cull.* I. 209. *Sag.* II. 240. *Sauv.* II. 31. *Vog.* II. 172. — scorbutica II. 171. vrticata I. 203.
Pustula *Linn.* I. 113. II. 118. *Sag.* II. 186. *Sauv.* I. 109. II. 9.
Pustulae *Vog.* II. 171.
Pyrexiae *Cull.* I. 49.
Pyrosis *Cull.* I. 310. *Sag.* II. 213. *Sauv.* II. 60.
Pyuria *Sag.* II. 220. *Sauv.* I. 469. II. 76. arthritica, mucosa, viscida I. 469.

Q.

Quartana *Cull.* I. 73. *Linn.* II. 93. *Sag.* II. 253. *Sauv.* II. 29. — *Vog.* II. 128. duplex, triplex II. 129. — remittens *Auct.* I. 77.
Quietales *Linn.* II. 100.
Quintana *Vog.* II. 128.
Quotidiana *Cull.* I. 80. *Linn.* II. 93. *Sag.* II. 253. *Vog.* II. 128. *Sauv.* II. 29. deceptiua I. 66. epileptica I. 62. soporosa I. 61. — phthisica *Burser.* I. 83.

R.

Rabies *Sag.* II. 257. *Linn.* II. 100.

Rachialgia *Sag.* II. 215. *Sauv.* I. 312. II. 62. ab adiapneustia I. 316. arthritica I. 318. febricosa I. 318. metallica I. 315. ab osteosarcosi I. 319. pictonum I. 315. scorbutica I. 318. traumatica I. 316.
Rachitis *Cull.* I. 380. *Linn.* II. 111. *Sag.* II. 205. *Sauv.* II. 83.
Racosis *Auct.* I. 499.
Ranula *Vog.* II. 165.
Raphania *Cull.* I. 292. *Linn.* II. 105. *Vog.* II. 148.
Raserey I. 345. II. 68.
Raucedo *Linn.* I. 234. 432. II. 105.
Raucitas *Vog.* I. 234. 432. II. 153.
Rauschen in Ohren I. 415.
Remittentes febres *Auct.* I. 55. 66. 77.
Remittentes *Sauv.* II. 28.
Renchus *Vog.* II. 155.
Retractio palpebrae I. 496.
Rhacosis *Vog.* II. 177.
Rhagas *Linn.* II. 115. *Sag.* II. 201. *Sauv.* II. 24. *Vog.* II. 174.
Rhenophonia *Vog.* I. 432. II. 153.
Rheuma *Sag.* II. 231. *Sauv.* I. 234. II. 47. catarrhale I. 235.
Rheumatica *Vog.* II. 137.
Rheumatismus *Cull.* I. 159. *Linn.* II. 98. *Sag.* II. 211. *Sauv.* II. 57. *Vog.* II. 143. chronicus *Auct.* I. 166.
Rhicnosis *Vog.* II. 180.
Rhochnos *Vog.* II. 155.
Rhoeas *Vog.* II. 179.
Rhopalosis *Vog.* I. 390. II. 159.
Rhyssemata *Vog.* II. 179.
Rigor *Linn.* II. 105. *Sauv.* II. 42. II. 147.
Rippenfellentzündung I. 135.
Risus *Linn.* II. 105.
Risus sardonius *Vog.* II. 149.
Ritteln I. 191.
Rodatio *Vog.* II. 180.
Rötheln I. 191.
Ronchus *Vog.* I. 434. II. 155.
Rose I. 111. II. 10.
Rossaliae I. 191.
Rossaniae I. 191.
Rosulae I. 191.
Rothlauf I. 111. II. 10.
Rothlaufsfieber I. 178. f. II. 31.
Rougeole boutonnée I. 190.

Rubeola *Cull.* I. 188. f. variolodes, vulgaris ebend. *Linn.* II. 91. *Sag.* II. 241. *Sauv.* II. 31.
Ructus *Linn.* II. 109. *Vog.* II. 150.
Rückenbruch I. 487.
Rückgrat, gespaltenes I. 367. II. 81.
Ruhr I. 243. II. 72.
Ruminatio *Vog.* II. 150.
Ruptura *Linn.* II. 114. *Sauv.* II. 23. *Sag.* II. 199. *Vog.* II. 174.

S.

Saamen, fehlerhafte Ausleerung desselben I. 469.
Saamenfluß II. 76.
Sackbauchwassersucht I. 371.
Sackgeschwulst I. 480. II. 15.
Sanct Veitstanz I. 291.
Sanguifluxus *Sag.* II. 216. *Sauv.* I. 211. II. 70.
Sanguinis inopia I. 357.
Saniodes *Vog.* II. 181.
Sarcocele *Vog.* II. 169.
Sarcoma *Cull.* I. 478. *Linn.* II. 120. *Sag.* II. 188. *Sauv.* II. 12. *Vog.* II. 165.
Sardiasis *Linn.* II. 103. *Vog.* II. 149.
Satyriasis *Cull.* I. 422. furens, iuuenilis ebend. *Linn.* I. 424. II. 100. *Sag.* II. 256. *Sauv.* II. 67. *Vog.* I. 423. II. 160.
Sausen im Ohr I. 415.
Scabies *Linn.* II. 117.
Scabies *Sag.* II. 208. *Vog.* II. 172. *Sauv.* I. 509. II. 85. canina, catamenialis, critica, felium, herpetica, humida, indica, neogamorum, scorbutica, vermicularis I. 509.
Scarlatae *Vog.* II. 173.
Scarlatina *Cull.* I. 198. cynanchica, simplex I. 199. *Sag.* II. 241. *Vog.* II. 132. *Sauv.* II. 32. vrticata I. 203.
Scelotyrbe *Sag.* II. 229. *Vog.* II. 148. *Sauv.* I. 292. II. 43. festinans I. 290. instabilis, intermittens, S. Viti I. 292. verminosa I. 290.
Schaafpocken I. 188.
Scharlachfieber I. 198. II. 32.
Schaudern II. 40.
Schenkeldarmbruch I. 485.
Schielen I. 437. II. 38.
Schlafsucht I. 251. II. 55.
Schlagfluß I. 250. II. 56. vom Blute I. 252. halbseitiger I. 263. II. 53. seröser I. 254. schwarzgallichter I. 256. vom innerlichen Wasserkopfe I. 255.

Schleimhämorrhoiden I. 221.
Schleimkolik I. 313.
Schleimtripper I. 450.
Schlucken II. 45.
Schmerzen II. 55.
— in Brüsten I. 110.
— im Hintern I. 111.
Schnarchen I. 434. II. 46.
Schnarren I. 435.
Schnupfen I. 234. II. 75.
Schwächen I. 268.
Schwämmchen I. 207. II. 32.
Schwangerschaft II. 80.
Schwarze Krankheit II. 72.
Schwarzer Staar I. 404.
Schwarzgelbe Sucht II. 86.
Schweiß, allzustarker I. 442. II. 74. englischer I. 99.
Schwindel II. 64.
Schwinden eines Theils II. 78.
Schwindsucht I. 353. scrophulöse I. 354.
Schwitzblattern II. 10.
Schwitzfieber I. 68. 99.
Sciatica I. 160.
Scirrhus *Cull.* I. 475. *Linn.* II. 119. *Sag.* II. 188. *Sauv.* II. 11. *Vog.* II. 165.
Sclopetoplaga *Sag.* II. 198.
Scorbutus *Cull.* I. 386. *Linn.* II. 112. *Sag.* II. 207. *Sauv.* II. 85. *Vog.* II. 159.
Scotomia *Linn.* II. 102.
Screatus *Linn.* II. 108.
Scrofula *Vog.* II. 164.
Scrophula *Cull.* I. 382. f. americana, fugax, mesenterica, vulgaris ebend. *Sag.* II. 206. *Sauv.* II. 83.
Sehen, falsches I. 408.
Seitenschmerz I. 160. II. 47.
Seitenstechen I. 160. II. 33.
Seline *Vog.* II. 174.
Semitertiana I. 59. f.
Septana *Vog.* II. 128.
Septimana *Auct.* I. 79.
Serifluxus *Sag.* II. 219. *Sauv.* II. 74.
Serpigo *Linn.* II. 117. *Vog.* II. 171.
Sextana *Vog.* II. 128.

Shingles I. 181.
Singultus *Linn.* II. 106. *Sag.* II. 230. *Sauv.* II. 45. *Vog.* II. 150.
Sinnen, Fehler derselben II. 49.
Sinus *Sag.* I. 506. II. 200. *Sauv.* I. 506. II. 24. *Vog.* II. 176.
Siriaſis *Vog.* I. 118. II. 131.
Soda *Linn.* I. 311. 273. II. 97. *Vog.* II. 145.
Sodbrennen I. 310. II. 60.
Solutiones *Sag.* II. 198. f.
Somnambulismus *Linn.* II. 99. *Sag.* II. 255. *Sauv.* I. 348. II. 65. catalepticus I. 349. vulgaris I. 349.
Somnium *Vog.* I. 348. II. 161.
Somnolentia *Linn.* II. 101. *Vog.* II. 152.
Soporoſi *Linn.* I. 250. II. 101.
Spaniſcher Kragen I. 111.
Spanopogon *Vog.* II. 182.
Sparganoſis *Vog.* II. 164.
Spasma *Vog.* II. 175.
Spasmi *Cull.* I. 284. in actionibus animalibus I. 284. in vitalibus I. 299. in naturalibus I. 310.
Spasmi *Sag.* II. 225. f. tonici II. 226. clonici II. 228. — *Sauv.* II. 38. — *Vog.* II. 147.
Spaſmus *Linn.* II. 103. cynicus *Vog.* II. 149. oeſophagi *Vog.* II. 150.
Spaſtici *Linn.* II. 103.
Speckgeſchwulſt I. 480. II. 16.
Speichelfluß I. 446. II. 75.
Sphacelismus *Linn.* I. 118. II. 95.
Sphacelus *Cull.* I. 114. *Linn.* II. 114. *Sauv.* I. 114. *Vog.* II. 160.
Spina bifida *Sag.* II. 204. *Vog.* I. 367. II. 166.
Spina ventoſa I. 111. *Sag.* II. 200.
Spinola *Linn.* I. 367. II. 119.
Spitzpocken I. 188.
Splenalgia *Sag.* II. 214. *Sauv.* II. 61. — ſuppuratoria I. 156.
Splenica *Linn.* II. 97.
Splenitis *Cull.* I. 155. *Linn.* II. 96. *Sag.* II. 248. *Sauv.* II. 36. *Vog.* II. 135.
Splenocele *Sauv.* I. 490. II. 19. *Vog.* II. 168.
Sprache, Fehler derſelben I. 431. f. Mangel derſelben II. 52.
Staar II. 49. ſchwarzer II. 50.
Stammeln I. 434. 436.
Staphyloma *Sag.* II. 190. *Sauv.* II. 15. *Vog.* II. 169.

Staphylosis *Vog.* II. 169.
Starrsucht I. 252. II. 54.
Steatites *Vog.* I. 358. II. 166.
Steatoma *Vog.* II. 169.
Steckfluß I. 304. II. 46.
Steifigkeit der Glieder I. 438.
Steinpocken I. 188.
Sterilitas *Linn.* I. 470. II. 108. *Sag.* II. 222.
Sternutatio *Linn.* II. 106. *Sag.* II. 230. *Sauv.* II. 44. *Vog.* II. 149.
Stertor *Linn.* II. 106. *Sag.* II. 231. *Sauv.* II. 46. *Vog.* II. 155.
Stichwunde I. 506. II. 22.
Stigma *Vog.* II. 173.
Stimme, Verlust derselben I. 429.
Stockschnupfen II. 75.
Stomacace *Cull.* I. 228. *Linn.* II. 108. *Sag.* II. 216. *Sauv.* II. 70. *Vog.* II. 138.
Stottern I. 434. f.
Strabismus *Cull.* I. 437. commodus, habitualis, necessarius ebend. *Linn.* II. 121. *Sag.* II. 225. *Sauv.* II. 38. *Vog.* II. 178.
Stranguria *Auct.* I. 467. *Linn.* II. 110. *Vog.* II. 145.
Stridor *Linn.* II. 104.
Struma *Linn.* II. 119.
Stuhlzwang II. 74.
Stummheit I. 431. II. 52.
Stupiditas *Vog.* I. 336. II. 161.
Stupor *Linn.* II. 102. *Sag.* II. 212. *Sauv.* II. 58.
Stymatosis *Vog.* II. 139.
Subcontinuae tertianae I. 66.
Subintrantes tertianae I. 66.
Subluxatio *Auct.* I. 503. *Vog.* II. 174.
Subsultus *Linn.* II. 104. *Sag.* II. 226.
Subsultus tendinum I. 268.
Sudamen *Linn.* II. 122.
Sudamina *Vog.* II. 172.
Sudatoria febris I. 68. 99.
Sudor *Linn.* I. 442. II. 111. anglicus *Vog.* I. 100. II. 130.
Suette des Picards I. 68.
Suffocatio *Linn.* II. 106. stridula I. 125.
Suffocatorii *Linn.* II. 105.
Suffusio *Sag.* II. 254. *Sauv.* I. 408. II. 64. coloris I. 409. dimidians obiecta, metamorphosis, multiplicans I. 410. myodes I. 409. nutans 410. reticularis, scintillans I. 409.

Sugillatio *Linn.* I. 474. II. 113.
Sumpffieber I. 68.
Suppressiones *Sag.* I. 452. II. 222. f.
Suppressorii *Linn.* I. 452. II. 105.
Suppuratoria *Vog.* II. 138.
Surditas *Vog.* I. 411. II. 153.
Suspirium *Linn.* II. 106. *Vog.* II. 154.
Susurrus *Vog.* I. 414. II. 156.
Sutura *Sag.* II. 199
Sycosis *Vog.* I. 507. II. 176.
Syncopalis *Vog.* II. 131.
Syncope *Cull.* I. 269. f. cardiaca, occasionalis, symptomatica ebend. — *Linn.* II. 101. *Sag.* II. 237. *Sauv.* II. 54. *Vog.* II. 155.
Synizesis *Vog.* I. 402. II. 152. 177.
Synocha *Cull.* I. 91. *Linn.* II. 93. *Sauv.* II. 27. catarrhalis I. 235. miliaris I. 102.
Synochus *Auct.* I. 91. *Cull.* I. 101. *Linn.* II. 93. *Vog.* II. 129. *Sauv.* II 27. hiemalis I. 92. pleuritica I. 92. 140. rheumatisans I. 92. scorbutica I. 93.
Syphilis *Cull.* I. 384. *Linn.* I. 414. II. 91. *Sag.* II. 207. *Sauv.* II. 84. *Vog.* II. 159.
Syrigmos *Linn.* II. 99. *Sag.* II. 254. *Sauv.* I. 413. II. 65. bombus, catarrhalis, cephalalgicus, criticus, a debilitate, oxycoea, plethoricus I. 415. sibilus I. 414. susurrus, a ventriculo, vertiginosus I. 415.

T.

Tabes *Cull.* I. 353. f. purulenta, scrophulosa, venenata ebend. *Linn.* II. 111. *Sag.* II. 202. *Vog.* II. 158. *Sauv.* I. 356. II. 78. dorsalis I. 356. ab hydrope I. 357. a sanguifluxu, sudatoria I. 356. syphilitica I. 357. — pulmonalis *Auct.* I. 217.
Talpa *Vog.* II 169.
Tarantismus *Linn.* II. 100. *Sag.* II. 257. *Sauv.* II. 67.
Taraxis *Auct.* I. 115.
Tenesmus *Linn* II. 110. *Sag.* II. 219. *Sauv.* II. 74. *Vog.* II. 146.
Terminthus *Sag.* II. 186. *Sauv.* I. 109. *Vog.* II. 165.
Tertiana *Cull.* I. 57. f. remittens *Cull.* I. 66. — *Linn.* II. 93. *Sag.* II. 253. *Sauv.* II. 29. — duplex *Vog.* II. 129.
Testudo *Vog.* II. 169.
Tetanus *Linn.* II. 104. *Sag.* II. 226. *Vog.* II. 147. *Sauv.* II. 39. febricosus *Sauv.* I. 62.
Tetartophya *Auct.* I. 77. f. *Linn.* II. 93. *Sag.* II. 253.

Sauv.

Sauv. I. 77. II. 29. carotica I. 78. hepatalgica I. 79. maligna I. 78. semitertiana, simplex I. 77. splenalgica I. 78.
Therioma *Vog.* I. 507. II. 176.
Thlasis *Vog.* II. 174.
Thränen der Augen I. 444. II. 74.
Tinea *Cull.* I. 508. *Linn.* II. 117. *Sag.* II. 208. *Sauv.* II. 86. II. 177.
Todtenfieber I. 61.
Todtenkrampf I. 284.
Tofus *Vog.* II. 169.
Torpor *Vog.* II. 151.
Torticollis *Sag.* II. 225.
Tortura *Linn.* II. 121.
Trachelophyma *Sag.* II. 189.
Träume, schwere I. 348.
Traulotis *Vog.* I. 435. II. 153.
Tremor *Linn.* II. 104. *Sag.* II. 227. *Vog.* II. 147. — *Sauv.* I. 267. II. 41. coactus I. 268. a coffea, a debilitate I. 267. scorbuticus, ab hydrocephalo, metallurgorum, palpitans I. 268. paralytodes, a pathemate, a plethora I. 267. rheumatismalis I. 268. a saburra, senilis I. 267. temulentus, tendinum, traumaticus I. 268. typhodes, vertiginosus I. 267.
Trichiasis *Linn.* II. 122. *Vog.* II. 179.
Trichoma *Cull.* I. 390. *Sag.* II. 209. *Sauv.* II. 87.
Triefen der Augen I. 444.
Tripper I. 449. II. 76.
Trismus *Cull.* I. 288. nascentium, traumaticus ebend. *Linn.* II. 103. *Sag.* II. 225. *Sauv.* II. 38. *Vog.* II. 149.
Tritaeophya *Sag.* II. 253. *Sauv.* I. 66. II. 28. americana I. 72. assodes I. 68. carotica I. 69. causos I. 70. deceptiua I. 66. elodes I. 68. lactea I. 73. leipyria I. 69. syncopalis I. 68. typhodes I. 68. 95. vratislauiensis I. 72.
Tritaeus *Linn.* I. 66. II. 93.
Troussegalant I. 120.
Tubera *Sag.* II. 205. *Sauv.* II. 82.
Tumidosi *Linn.* I. 358. II. 111.
Tumores *Cull.* I. 473. *Vog.* II. 162. protuberantes *Linn.* I. 473. II. 119.
Tussis *Linn.* II. 106. *Sag.* II. 230. *Vog.* II. 149. *Sauv.* I. 234. II. 45. accidentalis I. 242. arthritica I. 243. calculosa I. 242. catarrhalis I. 235. conuulsiua I. 310. a denti-

dentitione I. 243. exanthematica I. 242. grauidarum I. 243. gutturalis, haemoptoica I. 242. hepatica, hysterica, metallicolarum I. 243. phthisica, a polypo I. 242. rheumatica I. 243. sicca I. 242. stomachalis I. 243. verminosa, xerolaryngea I. 242.
Tylloma *Vog.* I. 480. II. 170.
Tympanites *Cull.* I. 360. f. abdominalis, intestinalis ebend. *Linn.* II. 112. *Sag.* II. 205. *Sauv.* II. 82. *Vog.* II. 159. — vteri sicca et humida I. 362.
Typhodes *Vog.* II. 130.
Typhomania *Linn.* II. 101. *Sag.* II. 238. *Vog.* II. 130. — *Sauv.* I. 252. II. 54. agrypnocoma, continua, febricosa I. 260. verminosa I. 262.
Typhus *Cull.* I. 93. f. grauior I. 96. icterodes I. 99. mitior I. 95. petechialis I. 93. — *Sag.* II. 251. *Sauv.* II. 27.

V.

Vaga *Vog.* II. 128.
Valgus *Vog.* II. 181.
Varicella *Cull.* I. 187. *Vog.* II. 133.
Varicocele *Auct.* I. 474.
Variola *Cull.* I. 184. *Linn.* II. 91. *Sag.* II. 240. *Vog.* II. 172. *Sauv.* II. 30. lymphatica I. 187. — verrucosa I. 188.
Variolosa *Vog.* II. 132.
Varix *Cull.* I. 474. *Linn.* II. 119. *Sag.* II. 189. *Sauv.* II. 15. *Vog.* II. 168.
Varus *Auct.* I. 110. *Linn.* II. 117. *Sag.* II. 186. *Sauv.* I. 110. II. 9. *Vog.* II. 171. 181.
Veitstanz I. 291. II. 43.
Venerisches Uebel I. 384. II. 84.
Ventriculi inflammatio I. 147.
Verderbung des Gesichts I. 407.
Verdrehung der Glieder I. 504. II. 21.
Verdunkelung des Gesichts I. 399. II. 49.
Vergeßlichkeit II. 69.
Verhaltung des Urins I. 453. II. 82.
Verheben I. 161.
Verlangen, Fehler desselben I. 419. II. 65. allzustarkes, nach dem Beyschlaf I. 422. 424. nach nicht eßbaren Dingen I. 422.
Verletzungen II. 21.
Verrenkung I. 502. II. 22.
Verruca *Cull.* I. 479. *Linn.* II. 118. *Sag.* II. 189. *Sauv.* II. 13. *Vog.* II. 170.
Verstopfter Leib I. 452.

Vertigo *Linn.* II. 99. *Sag.* II. 254. *Sauv.* II. 64. *Vog.* II. 156.
Vesania *Linn.* II. 99. *Vog.* I. 340.
Vesaniae *Cull.* I. 334.
Vesaniae *Sag.* II. 254. f. *Sauv.* II. 64. f.
Vesicae inflammatio I. 158.
Vesiculae diuae Barbarae I. 186.
Vibex *Linn.* II. 122. *Vog.* II. 173.
Virium lapsus I. 269.
Vitia *Linn.* I. 398. II. 113. *Sag.* I. 398. II. 185. *Sauv.* I. 398. II. 7. *Vog.* I. 398. II. 161.
Vitiligo *Sag.* II. 185. *Sauv.* II. 7. *Vog.* II. 173.
Vlcera faucium et gutturis anginosa I. 122.
Vlcus *Cull.* I. 506. *Linn.* II. 115. *Sag.* II. 199. *Sauv.* II. 23.
Ungarische Krankheit I. 97.
Unterlaufen mit Blut I. 474. II. 8.
Unvermögen zum Beyschlaf I. 427.
Vociferatio *Linn.* II. 105.
Volatica *Linn.* II. 98. *Vog.* II. 146.
Vomica *Cull.* I. 141. *Linn.* II. 109. *Vog.* II. 140.
Vomitus *Linn.* II. 109. *Sag.* II. 218. *Vog.* II. 150. — *Sauv.* I. 273. II. 72. atrabilarius I. 278. bezoarticus I. 276. cephalalgicus, a cartilagine xiphoidea I. 277. a crapula I. 273. a dentitione I. 277. febricosus I. 279. gastriticus, gastrocelicus I. 277. grauidarum I. 279. haemorrhagicus I. 280. ab hepate obstructo, hypochondriacus I. 278. iliacus I. 277. lacteus I. 274. marinus I. 280. nephriticus I. 279. ab oesophago obstructo I. 277. a pancreate I. 278. pituitosus I. 273. a pyloro calloso I. 275. rabiosus I. 279. ruminatio, a saburra I. 273. a steatomate ventriculi, a veneno I. 275. verminosus I. 276. ab vlcere ventriculi I. 275. vrinosus I. 276. — cruentus *Auct.* I. 229.
Vorfälle I. 494. f. II. 16. f.
Vredo *Linn.* II. 92.
Urinblase, Vorfall derselben I. 500.
Urinlassen, beschwerliches I. 467. unwillkührliches I. 447.
Vrorhoeas *Vog.* II. 181.
Vrticaria *Cull.* I. 202. *Sag.* II. 242. *Vog.* II. 164. 173.
Vrticata *Vog.* II. 133.
Vteri inflammatio I. 158.
Vulneraria *Vog.* II. 137.
Vulnus *Cull.* I. 505. *Linn.* II. 114. *Sag.* II. 198. *Sauv.* I. 505. II. 22. *Vog.* II. 174.

Vuulae prolapsus I. 497.

W.

Wahnsinn I. 340.
Warze I. 479. II. 13.
Wasserbläschen II. 9. 10.
Wasserblase I. 481. II. 15.
Wasserbruch I. 374. II. 16.
Wassergeschwulst I. 481.
Wasserkopf I. 256. f. 366. II. 80.
Wassernabelbruch II. 16.
Wasserpocken I. 187.
Wasserscheu I. 332. II. 67.
Wassersucht der Gebärmutter I. 373. II. 81. des Kopfs I. 256. 366. II. 80. des Rückgrats II. 81. des Unterleibes II. 81. des Zellgewebes I. 363. II. 79.
Water-brash I. 311.
Wechselfieber I. 54. II. 29.
Weichselzopf I. 390. II. 87.
Weißer Fluß I. 224. II. 76.
White Swelling I. 482.
Winddorn I. 110. II. 25.
Windgeschwulst I. 358. II. 10. 79. f.
Windpocken I. 187.
Windsucht I. 360. II. 82. der Gebärmutter I. 362.
Wunde I. 505. II. 21. f.
Wundwerden I. 112. II. 22.
Wurm am Finger I. 110.

X.

Xirasia *Vog.* II. 179.

Y.

Yaws I. 389. II. 84.
Yellow fever I. 99.

Z.

Zacken II. 15.
Zahngeschwür I. 110.
Zahnschmerz I. 167. II. 59.
Zapfen, Schießen desselben I. 497.
Zittern I. 267. II. 41.
Zona I. 181.
Zoster I. 181.
Zuckungen II. 39. 41.
Zunge, Vorfall derselben I. 498.
Zwerchfellentzündung I. 136. II. 33. 245.

B. Hill. Kirche

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Cullen, William, 1710-1790

William Cullens, der Arzneykunst Doktors und öffentlichen Lehrers der praktischen Arzneykunst zu Edinburg, Kurzer Inbegriff der medicinischen Nosologie: oder systematische Eintheilung der Krankheiten von Cullen, Linné , Sauvages, Vogel und Sagar
Bd.: Zweiter Theil

Leipzig 1786

Path. 277-1/2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11304499-5
VD18 90503228